



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1434/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1434/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1434/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1434/A

1434

A

A. xxix. Cha

G. WEISS



I

S

R I

om

d

I

S

v

50104

Ι Α Τ Ρ Ι -
Κ Η Π Ρ Α Ξ Ι Σ,

SIMPHO-

RIANI CHAMPEGII DE
omnibus morborū generibus, ex tra-
ditionibus Græcorum, Latino-
rum, Arabum, Pœnorum
ac recentium auto-
rum, Libri v.

ITEM EIVSDEM LIBER
unus de omnibus febrium ge-
neribus.

*Ed 169
Bibliotheca Fomburgica.*

BASILEAE PER HENRI-
CHVM PETRVM.

Oswald ab Eggen



ORNATIS

SIMO PATRITII ORDINIS

uiro LVDOVICO MARTROF-

FIO ciui Francofurt. ho-

nestissimo M. Hop-

perus S.



V M nuper, ornatissime Lu-
donice, Henrichus Petri socer
meus patris mihi loco uenerā-
dus, in SIMPHORIANI
illum de morborū generibus,
libellū incidisset, de excuden-
do suis eum typis statim cogitauit: eò quod autor,
haud sanè cōtemnendus, utilis ualde, quod ad ipsam
rem attinet, sibi uidebatur: hoc imprimis nomine,
quod ea ferè omnia, quæ in multis alijs & magnis
uoluminibus ποδὲ τῆς ἱατρικῆς τοῦ πατρὸς late ha-
bentur diffusa, in unum quasi fasciculum exuarijs
uariarum linguarum autoribus collecta, atq; con-
nexa paruus hic libellus complecteretur: qui sanè
sufficere ijs qui librorum multitudine destituuntur,
aliquo modo possit, et enchiridij instar esset omni-
bus ijs

E P I S T O L A.

bus ijs qui τῆς τῆς ἰατρικῆς πρᾶξις hodie exer-
cent. Quoniam uero exemplar, quod tum habebat,
corruptum nonnihil aliquibus in locis erat: utpote
male distinctum, nec non ortographiæ ratio inter-
dum omiſſa, quin etiam dictiones, quæ illic leguntur,
Græcæ, Latinis typis excuſæ haberentur, quarum ta-
men pleræq; Græcè quoq; ſcribi omnino & uolunt
& exopſcūt: quia (inquā) hæc atq; eiufmodi tum in
exemplari deſiderabat, mihi reuiſendum id tradi-
dit: non quod medicinæ ſim candidatus ego, quæ
fortaſſe caſtigatorem requireret, ſed ut id ſolum
præſtare, quod quuiſ alius uel mediocriter lectio-
ne cum Græca tum latina exercitatus, facile poſſet:
hoc nempe quod paulò ante dixi de uera dſtinguē-
di ratione, ac debita ortographiæ obſervatione,
nec non Græcis excudēdo typis Græcas latine pri-
us excuſas dictiones, id ſolum, inquam, in hoc libel-
lo pro modulo noſtro præſtitimus. Noui aliàs quā
ſit difficile medicorum libros caſtigare, ubi una ali-
qua uocula ſiniſtrè uel addita uel expūcta, imò api-
culus unicus inuerſus, aut perperam aſcriptus mul-
ta ſæpe hominum milia (quod DEVS omen miſe-
ricorditer auertat) neci tradere poteſt. Cæterum
quod de libelli huius ratione, ordine atq; ſerie mul-
ta dicā (quod tamē munus epiſtolæ noſtræ propriū
erat)

E P I S T O L A.

erat) nihil est: quia si quis scire id expetit (quod sane expetere omnis candidus lector debet) præfatione is hanc ab ipso libelli huius autore fronti hic adiectâ legat, quæ aliud agit nihil, nisi quod omnium eorum quæ præscire nos equum est, copiosissime rationem reddit. Nec præterea opus est, ut auctoris nostri institutū hoc, quod facere quidam nō minus rectè quā multis uerbis solent, magnopere laudē, per se laudatissimū ijs omnibus, apud quos uoti sui fit compos, hoc est, qui eam inde utilitatē, quæ pollicetur perceperint, quæadmodum percepturos multos speramus. Reliquū igitur est mi LVDOVICE, ut ad te stylū nunc conuertā, & causam breuiter dicā cur ad te scribere ego minus uerear. Anni sunt lapsi (uti scis) plus minus sex, quū apud nos hic Basileæ non sine magna ingenij tui laude bonis literis operā disti: ibi tum, ita ut fieri sæpe solet, factū est, ut communibus ambo nos studijs incubentes, easdemq; eorundē præceptorū prælectiones publicas auscultantes, in eam alter alterius notitiā uenimus, ut iam nō tantū salutare familiarius, & alloqui nos inuicem satis fore existimarem, quin ipsos etiā animos nostros penitus beneuolētia, et mutua opera cōiungeremus: quod sanè ut de me erga te certo affirmare possum, ita de te quoq; erga me planè nihil dubito.

Hanc

EPISTOLA.

Hanc ego tuā, mi Ludouice, amicitia tantī semper feci atq; atq; facio, quāti uix aliam unq; non tam ob ullā aliam rem, quā propter singularē illam tuam in omnibus modestiā et iudiciū in iuene profecto admirādum. Vt hanc igitur nostrā amicitia, penē propter tēporis longinquitatē, quo neuter alterum uel uidit uel literis salutauit, collapsam renouarē atq; confirmarē, non aliter cōmodius fieri id posse arbitratus sum, quā si libellū hunc tibi gratitudinis ergō dedicarē: maxime cum te non prorsus alienum ab hac professiōe iam olim cognouerim. Quo etiā audacter magis id facerē, persuasit mihi tuus ex sorore charissimus nepos Io. Hērichus à Rheno iuuenis, pfecto ut honestarū disciplinarū hic apud nos studiosissimus, ita moribus optimis præditus: qui, ut est mihi familiarissimus, interroganti mihi sepe de te atq; rerū tuarū statu, dicere inter cætera solebat quā amice erga me sis affectus, quantum uē me semp dilexeris: quæ (inquā) uox animū meū in meo hoc instituto cōfirmavit, & mihi, ut iam antea dixi, prorsus persuasit, ut ad te scriberē, & animum ita tuum erga me beneuolum agnoscerem, meumq; uicissim erga te promptissimum hoc pacto testarer. Vale Basileæ pridie Calendas Septemb. Anno post incarnatum uerbum 1546.

SIMPHO.

SIMPHO-

RIANI CHAMPEGII ILLV-
strissimī principis domini ducis Cala-
brię, Lothoringiæ & Barri &c. prima-
rii physici, in suam de morbis particu-
laribus epitomen præfatō ad clarissi-
mos uiros Salomonem de Dumbellis
auratum equitem, Andream Briellū,
Albertum de Podio, Petrum Tremo-
letum, & Ludouicum Burgēsem
regiæ maiestatis consilia-
rios & medicos di-
gnissimos.



EDICINA artium præ-
clarissima, duobus potissimū
instrumentis, ratione, uideli-
cet, & experimento uenatur
& adipiscitur. Ex quorū uin-
culo secta illa medicinalis no-
stræ facultatis gignitur quæ securior, & uetustissi-
morū sapientissimorumq; iudicio rationabilior exi-
stit, quam logicam, id est, rationabilem uocamus.
Quippe tres potissimū medicorum hæreses priscis
4 4 seculis

P R A E F A T I O.

seculis obseruatae perhibentur, ut Galeno nostro in
sectarum libro placuit. Empirica prima: Cuius au-
tores solis empirijs, hoc est, experimentis contenti,
corpora nostra & conseruare & curare profite-
bantur. Secunda methodica, quā solae rationes, ab-
iecto omni experimentorum magisterio, conficie-
bāt. Et logica tertia: quae nec rationem respuit, nec
omnino est experimentorū expers, uerum utrunq;
in unum connectens, & rationem admittit, & em-
pirijs utitur. Sicq; ex prioribus haec una conflatur,
quae nihil intactū relinquit, quo ad tuenda releuan-
daq; à languoribus humana corpora opus sit. Huius
mirabilis ac prope diuinæ artis autores ante Hip-
pocratem plurimos fuisse, neminem tamē ante eum
uel logica, id est, rationabili usum fuisse, uel ipsam
exactam posteritati reliquisse cōperio. Eapropter
quantum nobis consuluerit ille pater, medicorum
Hippocrates Cōs: & propterea quātis laudibus,
honoribus ac præconijs ueniat excolendus, non est
dictu facile, utpote qui iactis fundamētis, & affixa
radice, posteris omnibus speculandæ, lustrandæ ac
recipiendæ ueritatis attulit occasionem. Cui si ob se
datam sua mira excellentiq; prudentia in Attica ur-
be pestem, erecta aliquando fuerit (ut historici tra-
dant) dicataq; aurea statua, quā nemo inflexis ge-
nibus

P R A E F A T I O.

nibus inhonoratam transgredi auderet. Quid nos amplius, si lex permitteret? An eum gemmali donare sufficeret? Non profecto, nisi publicis ac prope diuinis honoribus eum attollere liceret. Hic antiquissimus autor, quāuis hoc uno ab omnibus cōmendetur, propeq; diuinus perhibeatur, quod mira quadam breuitate usus, benedictis non admiscuerit limæ locum, multa tamen sic arcta hac in sua breuitate, inexpressaq; reliquit, ut longa expositione indiguerint. Eapropter non incōsulte alij permulti doctissimi quidem, & eiusdē facultatis benemeriti, eandem ampliare, augere, ac (ut ita loquar) quantum humana fert infirmitas, perficere curauerunt. Et longe ante ceteros Galenus noster Pergamensis, quem medicorum principem, quia primas in ea facultate sibi uendicauit partes, communi uocabulo appellamus. Scriptitauit hic tanta in his literis, ut eius monumenta (Tortellius autor est) ad 150. uolumina facile ascenderint. Quātum cum hoc pleriq; alij Græci, quorū Latini non pauci optimi æmulatores fuere, in hac arte interpretāda insudarint, suis lucubrationibus, res in plano est. Ab his studiosissimi Arabes ac Poeni multa depromentes, quantum in ea ualuerint, hoc uno clarum existit, quod cum græcis & latinis de huiusce artis gloria decer

P R A E F A T I O.

tare audent, nec cedere coguntur. De quorum numero Isaac eben, Aran Salomonis filius nulli eorū secundus multis ac gloriosis scriptis clarissimam et facile permeabilem reddidit medicinam. Quem sequuti Rasis Poenus, Haly Abbas, Serapio, princeps insuper Aboaly, ac alij permulti, in medicinis nonnulla egregia quidem, imò copiosissima chartis mandarunt. Hos omnes recentioribus nostris placuit imitari. Græcos quidem perinde ac parentes præcipuos. Arabes uero & Poenos uelut grauissimos splendidissimōq; interpretes. Quorum omnium & Græcorū Latinorumū & Arabum, aut Poenorum recentium opera cum uaria sint & multa ualde, in multisq; prope inter se dissidētia, quæ omnia nō minus difficile esset legere q̄ tædiosum: Tū ob eorū prolixitatē, quorū lectioni Aetatiuus diuturnissimū uiri decursus uix satis esset, tum ob uendicandum, aut potius cōperiundorum tantorū ac tam diuersorū uoluminum penuriā, propterea optimū duxi, nec minus, mea sentētia, utile, opus ex horū sententijs aggregatū breue quidē, sed cōpendium conflare, in quo canones, dogmataq; præcipua pro ægritudinibus omnibus effugādis sanādisq; quas humanū corpus ab occipitio ad talum usq; recipit recolligere constitui. Iureq; hoc à nobis non cum leui labore

P R A E F A T I O.

labore editum, LVGDVNENSIS AGGREGATORIS nomine insignire placuit, ut sic ego qui ex Lugduno antiquissima Galliae Celticae urbe oriundus ibiq; educatus sum, hūc nostrum laborem ex antiquissimorum autorum mentibus collectum, antiquissimae urbis titulo, optima quadratura illustrarem. Cuius sectio prima erit in libros partiales quinque, liber in singula capita scindetur. Singulūq; caput tribus diuisionibus terminabitur. Quorum prima Graecorum et Latinorum electos sermones, cuiuslibet aegritudini peculiares, memorabit. Secunda, quid de his Poeni, id est, Afri, quidq; Arabes censuerint, paucis explanabit. Tertia, recentium, quos modernos incompto uocabulo appellare consueuimus, autorum potiones, confectiones, electuaria, unguenta, malagmata, ceteraque huiusmodi remedia, siue interius sumenda, siue extrinsecus approximanda, recensendo caput ipsum claudet. Mirari fortasse quispiam non desinere, ut qui praecipuorum Arabum sententias afferre secunda diuisione pollicitus sum, bonum Haly Abbatem plerunque reticuerim, quem nostri perinde ac uetustissimum doctissimūq; semper iudicarunt. Cui respoñdeo, me Haly Abbatis lectura plurimum oblectatum fuisse, insudasseque frequenter.

VERUM

P R A E F A T I O

Verum dum in uisendis pariter Isaac operibus incumberem, locus occurrit in quarto febrium capite, de diebus quibus fit crisis, ubi se aliquando Pantegni edidisse, ad illud crebrè lectorem remittens, fatetur. Cum autè frequenter ad Pantegni illo suo consilio accesserim, quæsierim insuper, quid Haly abbati in dispositione regali, menti esset. In ambobus easdem prorsus sententias, eadem penè uerborum serie, in eisdemq; capitulis notatas reperiens, iudicaui hæc fuisse eiusdè auctoris opera, imò unum idemq; unius auctoris opus, posterioremq; à priore hanc ditissimam traditionem abstulisse. Et Haly abbatem potius ab Isaac quam è diuerso, propterea quod Haly abbas Rasim memorat. Rasis crebrè Isaac sermones suo operi continentis annectit, unde clarum relinquitur Isaac longe ante Haly abbatem scripsisse. Et proterea Haly abbati satisfactū esse, cum Isaac in Pātegni auctoritate usi fuerimus. Quibus ambobus succedens Constantinus monachus, & ipso falso similiter opus Pantegni, quod Isaac fuit, sibi ascripsit. Nec putet quis Constantinum solū Pantegni nomen ab Isaac deprompsisse, ut multis placuit, illumq; translationi suæ Haly abbatis superposuisse, sicq; nomine regalis dispositionis

P R A E F A T I O.

nis mutato, illud opus in quo interpretis officio tantum functus est. sibi destinasse, non opus Isaac. Etenim Isaac ubi in feb. libro lectorem ad Pantegni uaticumq; quorum ipse autor est, mandat. Si ad illa accesseris reperies profecto sermones locaq; secunda simul ut dixerit primis conuenire, nihilq; dissidij interesse. Quare autem omnem uerborum maiestatem, facundiam, eloquiūq; Latini phalaras, relinquens quotidianam planēq; rudem sermonem in hac æditiōe elegerim, si perconteris, non inconsultè hoc actum esse scias. Sunt enim nostri medici hac tempestate plurimumq; incompti, quibus satis est, imò ex industria eos delectat ritus ac rudis sermo magis quàm latinorum uocabulorum obseruantia, non satis aduertentes tam immensam tamq; præclaram artem barbarie fœdari flagitiosissimum esse, ac penitus nobilissimam facultatem infamare. Præterea cum & priscorum theorias empiriasq; in unum congregare. Eandemq; uerborum seriem, qua & ipsi uel usi sunt uel traducti in medium adducere constituerim, coactus hunc humilem stylum obseruare compellor. Reliquum est clarissimi doctores, ut qui doctrina ac literis præclaros omnes semper magni habere uestra humanitate

P R A E F A T I O.

nitare soletis, sicuti & uos longè ante ceteros doctissimi, tamdiu pro regia maiestatis conseruatione delecti estis, hoc opus uestris genijs, uestrisq; Mineruis dicatum, directum ac deuotum, ab æmulorum oblatratibus ac maledictis prohibeat, ut uestro auspicio tutum, in lucem & propatula prodeat.

F I N I S.

INDEX

INDEX

OMNIVM QVAE AD AR-
tem medicam in hoc libro
continentur.

A



Bstinen =	alopecie cura	496
tia sum	amphimerinon febris	
ma est	pag.	550.556
medici	amphimerinae febris si-	
na	gna	551.553
acetum nervis nocet	analepsiae cura	76
agriatapegasceleantos	anasarca	296
pag.	anhelosus	217
αἰμοπύσις 196.201	angina quid	164
αἰμοπύσις multis fit	anginae cura	165.166.
modis 196.197.		168.172.173
198.201	angina squinantia corru	
αἰμοπύσις maximè ob	pto uocabulo dicta	
noxij sunt rixosi 199	pag.	264
αἰμορροϊδες 380	angina facile hominem	
aloës ma'um epati 302	suffocat	166
alopecia	angina nunq̃ ex melan	
	cholico	

INDEX.

cholico humore	167	appetitus caninus	268
anginae non unum ge-		appetitus bibendi cor-	
nus	167	ruptio seu augmenta-	
anginae apostema qbus		tio unde	261
in locis oriatur	170	appetitus canini medela	
angina canina periculo		pag.	270
sa	171	apoplexia cur sydera-	
angina cui tēpori maxi-		tio dicta	81
mē propria	171	apoplexiæ cura	82.83.
anginae occultæ signa			84.88
externa	171	apoplexiæ causæ	82.85
anginae mortalis signa		apoplexia quid	82.83.
pag.	171	et	84
anginae causæ	164.	apoplexia et paralysis	
et	170	quid differant	83.93
ani morbi	380.386	apoplexiæ signa	84.85
ani morbos sanādi ratio		apoplectici quasi mor-	
pag.	381. et 382	tui non cito sepelien-	
ani exitus causæ	387	di	86
ani exitum curādi ratio		apoplexia fortis curari	
pag.	377.389	nequit	86
ἀντασπαμωσις	202	apoplexiæ tres gradus	
anus alui	380	pag.	86.87
appetitus corruptio tri-		apoplexiæ maximè ob-	
bis fit modis	260	noxi	87
		apople	

INDEX.

- apoplexie parue (que
 idem quod epilepsia)
 triplex causa 70
 apostema in renibus pa
 gina 395.397.403
 apostema in epate 287
 apostemasis in epate si
 gna 288
 apostematis in epate cu
 ra 291
 arenae marinae usus 315
 arquatus morbus 318
 arthemisia & matrica
 ria differunt 409
 articularis morbus, ali
 as arthretica 451.
 & 466
 articularis morbi cause
 pag. 452
 ascarides & lumbrici
 in intestinis 366
 ascarides & lumbrici qd
 differant 366
 ascites 295
 ascites cura 309.
 310.311.316
 ascites & tympanites
 quid differant 308
 ascites peior omnibus
 hydropis speciebus
 pag. 301
 asthma quid 209.214
 asthmatis cause 215
 asthmatis cura 216.
 & 221
 asthmatis tres species
 pag. 216
 auditus porta mentis. et
 disciplinarum sensus
 pag. 143
 auditus passio triplex
 pag. 146
 aurium passio multiplex
 pag. 147
 aurium fluxus cura 148.
 149.150
 aurium ulcera sanandi ra
 tio 150
 aurium uermes & c. cu
 randi ratio 151
 b aurium

INDEX.

auriū surditas 152
auriū sibilos ac sonitus
tollens 145.151
auriū dolores uarijs ex
causis 146.148
auriū doloris cura 144
aurium doloris causæ
eodem.

B

Beda cæcus do-
ctus 144
bulismus quid 265
bulimi medela 270

C

Cachexia quid pa-
gina 285.286
cachexiæ causa 286
cachile & cacele diuer-
sa sunt 314
calculus in renibus ge-
neratur duobus mo-
dis 398
calculorum in renibus si-
gna 392
calculorum in uesica si-

gna 392
calculorum causæ 392.
& 404
calculorū remedia 392.
393. 409
calculi accidentia siue si-
gna 399
calor naturalis quid pa-
gina 502
caliditas præter naturā
quid 503
calor naturalis & qui
est præter naturam
quid differant & in
quo cōueniant 504
calor triplex 505
calor naturalis duplici-
ter corrūpitur 306
caluritus morbus 226
cancrena 481
caninus appetitus et dia-
betes quid differant
pag. 405.406
capitis tineam propel-
lens medicina 498
capitis

INDEX.

capitis dolorem curandi	ratio	34	catarrhi cum febre cura	pag.	115
caputpurgium per na-	res	37.101	catarrhi sine febre cura	pag.	116
caputpurgia	43.74.		catarrhus æque ex calo-		
et 76			re solis atque frigidi-		
carbunculus	480		tate		117
carbunculantes	480		catoche seu catalepsis		
carcinoma idē quod cā-			medius inter lethar-		
cer morbus	482		gum et phrenitidem		
cardiaca unde dicta pa-			morbus		46
gina	242		causus et in tabe syno-		
cardiacus morbus eod.			chus qd differat		518
cardiacæ causæ primati-			causi cura		519.522.
uæ et remotæ	248		et 524		
cardiacæ cura	242.		causon quid		520.523
246.249.250 et c.			causi signa		520
cardiacæ uaria materia			causi materialis causa		
unde nascitur	244		pag.		cod.
carus morbus	47		causon à tertiana quid		
carus et lethargus quid			differat		521.523
differant	47		causi accidentia insepa-		
cari cura	cod.		rabilia		523
catalepsie cura	76		cerebellaris uentris flu-		
catarrhus	114.117		xus		372
			b 2 cerebri		

INDEX.

cerebri diuifio	93	tia feu figna	346:
ceratum filij Zachariae			347
pag.	272	colicae paſſionis cauſa	
chiragra, podagra, ſcia		pag.	346.348.350
tica, gutta idem ſunt		colica deſperata	353
pag.	466	colica curabilis	353
cholera rubea naturalis		colici & nephretici do-	
et nō naturalis	540	lores quid differant	
cholera pro diuerſo co-		pag.	343
lore diuerſas febrū		colyrium Philonis, &	
ſpecies gignit	542	Cleonis	134
cirſocela	483	collyrij uſus	135
clauus ulceris genus pa-		colon inteſtinum	342.
gina	478		343
cliticus idem qui para-		comitialis morbi deſcri-	
lyticus	91	ptio	67
clunicus	eodem	comitialis morbi uaria	
coitum iuuantia	422.	nomina	66
	427	comitialis morbi diffe-	
coitus paucitatis cauſa		rentiae tres	68
pag.	424	comitialis morbi cura	
colica paſſio	342.349	pag.	68. 69.72.
colicae remedia	343.		73.74.75
	344.354.355. &c.	comitia unde dicta	67
colicae paſſionis acciden-		cōplexionis malae epatis	
		cura	

INDEX.

cura	290	pag.	235.236
condyloma	480	D	
condyloma quid	382	Dæmon suscipi	
confectio imperialis pa-		ens formam	
gina	252.253	mulieris fit succubus	
congelatio seu dētis stu-		pag.	78
por	158	dæmon suscipiens for-	
cor & eius præstantia		mam uiri fit incubus	
pag.	240.241	pag.	78
corda ceruorū ossicula		dæmon mulierē impræ-	
continent	241	gnans, non quidē ex	
cordapfos	343	se, sed ex uiri sperma	
cordios	343	te eā imprægnat eo-	
cordis tremor unde pa-		dem.	
gina	243.247	dæmones animæ homi-	
corporis humani partes		num	
primæ	509	dens	
coryza quid	113	153.157	
coryzæ causa	116	dentium stridor	
coryzæ cura	116	158	
coryzæ ex calore proue-		dētium dolorē tollentia	
nientis signa & cu-		medicamina	
ra	116	154.	
coxarum morbus	452	160.161	
criseos ratio in pleuresi		diabetes & caninus ap-	
		petitus quid differāt	
		pag.	405.406
		diabetica passio in reni-	
		b 3	bus

INDEX.

bus	399	dysenteriae causa uel in-
diabeticæ passionis cu-		terior uel exterior
ra	415	pag. 365
διαβρώσις	202	δυσπνοία 209
diarrhœa	358	dyspnœa cura 211. 212.
diarrhœa, lienteria. &		214. 216. 218. 219.
dysenteria quid tres		(220) (213)
hæ species inter se		dyspnœa trib. fit modis
differant	370	dyspnœa multifariæ
diarrhœa cōuertitur in		multifaria signa pa-
lienteria & dysente-		gina 217. 218
riam eodem		E
diarrhœæ causæ eodem		Egestionum uariæ
diarrhœa cōmune acci-		qualitates et ea-
dēs in hydropse 299		rum causæ 372
didimus cœcus doctus		ἐλεός 345
digestio 266 (144)		electuariū pro memoria
distillatio quid 113		& cerebro 52. 101
dysenteria 359. 365		electuariū stomachū cō-
dysenteriae causæ 361.		fortans 272
371		electuariū quo utuntur
dysenteriae cura 362.		reges 605
375. 376		electuarium iuuans ap-
dysenteria pueri lacten-		petitum 269. 270
tis curandi ratio 377		elephantiasis 476
		aliud

INDEX

- aliud Græcis, aliud Arabibus.
- elephantiasis & lepra differunt 476
- elephantiasis quæ et impetigo 126
- elephantiasis causa 126
- elephantiasis duplex, alba & subrubea 127
- ἐμπροδοτόνος 105
- empyici 238
- enterocela 483
- epar duobus modis patitur 286
- epar quo maius, eo plus comedit animal 284
- epatis morborum diuisio 289
- epatis quatuor uirtutes pag. 283
- epatis malæ complexio nis cura 283. 284. 287
- epatis caro nõ sentit pagina 284
- epatis calidũ apostema cognoscendi ratio 233
- epar oppilatur multis modis 287
- epatis morbi consimiles pag. 289
- epar hominis maximum pag. 284
- epilepsia quid 69. 71. 72
- epilepsie causæ 70
- epilepsia & apoplexia in quo differant seu conueniant 70
- epilepsie signa & accidentia 71
- epiplocela 483
- epialos febris 584. 585
- epiali causa 589 (589
- epiali cura 586. 587.
- eruptionis acidæ, causa 262
- ethicæ species tres 601
- ethicæ cura 602. 603. 604
- 64 exachia

INDEX.

exachia	382	sta	608
F		febris continuæ signa et	
F Aciem à maculis		cura	609
purgandi rat.	493	febris putridæ causa pa	
faciem clarificandi ratio		gina	534
pag.	496.497	febres pro diuersa ma-	
faciei rubedinem auer-		teria, diuersæ	535
sandi ratio	498	febris quartana	536
fames	265.269	febris duplex	505
fastidium	262	febris ephimera et eius	
fastidij causa	263	tractatio	507.516
febris quid	500.504.	febris tertianæ causæ	
505		pag.	527.531.539
febris unde dicta	501	febris tertianæ signa pa	
februm tria genera pa		gina	527.528.531.
gina	501.509	532	
febris quotidianæ signū		febris causa generati-	
pag.	501	ua	514
febris quotid. quos ma-		febris causa custodiens	
xime infestet	501	eam	514
februm quotid. causæ		febris causa augmenta-	
pag.	502	tiua	eodem
febris continua de puro		febris pestilentialis ua-	
sanguine	608.609	riæ causæ	619
febris calor inflatius di		febris pestilentialis cu-	
		ra	

INDEX.

- ra 620.621.623
 febris phlegmatica pa-
 gina 552.553
 febris ephimera quid d
 reliquis febrib. diffe-
 rat 516
 febris hemitritæus pa-
 gina 567.569.571
 febrium continuarū cau-
 sa 517
 febris quartanæ cura
 pag. 576.579.583
 febris epialos 584
 fistula morbus 479
 fungus 480
 furunculus 481
- G
- G** Alli gallinacei
 coctio iuuas
 colicam 357
 gemursa morbus 479
 genitalium passiões seu
 morbi 424
 gingiuis cruentis medē
 di ratio 155
- glandulæ & scrophulæ
 differunt 491
 gonorrhœa passio 426
 gonorrhœæ cura 421.
 428
 grauedinosi 113
 gutta 463
 gutta & arthretica dif-
 ferunt eodem
 guttæ causæ 465
 gutta, podagra, chira-
 gra, schiattica idem
 sunt 466
 guttæ cura 468.
 469. &c.
 gutta rosacea 492
 & eius cura ibidem
 guttur 169
- H
- H** Aemoptoicorum
 cura 196.
 197. 199. 200.
 201.203
 hæmorrhoids quid 383
 hæmorrhoidum causæ
 b 5 pag.

INDEX.

pag. 384.385	hemorrhoidū accidētia	hemitritæus	567.
pag. 384	hemorrhoidum diuifio	569.571	
pag. 385.386.387	hemorrhoids aliorum	hemitritæus triplex pa-	
morborū cautela 385	hemorrhoid. cura 386.	gina	570.571
388.389	hemorrhoids nomē æqui	hemitritæi cura	572
uocum 386	hemorrhoidarū species	hernia	483
tres 387	hecticarum febrium du	herpes estiomēnus pa-	
plex genus 590	hectica febris quid eod.	gina	494
hectica cura 592.593	hectica cura 592.593	hydrocela	483
hemicranicis languori-	hemicranicis languori-	hydrops	294.297.
bus medendi ratio	bus medendi ratio	301.304	
multiplex 33	multiplex 33	hydrops quæ accidit ex	
hemicranæ morbi cau	hemicranæ morbi cau	epate qd differat ab	
sa 34.36	sa 34.36	ea quæ fit ex locis ua	
hemicranæ morbū pel	hemicranæ morbū pel	cuis uifcerū 299.300	
lens unguētum opti	lens unguētum opti	hydrops per compaffio	
mum 33	mum 33	nem	309
		hydropis species tres	
		pag. 298.299.305	
		hydropis caufæ remotæ	
		pag.	308
		hydropis caufa frigida	
		materia	305
		hydrops apoftema a-	
		quofum	eodem
		hydro-	

INDEX.

hydropis tria genera pag. 305	icteritiæ tres species pa gina 325
hydropis causa 298. 301.305	icteritiæ morbi uaria no mina 338
hydropis causa est ca- lor interdū sed non proprie 305.306	icteritiæ cura 318. 319. 323. 324. 326. &c.
hydropis cura 246. 247.300.302.303. 304.309. &c.	icteritiæ causæ 320. 319.321.324.325
hydrops nunq̃ sine pas- sione epatis eodem	icteritia aut ex epate aut ex felle 321
hydropicis extrahendæ aquæ ratio 294.295	icteritiam ex epate, seu ex felle cognoscendi ratio 321.322
hyposarcha 302	icteritiam ex splene co- gnoscendi ratio 322
hyposarcha cateris spe- ciebus curatu facili- or 308.309	icteritia à morphea dif- fert 324
hyposarchæ cura 311	iecur & iecinus 279
I	iecur sanguinis origo pag. eodem
Icteria quid 317. 318.320.322.324	iecinoris morbi 280. 281.287.289
icteritia ab ictero auc pag. 317.323	ignis sacer 479
icterus auis 317	iliaca passio 343 iliacæ

INDEX.

iliacæ passionis causæ	gina	128. 129
pag. 349. 351	incubus	77. 79. 80
iliacæ passionis acciden	incubi causæ signa, cura	
tia 349	pag. 80. 81	
iliacæ passionis cura pa	incubum patiens excite	
gina 345. 346. 351.	tur 80	
352. &c.	incubare 76	
iliacæ passiōis in sua ma	inflatio 263	
litia gradus 351	infamie genera tria pa	
iliacæ passionis signa pa	gina 53	
gina eodem	iuncturarū morbi 466	
iliaca incurabilis 353	L	
iliacæ curabilis cura pa	L Abiorum ulcera	
gina 354. 355	curandi ratio	
impetigo quid 474.	pag. 155	
quæ et serpigo 484	labiorum usus & pro-	
impetiginis cura 485	prietas 158	
impetigo & lepra ac	labiorum fissuras seu pu	
morphea quid diffe-	stulas sanandi ratio	
rant inter se eodem	pag. 156	
impetigo, & eius nomi	lacertorū generatio &	
nis ratio 125	usus 110	
impetiginis causæ 485	lachrymæ unde 136	
impetiginis seu elephā-	λαγώνοπος 343	
tiasis medicinalia pa	lapis in pulmone 404	
	lapi-	

INDEX.

- | | |
|---|--|
| lapiscin uesica duobus
modis nascitur 398 | lethargie mortalis si-
gna 50 |
| lapidum causa in pueris
maior eodem | lethargie cura 50.51.
et 52 |
| lares ex hominibus 77 | lethargie cause 48 |
| λεπτοθυμοί 242 | lethargia uera et non
uera 49 |
| λεπτοψύχοι eodem | leucophlegmantia 305 |
| lemures seu larue ex ho-
minibus 77 | lichen siue mentagra pa-
gina 120.124.125 |
| lentigo quid 478 | lien, et eius descriptio
pag. 228.329.336 |
| lepra quid 475.486 | lienteria 359 |
| leprae diuersae species
pag. 47 | lienteria quid secundum
Galenum 360 |
| lepra et elephantiasis
differunt 476 | lienteria duplex eodem |
| leprae cura 488 | lienteria cura 360.361 |
| lethargus 44 | lienteriae cause 364.
370 |
| lethargi signa et effe-
ctus 45.46 | lienteria in dysenteriam
mutatur 364 |
| lethargia quid 47.49 | lienteriae qualitatem in-
dagandi ratio 364.
365 |
| lethargiae ex apostema-
te in cerebro orta si-
gna 50 | lienteria incurabil. 370 |
| lethargiae ex solo phleg-
mate orta signa 50 | liens |

INDEX.

lienteria species & ca-	gina	440.443.
rum signa	371	444.446
lingua	157	matricis praefocationis
linguae grauitatis mede-		cura
la	163	450
liparia febris	585	matricaria & arthemisa
lipothymia & syncope		sia differunt
quid differant	243	409
lumbi	402	melancholia
lumbricorum causa	366	56
lumbrici et ascarides qd		melancholiae sig.
differant	366	61.62
		melancholia et mania qd
		differant
		56.57
		melancholia in mulieri-
		bus deterior
		57
		melancholia plus uiris
		accidit
		eodem
		melancholiae maxime ob-
		noxij
		eodem
		melancholiae species inde
		finite
		57.62
		melancholiae cura
		63.64
		melancholici uarie affe-
		cti
		56
		melanchimmon
		325
		meri
		260
		meri morbi
		260
		meri passiones
		268
		meri

M	Alarum cura
	pag. 155
mania canina	57
manus cur non inflatur	
in hydropo	299
μαρμαρινος febris pa-	
gina	591
marasmi signa	591.
	594
matrix	432
matricis passiones	443
matricis suffocatio pa-	

INDEX.

- meri passionū signa pa-
gina 26
menses nil nisi semen in
coctum 433
menstrua, & eorum ra-
tio 437
mēstrua qbus de causis
mulieribus auferatur
pag. 438. 445
menstruorū intēpestiua
ablatio morbos uarios
gignit 438. 439
menstruorum cura pagi-
na 446. 447. etc.
mēstruorum nimius flu-
xus unde 445
menstrua emittūt inter-
dū etiā imprægnatæ
pag. 444
mēstrua tēperata causa
sanitatis 442
mēstruatio equal. 443
mētagra seu Neapolita-
nus morbus unde &
quando in Italiā irre-
psit 221
mentagræ uariæ appel-
lationes 120. 121
mentagræ ratio triplex
pag. 121
mentagræ cura 124
metallorum fusores cur
pleriq; phthifici 191
mictum in lectum cauēs
medicina 414
morphea quid 489
morphea ab icteritia
differt 324
morpheæ cura 489.
490
mulieres liberæ à poda-
gra 457
mulieres cur minus cal-
culo afficiantur 391
myrach 302
myrmetiæ 478

N
Narium foetores
uarijs de cau-
sis 156
uarius

INDEX.

narium sanguinis eru-
ptioni medētia 154.
155

narium sanguinis fluxus
unde 158.159

nasi descriptio 153

nasi foetorem curādi ra-
tio 162

nasi ulcera curandi ra-
tio 154.155

nasi dolorem curādi ra-
tio 159.161

nasus ex quatuor cōposi-
ta 160

natura similis stulto &
iniusto regi 510

nausea 266

neruorum ortus, sensus
& motus 96

nutrimenti causa quin-
que partita 512

O

Oculi, eorumq;
usus & præ-
stantia 131

oculi hominum diuerso

colore insunt eodem

oculi mediocres optimi

pag. 132

oculorum cum materia

tum forma eodem

oculorum uarij motus,

uarios mores indicāt

eodem

oculorum tunicæ, & re-

liquæ partes 133

oculorum humida tria

pag. eodem

oculorum doloribus me-

dentia 134

oculorum panni et albu-

gines unde 136

oculos clarificans 140

oculi panum delens pa-

gina eodem

oculis lachrymantibus

medentia 137.142

oculorum debilitas un-

de 137

oculorum debilitati me-

dentia

INDEX.

dentia	137. 138.	na	215. 217
140		orthopnoea in senibus	
officiales morbi epatis		incurabilis	214. 217
pag.	306	ozena	481
olei confectio de serpen-		P	
tibus	103	Anaritia	495
ophthalmia quid	135.	pansa	484
138		paralysis quid	90. 94.
ophthalmie cause	135.	96	
138		paralysis duplex	98.
ophthalmie medela pa-		99	
gina	139	paralysis incurabilis	
oppilatio et apostema		quæ	95
quid differant	339	paralysis ex quibus po-	
oppilationis causa et si-		tissimum humoribus	
gna	285	pag.	98. 99
oppilationis epatis cura		paralysis seu spasmus præ-	
pag.	291	sagia in infantibus	
ὀπίδοτος	105	pag.	95
oris descriptio et pro-		paralysis cura	91. 92.
prietas	157	94. 99	
oris foetorem curandi ra-		paralysim seu spasmus	
tio	159	præueniendi ratio pa-	
ὀρθοπνοία	210. 217	gina	95
orthopnoeae causa	pagi	parotides quid	478
		c	pedum

INDEX.

pedum inflatio comune	phrenesis quid	52.53
accidens in hydropē		54.55
pag. 299.308	phrenitidis causæ	55.
pernio 484		58.59
peripneumonia qd 184	phrenitidis differentiæ	
per pneumonia effe:	tres	54
ctus eodem	phrenesis cura	65
peripneumoniæ medici	phrenesis ex pleuresi	
na eodem	proueniens duobus sit	
pestilentialis febris ua-	modis	60
riæ causæ 619	phrenesis & pleuresis	
pestilentialis feb. cura	quid differant pagi-	
pag. 620	na	59
phlebotomia nõ necessa-	phrenitidis signa pagi-	
ria nocet 624	na	57.58
phlegma sanguis secun-	phrenesis quos maxi-	
do coctus 537	mè infestet	60
phlegma non naturale	phrenesis frigida idem	
quadruplex 587	Galeno quod lethar-	
phlegma et sanies quid	gus	48
differant 206	phrenesis accidentia pa-	
phlegmone quid 190	gina	61
phlegma cum sit frigi-	phthisis 183.186	
dum quomodo febrē	phthisis quid	595.
gignat 559		598
	phthisis	

INDEX.

phthisis naturalis & non naturalis pagi- na	595	pilula Galeni mirabiles dictae	129
phthisis, quae per se est morbus, causae pagi- na	599	pilula soluētes colicam subito	352
phthisis cum febre pa- gina	eodem	pilula Damasceni pagi- na	181
phthisis multis modis nascitur	186. 190. 191	pilula Regis Siciliae, & earum uirtus	42
phthisis seu peripneu- moniae uaria signa pa- gina	187. 192	planci	484
phthisis qui maximè ob- noxij sint	188	pleuresis uera & non uera	227. 230. 232
phthisis cura	185. 187. 188. 189. 192	pleuresis quid ab empy- emate differat	238
pica morbus unde pagi- na	261	pleuresis & peripneu- monia quid differant pag.	238
pilula capitales uariae pag.	37	pleuresis uerae signa quinque	231. 232
pilula praeseruantes sto- machum	271	pleuresis unde nascatur pag.	226. 227. 228
		pleuritis	223. 225. 227. 230
		6 2 pleuri-	

INDEX.

pleuritis integra	223	456.457	
pleuritidis cura	224.	pollutionum nocturnali	
225.226.228.234.		um cause	426
237		pollutionum nocturnali	
pleurectici morbi medi-		um cura	428
catu difficiles	185	porrigo quid	477
pleuritica membrana		porri nocent dentibus	
pag.	223	pag.	158
pleuritis non uerae si-		porgesmos, qui aliás pri-	
gna	233	apismus	420
pleuritidis materia co-		polypus	481
gnosendi ratio	233.	polypofus	481
238		priapismus quid	417.
peripneumonia	183	priapismus & satyria-	
podagra ab arthretica		sis cōueniunt inter se	
differt	451.453	& differunt	425
podagra quid	451.	priapismi cura	419
457		procela	483
podagra quos potissimū		psora quid	475
infestet	452.456	pterygiū morbus	482
podagra, chiragra, scia-		pulmo insensibilis	229
tica, gutta idem sunt		pulmonis medicina pa-	
pag.	466	gina	193.194.195
podagra medicina pa-		pulus pro recuperatio-	
gina	454.455.	ne usus	142
		putre	

INDEX.

putredinum mater 122

putredo & eius causæ

pag. 539.540

Q

Quartana tribus

modis cogno

scitur 215. &c.

quartana 574.578.

581

quartanæ cura 576.

583

R

Ramex 482

raucedo 178.

179

regius morbus 517

regius morbus quare di

ctus 318

renalis dolor 350.351

renum ulcera 397.

403. 404

renes purgantia 393

renes 390.402

renes duplices quare

pag. 390

renum apostema 295

renum medicina 406.

407. &c.

renum passio trinomi-

nis 405

renum passiones tripli-

cis generis 403

rhagus 382

rheuma 113

rheumatismi cura 113.

117.118

rigor quid 538

rigoris 202

ros syriacus 620

S

Sahaphati, & eius

cura 496

sahaphati 124.125

sal Marcelli & eius con

fectio 43

sal sacerdotale, & eius

confectio 42

salus quid 109

sanguine mittēdotenen

dus modus 235

c 3 san-

INDEX.

sanguinis fluxus ex na-	465	sciaticæ medendi cano-	
ribus quando utilis,		nes	468. &c.
quando non	156	scrotum quid	483
sanguinis fluxus cum		scrophula morbus pagi-	
menstruis	439.	na	479. 490
	443	scrophulæ cura	491
sanies & phlegma quid		scrophulæ & glandulæ	
differant	206	differunt	490
sansugium quid	217	seminis nimia profusio	
sarocela	483	pag.	419
satyriasis	417	seniores quare sicci	
satyriasis cura	418	pag.	597
satyriasis & priapis-		serpigo	484
mus conueniunt inter		siliqua Aegyptia et cas-	
se & differunt pagi-		sia fistula differunt	
na	425	pag.	621
scabiei remedia	485.	singultus cura	277
	486	singultus	262.
sciatica, podagra, chi-		& 266	
ragra, gutta idē sunt		singultus uariæ causæ	
pag.	466	pag.	262. 276
sciatica passio	455.	singultus post diarrhœ-	
	464	am malus	277
sciatici qui	452	sitis corruptæ stomachi	
sciaticæ causæ	464.	complexæ	

INDEX.

complexionis signum	107. 110	
pag.	264	spasmus unde oriatur
sitis quid secundum Gale		pag. 104. 105
num	269	spermatis augmentandi
sitim pellens medicina		ratio 426. 427
pag.	272	spleneticorum urina pa
soda quid	41	gina 337
soldania quæ & cachila		splenis extenuatio bona
pag.	314	pag. 335. 337
somniculositas duplex		splenis quatuor uirtutes
pag.	49	pag. 333
somnus	143	splenis pinguedo mala
somniculositatis causa		pag. 335. 337
triplex	49	splen sine uitæ periculo
spasmus ex inanitione		homini non adimitur
incurabilis	110	pag. 329
spasmi cura	105. 106.	splenis morbi 329.
III		332. 336
spasmus infantes & se-		splenis ægri effectus &
nes nō infestat	106	accidentia 338
spasmus triplex	107	splenis apostemata pa-
spasmi causæ eodem		gina 334. 335
spasm. post uulnus mor		splenis morborum cura
talis est	108	pag. 330. 331. 335.
spasmus quid	104.	336. 339. &c.
		ε 4 splen

INDEX.

<i>Splen</i> instrumentum ri-	<i>Stomachi</i> debilitas est
sus 332	causa omniū corpo-
<i>Spleneticus</i> 334.335	ris morborum 265
<i>Stomachum</i> confortans	<i>Stomachi</i> debiliās deter
electuarius 272	rima eodem
<i>Stomachi</i> partes qd dif-	<i>Stomachum</i> præserving
ferant 258.267	pilulæ 271
<i>Stomachi</i> sanitatis ma-	<i>Stomachi</i> subversio pa-
gna habenda ratio	gina 266
pag. 262	<i>Stomachus</i> nutritur tri-
<i>Stomachi</i> partis inferio-	bus modis 263.264
ris morbi 268	<i>Stomachus</i> 254.255
<i>Stomachi</i> actiones 510	<i>Stomachi</i> ægritudines
<i>Stomachi</i> laborantis me-	pag. 267
delæ 256.257.	<i>Stuporis</i> cura 109
265.269.270	<i>Stupor</i> quid eodem
<i>Stomachi</i> diuisio 258.	<i>Synochus</i> quid 607
267	<i>Synochi</i> tres species pa-
<i>Stomachi</i> morbi commu-	gina 607.612.615
nes & proprii 258.	<i>Synochus</i> & <i>sinecis</i> qd
259.260. &c.	differant 608
<i>Stomachi</i> remedia pa-	<i>Synochæ</i> febris cura pa-
gina 274.278	gina 611.612.616
<i>Stomachus</i> paterfamili-	<i>Synochus</i> putridus pagi
as dictus 254	na 613.614
	<i>Synocha</i>

INDEX.

<i>synocha inflatiua</i>	613.	<i>tenesmon</i>	369.	<i>Et eius</i>
614		<i>cura ibidem</i>	374	
<i>syncopim curandi ratio</i>		<i>tertiana syncera</i>	528	
pag.	244	<i>tertiana protensa</i>	eodē	
<i>syncopis causæ</i>	245.	<i>tertiana duplex</i>	529	
248		<i>tertiana quos Et quādo</i>		
<i>syncopi qui maximè ob-</i>		<i>maximè infestet pa-</i>		
<i>noxij</i>	249	<i>gina</i>	529.531	
<i>syncopis confirmata in-</i>		<i>tertianæ cura</i>	529.530.	
<i>curabilis</i>	eodem		533.543.545. Et c.	
<i>syncopis quid</i>	244.	<i>tertiana pura Et non</i>		
245.248		<i>pura</i>	522	
<i>syrupus ualens pleureti-</i>		<i>testiculorum uulnerum</i>		
<i>cis</i>	239	<i>cura</i>	423	
<i>syrupus sancti Ambro-</i>		<i>tetanus quid</i>	104.	
<i>siij</i>	546		108	
<i>syrupus contra oppila-</i>		<i>tetani duæ species</i>	104	
<i>tionem</i>	192	<i>tetratæus</i>	573	
<i>syrupus ad epatis cale-</i>		<i>τετραφάρμακου πα-</i>		
<i>factionem</i>	eodem	<i>gina</i>	383	
<i>σύντηξις quid</i>	242	<i>tonsillæ</i>	164	
<i>subeth</i>	47	<i>tormina lethalia</i>	361	
<i>succubus</i>	77	<i>tormines dixit Nonius</i>		
T		<i>pag.</i>	359	
T		<i>torturæ cura</i>	110	
<i>Abes quid</i>	517			
		G S	<i>tremor</i>	

INDEX.

tremor quid	103	et exterior	203
tussi medendi ratio mul-		uetris fluxu cōprimens	
tiplex	180	medela	545
tussis	173	uetris fluxus in hydropē	
tussis ab altitudine di-		mortalis	301.308
sta	174	uetris fluxus, secundū A	
tussis uariæ causæ	174.	uicennā triplex	367
176		uetris fluxu curadi ratio	
tussis remedia	174.	pag. 368.373.374	
179.180.181. &c.		uentris fluxus uariæ cau-	
tussis uetustæ remedia		sa	372
pag.	175	uerruca	478
tussis aut superne aut in		uermes in intestinis pa-	
ferne aduenit	176	gina	366.367
tussis quid	177	uermiū cura	377.378
tussis pectori, quod ster-		uerrucaria herba	479
nutatio cerebro	178	uertiginis causæ	38.39.
tympanites	295	40	
tympanites cura	311.	uertiginis curatio	39.
316		40.41	
V		uertigo quid	37.39
VENARū apertio		uertigo in senibus nūcia	
fit tripliciter		apoplexiæ	40
pag.	201	uertigo quid differat à	
uenarū ruptura interior		soda	41
		uesica	

INDEX.

uesica	390.391	gina	266
uesicæ apostematis si-		uomitum infantium iu-	
gna	401	uans	273
uesicæ in cute, & earum		urina sanguinolenta qua	
cura	494	tuor modis	298
uesicæ ulcera	395.	urinae prouocatio & ex	
396.397		tractio	394
uisus confortatiui	140	urinae ardorem pellens	
utiligo unde dicatur		medicina	414
ibidem		uulua & eius magnitu-	
utiligo quid	477	do in uirgine & de	
ulcus in uesica	396.	sponsata	433
397		uulue ostium	432
ulcus in renibus	397.	uulue apostemata &	
403.404		uulnera	442
umbilici infantis usus		uulue remedia	434.
pag.	344	435	
unguentum curas pleu-		uulue morbi	433,
resim	239	434	
uomere sanie ex stoma-		uulnera diaphragma-	
cho periculosum pa-		tis curatu difficilia	
gina	266	pag.	229
uomitus quid	263.268		
uomitus differentie pa-			

Finis.


E R R A T A.


Pag. 35. linea 1. qui. 39. 4. ne. 42. 3. hædis.
 78. 22. uolens. 82. 14. grauis. 91. 3. Cyprianus
 92. 16. abierint. 94. 13. opopanacis. 105. 17. fa-
 ctos. 113. 7. distillationis. 122. 12. Gallia. 123. 7.
 Pœnis. 125. 14. uolatica. 135. 20. albuginis.
 140. 8. candidi. 136. 3. Pani. 147. 6. ab. 157. 4.
 uociferantur. 157. 12. quidam. 160. 9. corrodan-
 tur. 167. 14. uidetur. 175. 20. dormitum. 178.
 22. multiplicatur. 184. 18. humida. 201. 17. Eie-
 ctio. 213. 13. ὀρθόπνοια. 213. 21. defectione. 233.
 15. pleuritidis. 265. 22. bulimos. 280. 11. similia.
 287. 18. apostemata. 292. 1. exiccatum. 348. 23.
 prohibet. 367. 19. quædam. 369. 24. pro sicut le-
 ge scilicet. 381. 11. quidam. 398. 25. coadunantur.
 451. 24. ἄγρευς. 474. 19. pruritu. 478.
 15. Sylius. 480. 4. nodis. 523.

Ex traditione autorum
 recentium.

F I N I S.

3. boedis.
yprianus
5. 17. 14.
4. 12. 7.
luginis.
1157. 4.
prodana
um. 178.
17. Eic
one. 233.
finitia.
48. 23.
sicut le
manus.
18.





SIMPHO

RIANI CHAMPERII, SERENISSIMI ducis Calabriae & Lothoringiae, &c. medici primarii, opus de morbis particularibus, à capite usque ad pedes, Liber I.

C A P. I.



VI humanos regit aëther, & cuncta gubernat, ille adsit propitius, ac felix nobis, in cuius nominis gloriam nostrarum lectionum letum auspicemur exordium. Studium cunctorum mortalium precipuum esse debet, ut noscant atque declinent quae mala cernantur & noxia, asciscant & amplexentur, quae bona sunt & salutaria. Quibus rebus maxime opus esse intelligo, si quis Philosophiam, ac medicinae artem laudaturus sit, utranque proculdubio, & excellentissimam omnium & humano generi salutarem. Est enim Philosophia, ut Graeci tradunt, uere laudatarum omnium procreatrix quaedam, & mater artium, & donum omnium longe praeclarissimum, ab immortali Deo diuinitus

A

con

concessum mortalibus, lux uera illustrans hominū
mentes: cui tanquā reginæ assistunt reliquæ om-
nes, et ueluti ancillæ, utq; pedissequæ obsequuntur.
Quid de medicinali sapientia mul. a? Hæc illius co-
mes, hæc uernacula soror, & uera philosophiæ as-
tipulatrix est, quæ una disciplinarum maxime fuit
omnium humano generi salutaris, & magnis pri-
scis quoq; tēporibus celebrata præconijs, quæ pri-
mum celeberrimo autore, teste Plinio, inuentores
suos cœlo dicauit, hæc enim propter summam eius
utilitatem, tanti æstimari à ueteribus consuevit, ut
pro Ciceronis sententia, Deorum immortalum sit
inuentio consecrata, ut Apollinem, quem tanti fa-
bat antiquitas eiusce artis inuentorem primum fuis-
se tradant, quem secutus Aesculapius Medicinam
quoq; uehementer auxit. Verum (ut omittā priscos
illos, qui primi uel inuenisse hanc artem, uel perdi-
tam reuocasse, uel cultam amplificasse perhibētur,
Podalirium, Machaonem, Orphæum, Musæum, He-
siodum, tum Hippocratem Coum, Galenum Perga-
menū, præclarum Auicennam Hispalensem, Ascle-
piadem, Erasistratum, aliosq; penè innumerabi-
les, qui maxime admirationis sunt habiti, quos lau-
dare malim quā cum cæteris comparare) id Gyl-
los nostros & Italos recentioris memoriæ medi-

cos

eos ueniam. Gloriatur Gallia Celtica Bernardo Gordonio. Gloriatur Ioanne Tornamira. Belgica Gallia Iacobo de Partibus, & Ioanne de sancto Amado. Patauium Petro Ebano. Florentia Thadeo suo & Trufiano. Christophoro de Honestis, & Bertruccio Bononia. Forum iulij Iacobo, Verona Gerardo Bolderio, Ioanne Herculano: nec parum etiam amico nostro Alexandro Benedicto. Alij præterea populi alijs. Sena uero una in primis iure gloriari possit duobus luminibus Hugone Bentio, & Bartolo Turco quorum ingenium tota admiratur Italia. Sunt & alijs hodie tam apud Italos quàm Gallos, quos possum monstrare, sed nolo blandiri uiuentibus. Medicina igitur res est sacra. Nam si & nobilis, & pulcherrima omnium illa cognitio est, quæ & nobilitate subiecti, & splendore præstat, & certitudine quadam demonstrationis antecellit, iure medicina plerisq; alijs anteponenda est, quæ diuinum opificium, id est, hominẽ & totius humani corporis secreta rimatur: fabricam præclarissimã perscrutatur, & compagem eius diuinæ compositionis totam patefacit hominem, id est ueram Dei conditoris imaginem seruat, iuuat, languenti salutem atq; incolumitatem præstat, & quod uere diuinũ est, mortuos quodammodo medicinali ope à pernitie, atq;

ab interitu uendicat, & omnia perspicuis, & certissimis documentis ostendit, hanc qui uere, & salubriter profitentur, summis sunt honoribus effrendi, & omni laude decorandi.

De sectis medicorum. Cap. I I.

L T quoniam de medicinae generibus incipit metio, non incongruum mihi uidetur, quoniam Graeci termini sunt, ea hic in medium afferre atque interpretari. Tripartita igitur est medicina, quaedam est λογική seu rationalis, Alia μεθολική. Tertia εμπειρική, uti Aulonius Gallus duobus carminibus complexus est. Triplex quoque forma medendi. Quae logos & methodos, cuique experientia nomen. Logice uel rationalis latine professores (ut inquit Celsus) haec esse necessaria proponunt. Abditarum & morbos continentium causarum notitiam. Deinde euentuum, post haec etiam naturalium actionum, nouissime partium interiorum. Inde logicus medicus, qui & domesticus dicitur. Empirice uero quoniam εμπειρία experientiam significat, inde nomen accepit, inde Empirici de quibus Celsus ita loquitur. Contra hi qui se Empiricos ab experientia nominant, euidentes quidem causas ut necessarias amplectuntur, obscurarum uero causarum & naturalium actionum questionem ideo superuacua

Superuacuum esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit, non posse uero comprehendere patet ex eorum qui de his disputarunt discordia, cum de ista re, neque inter sapientiae professores, neque inter ipsos medicos conueniat, haec ille. Tertia autem species methodice intermedia est, ac ueluti in confinio utriusque collata, dum sit quasi quaedam uia, quae contemplatrix est eorum quae in morbis communis est, methodos enim uia breuis dicitur, inde methodicus medicus, quem perperam methoicum uocitant.

Medicorum alia secta. Cap. III.

Medicinam Plinius naturalis historiae libro **XXIX** in tres partes diuidit, et fuisse tres sectas medicorum ostendit. Primam dicit Cliuicem quae uictu et uenenis corporibus medetur. Alia tetralepticen quae unguentis. Et empiricem uel melius Empiricen de qua dictum est. Cornelius autem Celsus ita tripartitur, una quae uictu. Altera quae medicamentis. Tertia quae manu medetur. Primam, id est dieteticam. Secundam, pharmaceuticem. Tertiam, id est chirurgicem Graeci nominaunt, haec ille. *χρῆστος* est medicina manualis. Dietetica uictu medetur. Pharmaceutice uero medicamentis. Hippocrates Couis templo Aesculapij

A 3 cres

tremato, ut Varro perhibet, medicinam eam instituit: quæ Clinice uocitata est. Debet autem inquit Antonius Musa, medicus dieticus & clinicus scire quatuor tempora causarum omnium februm, ut initio, augmento, statu, & declinatione. Clinicus maxime debet intelligere pulsus arteriarum, & iudicia urinae. In his siquidem intelligitur genus febris, & origo causaq; & temporis ratio, uita mortisq; professio.

De rationali medicina quam logicen uocant. Cap. IIII.

Rationales seu logici ratiocinantur & conantur rerum causas perscrutari duce scientia quæ triplici procedere ordine perhibetur. Prima à finis notione, quæ fit per resolutionem. Secunda ex compositione eorum quæ per resolutionem inuenta sunt. Tertia ex diffinitione dissolutionis, quam proprie uocandam doctrinam Heraclides Erythreus putat. Eam uerò quæ per compositionem ipsi attentarunt Herophili, & nonnulli Erasistratij, Atalcusq; Atheniensis. Ante Galenum ab ea notione quæ à fine sumeret initium nemo scripsit, unde tamen artes omnes uia quadam doctrinae consistunt. At de medicinae quidem inuentione haecenus, nunc quid sit inspiciamus.

Me

Medicinæ diffinitio. Cap. v.

Medicina scientia est sanorum, & aegrorū
 & neutrorum corporum, ut scientiæ no-
 men communiter, non utiq; peculiariter
 sit intelligendum. Sanum autem & aegrum & neu-
 trum ita accipiendum, ut singula trifariè dicantur,
 ut corpus, ut causa, ut signum. Alij uiam quandam
 esse aiunt medicinam, qua cognoscitur si corpus a-
 strictum est digerendum esse, si laxum continendū,
 si uerò mixtum uitium habet, occurrendum subin-
 de uehementiori malo, & aliter acutis morbis
 medendum, aliter uetustis, aliter incrementibus, al-
 liter subsistentibus, aliter iam ad sanitatem incli-
 nantibus.

De subiecto medicinæ. Cap. vi.

Sicut ars omnis suum habet subiectum et
 finem, ita medicina subiecta quidem cor-
 pora, & medelas, finem uero sanum cor-
 pus efficere. Diuiditur autem à plerisq; medicina
 in partem inspectiuam & actiuam. At inspecti-
 uam rursum distribuunt in Physiologicā, Acthiolo-
 gicam, & Semiomaticam. Actiuam porro in sanan-
 di uiam, medicandiq; rationem. Has partes ad-
 huc subdiuidunt, ut Physiologicum in elemen-
 ta, complexionēs, quæ temperamenta quoque

A 4 appella-

appellamus, potentias, humores, membra. Aethiologicum in præcedentia imperium habentia, & comprehensoria. Itidem etiam semiomaticum, in memoriam reuocatiuum, & discretiuium, inq; futurorum deprehensionem. Sanandi autem uia intuendâ pueritiam, ætatem mediam, & senilem, horumq; uictum opportunum. Medicandi autem ratio in medicamine uictum, & manus operam, quam ὁ ἰατρίης dixere Græci.

De corporis humoribus. Cap. VII.

Humanum corpus quatuor constare elementis receptū à cunctis est, sanguine inquit, pituita seu phlegmate, flaua et atra bile, hæc (ut nostri theologi ferunt) ante primi hominis culpam tanta harmonia continuata erant, ut ex ipsis neq; mors, neq; morbus, neq; molestiæ quicquàm emergeret. At soluta hominis in Deum obedientia soluta est, & humorum huiusmodi pax, dissipata cōcordia. Cum igitur sibi hæc elementa constiterint, conqueuerintq; tum sanus homo esse perhibetur. Cum uero inuicem sese protrudunt redundantia, & subtractione, tum demum mortales morbo oblanguescunt, redundante aut subtracto humore, altero humore imperante, altero autē oppresso. Est etiam cum duo miscentur elementa, ut in synocho febre,

febre, seu continua, nempe flaua bilis cum sanguine miscetur, fitq; tumultus animali ingens, & morbus intolerabilis, ut etiam pulsus in ipsa quatuor diuidatur elementa, principiumq; illinc nascatur. Proinde qui mortales ingentes ac celeres motus habent pulsum, id ex imperio habeant humorum flauæ inquam bilis, et sanguinis. Qui uero molliter aliquo pacto atq; clementius mouentur, id propter pituitæ & atræ bilis esse deprehenditur incrementum.

De sanguine. Cap. VIII.

Sanguis primus inter omnes humores quatuor, qui in humano sunt corpore, calidior est & humidior, aëris naturam referens, cæteros in sese commixtos humores continens. Qui si superet homines, tradunt pleriq; medici, inter quos precipuus Hippocrates, esse bene sperantes, innoxios, simpliciores, moderatos. Diuiduntur humores ipsi in ætates quatuor. Redundante namq; pituita cum sanguine, pueris perhibetur ad XLIII. usq; annos, inde bilis flaua cum sanguine dominatur ad annos XXVIII. inde ad annos XLIII. pars magna sanguinis cum atrâ bili exhibet imperium, inde ad supremam usq; ætatem pituita, moriente corpore, seclusoq; spiritu in sese redeunt elementa.

A S De

De Cholera seu flaua bili. Cap. ix.

Laua uerò bilis calida & sicca est, ignis proprietatem imitatur, cum externo calore presertim accenditur, uapore enim pturbat, ut in pnitiosa Causonide cōspicimus. Si uero flaua bilis superet homines, uel ei uicina bilis rufa, iracūdos, ingeniosos, acutos, lenes, macilētos, bene ualideq; cōcoquētes reddit. hos humores peculiaria cōceptacula cōtinēt, uenæ sanguinē, stomachus pituitā, iecur fel, uesica urinā, liē uero atrā bilē cōtinet.

De Pituita. Cap. x.

Phlegma frigidum et humectum est, aquæ uim possidens. Si superet homines cito canescentes, necnon cogitabundos, meticulosos reddet. Hic quoq; non alienum fuit ostendere Dioclis medici commotionem ad Antigonum regem, quam insignis medicus Paulus Aegineta operi suo putauit inserendam, & Antonius Musa Augusti tempore florens secutus existimauit recensendam. Quoniam, inquit, regem amantissimum disciplinarum diu uiuere cupere debemus, putauī comendū unde ortus morborum esset hominibus, de quibus signis deprehendi possent, necnon eis occurrere. Hyberno ergo tempore, quoniam tum affuit pituita, unde distillationes, uuae deiectio, tonsillæ,

filla, tuſſis, & id genus alia, commouemur uti calidis & maceratis cibis, ſinapi, ac eruca, pipere, plurima exercitatione plus cæteris temporibus, caput purgandum. Verno tempore creſcit ſanguis, febris de humoribus naſcitur extrarijs, ideo refrigerantibus utendum eſſe putant & amaris & arefacientibus, & quæ aluum cient, tepidum potendum. Aestate bilis ruſa alitur, quæ acutas excitat febres, Cauſon, continuam, tertianam, utendum ergo frigidis & ſuauiſſimis & bene olentibus, quæ facile concoquantur. Bibendum frigidum, & aqua multa, dilutum uinum, à coitu abſtinendum ueneris, quo uis uirtuſq; ſtomachi minuitur infringiturq; ac ſubit corporis tremor. Autumno alitur bilis atra, unde ſtomachi pituita febresq;. Augetur ſel, citâda ergo aluus, euomere aliquândo prodeſt, uenerê nō affectâdâ putât. Qui per hyemē atrocius ægrotant, aduētate Vere plerūq; moriūtur, q̃a quos humores noxios cogebat contrahebatq; frigus, eos calor relaxat, quia deſluere nō quæūt, iâ dilabātur neceſſe eſt. De Melancholia quā Latini atram bilem uocant. Cap. XI.



Tra bilis ſicca & frigida eſt, terræ naturâ cōtinēs, hæc ſubdolos, tacite iracūdos, auaros, timidos, tristes, ſomniculoſos, ſæpe

sæpe inuidos facit. Et si humores omnes sanguis contineat, qui unà per omnes uenarū riuulos, plus minusue pro corporis habitudine diffundi in singulas corporis partes recta ratione comprehendimus, qui membris alimoniam subministrat adeo necessarij, ut eorum quocunq; aut per uim aut sponte priuetur homo, eum in pernitiem agi certum sit, ut atrabili tota reddita, per uenas itaq; & meatulos quoscunq; alimentum resudans, quemadmodum aqua per crudiusculum uas fictile dum apponitur humor, aut simile fit & demū unitur, ut uerbis Galeni utar, in carnem conuertitur, aut aliud simile membrū. Ex calore et frigore consistens, ex quo fit ut caro ab igne resoluatur. Calor enim non ex quo libet carnem facit, nec quolibet modo aut tempore, sed ex materia apta, & ut apte & non apte effici potest.

Corporis humani diuisio secundum antiquos. Cap. XII.

Diuidimus, inquit Diocles, humanum corpus in quatuor, caput, thoracē, uentrem, atq; uesicam. Cum ergo caput lāguor aliquis inuaserit, signa hæc apparebunt: superciliorū grauitas, oculorum tenebræ, dolor capitis uel oculorum, pulsatus temporum, tinnitus aurium, oculi lachryæ

lachrymosi, facies obtusa, narium obstructio, dentiū
gingivæ sublatae fiunt. Cum hæc signa apparebunt,
caput purgandum erit, medicamine quidem nullo,
sed hoc modo: Hysopi uel origani capita cōterito,
in aceti uncias duas, aquæ dulcis unciā, postridie co
quito, ut ad unciam modo redeāt, inde ieiunus gar
garizato, & tepidum ore contineto, quoad omnis
extrarius humor ē capite in terram effluat, aliquot
id facito diebus, cum facies, linteo calido caput te
gito. Præterea et cum mastiche æquali pondere tri
ta aquam calidam dato, ut in calido gargarizet cu
biculo. Dato & sinapi tritum eodem modo garga
rizandum. At negligentibus eueniunt oculorum im
becillitas, aurium dolor, in collo strumæ, cerebri op
pressio, suffocatio, uua, angina, fluxus capillorum,
pectoris stridor, hulcera capitis, uox minuitur, den
tium dolor oritur, nares opplentur.

De accidentibus pectoris.

Cap. XIII.

CV M circa pectus aliqua causa mala gigno
nitor aegritudo, hec signa erumpunt: su
dor per totum corpus nedum circa thora
cem, lingua crassescit, salsescunt, amarescunt uē spu
ta, uiridescit latus, dolent scapulæ, dolores nulla ap
parente causa insurgunt, frequenter oscitatur, uigi
lia

lie sequuntur, suffocationes, sitis non quiescitur, sae-
 tis ex sententia, insomnis, rigor pectoris, brachiorū.
 Et manuum tremor, pruritus corporis, tussis ari-
 da. Hunc languorem ita curato, ut primo cibus po-
 tusq; sumatur tēperatus, ac mediocris præsertim
 in coena, postbidie eius diei ieiunus uomitum ciet,
 quod qui uelit, prius radículas tenues māduces, na-
 sturcium, mētham, sinapi, portulacam, inde aquam
 tepidam cum aceto potet, atq; ita uomat. Curam
 negligentibus, laterū dolor insurgit Et pulmonis,
 bilis atra, febres acutæ, deliriū, lethargus, lienis ui-
 tium, epatis languor, singultus, plurima inter dor-
 miendum inquires.

De uentris languoribus.

Cap. XIII.



V M uenter languet, hæc se efferrunt sig-
 na: dolor intestinorum, fastidium Et toti-
 us corporis uexatio, cibus Et potus ama-
 rus uidetur, olfactus amittitur, labor in toto corpo-
 re, febricule paucae, splenis ardor. Curato ita uictu
 citra medicamen, plus enim prodest Et tutior est
 uia cuicunq; morbo medearis, betarum pauca folia
 in mulsa decocta, alliaue cocta uel malua cea folia,
 uel lapatij, uel colliculos agrestes, Cūcta enim hæc
 aluunt

aluum subducunt. Quod si magis adhuc uelis, urticae admisceto dilutionem in omni decoctione, suauior nanque & citra periculum est, utilis uero leuis brassica in aqua multa decocta, huius succus potus cum melle & sale, ut sint acetabula quatuor aut ciceris aut erui, aqua cocta eodem pota modo ieiuno ore sumatur. Negligentibus eueniunt uentris profluuium, tormina, lenitas intestinorum, ileos, tertiana febris, ischias, podagra, apoplexia, sideratio, hæmorrhoides, morbus articularis.

De passionibus uesicæ.

Cap. xv.

CV in uesica morbus est, hæc signa commitari solent, paucio cibo satiatur, crebra ructatio, inflatio totius corporis, color inuersus, somnus grauis, liuida urina cum dolore fit, tumor dolorque circa collum. Cum talia signa eruperint, occurrendum est morbo, excitantibus urinam, aromatibus tutissimis, feniculi & apij radices maderificiende uino albo bene olenti, quotidie matutino tempore cum aqua potandi bini cyathi, dauci quoque, myrrhæ, elenij, quodcumque horum habueris tibi prosunt enim omnia, aquam pota ciceratiam cum uino, oleris quoque atrij radicem & graminis, paucula piperis.

piperis grana cum pastinaca, & petroselino in aqua coque, inde manduca, uel immitte etiam piperis aliquantulum in uinum album, ut ieiunus potet. Negligentibus eueniunt: lienis dolor, aqua inter costem, iecinoris dolor, calculi nascuntur, renum dolor, stranguria, uentris tumor, stomachus non concoquit.

De morborum temporibus.

Cap. XVI.

Morbi quatuor habent tempora, principium, ascensum, acumen, & declinationem; in his queritur principium & reliqua, nam nisi morbi naturam praesagiamus & temporis mutationem, non satis idoneam adhibere curam poterimus. Principium morbi est, cum natura non amplius opponitur, superata ab ea, quae gignit morbum, materia. Ascensus est cum dolores capiunt incrementum & febris intenditur, doloresque exulcerant. Acies seu acumen cum haec omnia tempus custodiunt, neque maius neque minus. Declinatio seu decrescio, cum dolores, difficultas anhelitus, & si ita euenit, tussis cum febre in corpore diu agantur, hic intendenda medico acies in aegri pariter & morbi naturam. Hippocrates in continuis tenuissimum uictum esse oportere dicit, ne qua inter concoquendum perturbatio orta, augeat morbum.

Præ

Presagia medicorum ex Hippocrate.

Cap. XVII.

Quarto die in febricitantibus. e naribus stil-
lās sanguis, tam malum quā bonum po-
test portendere. Vbi necdū cesset febris,
si labium, aut naris, aut supercilium contrahatur, si
non cernat, si non audiat aeger nimia imbecillitate,
proxima mors est. Si rigor inciderit necdum febre
abeunte iam imbecillo, lethale signum est. Quibus
non cessante febre spiritus difficultas accesserit, et
amentia, lethale est. Quibus in febribus uel alijs
morbis à proposito lachrymantur oculi, nihil alie-
num est, si non à proposito, alienum. Dolores et
pressiones humeri in cubita fluentes, sanguinis
missio tollit. In acutis morbis, cum febris fractæ re-
spirationes, malum. In acutis morbis partium extre-
marum frigiditas, malum. In sudore horror, nō cō-
modum. Si febris non à bili ortum habeat, aqua mul-
ta calida capiti infusa febris liberatio est. In non
cessantibus febribus si exteriora frigescent, interio-
raq; æstuent, sitisq; sit, lethale est, hæc Hippocrates.
Idemq; porrò quibus, inquit, in febribus hecticis fi-
unt rigores, difficultatē crisis habent, quibus acces-
siones fiūt qua hora abiuit febris, crastino die eadē
hora difficultas crisis, in quibus presertim febribus

B

aba

abscessus in articulos & maxillas irruerunt. Si in febre tumores non fuerint, & in gutture confestim suggillatio exoritur, lethale est. Guttur dolens subitariam indicat perniciem. Si ex febre collum distorquetur, ut uix se queat conuertere in collo tumor, lethale est. Febres non cessantes si tertio die ualidiores fiat magis periculose, quæ hoc modo relinquunt significant immunem à periculo. Quibus in febribus inter dentes glutinosa fiunt, hæc ualide fiunt febres. Quibus tussis arida irrumpunt in febre causonide, non admodum sitibundi sunt. Febres inguinalibus quos bubones Græci uocant, malum, exceptis quotidianis. Captum à causonide rigore adueniente liberatio subsequitur. A spasmo, uel tetano captum, febris adueniens liberat ab ægritudine. Febris in diebus imparibus nisi abierit, recidua esse consuevit. Frigidi sudores cum acuta febre irruentes, mortem significant proximam. Sudores febricitantes si inceperint boni & tertiani, & quintani & septimani & nouani & undecimani & quaterdecani & uigesimi septimani, & trigesimi quartani. Hi namque sudores morbos iudicant, si ita non habeant, laborem significant & morbi longitudinem, & reciduiam. Febricitanti sudor adueniens, febre non cessante, malum.

De

De motu, sensu, sanguine naturali & uitali. Cap. XVIII.

Distribuuntur aut inter se inuicē tria hæc: uena, arteria, neruus. De trib. oriūtur p̄cipijs aīal regētib. Ex cerebro qdē motus et sensus principiū est neruus. Ex iccore aut sang. Cuius fouēdi uena uas sanguinis. Ex corde quod uitalē p̄cipiū est, uas spiritus arteria, hæc sane p̄sentaneo inter se inuicē fruūtur adiūmēto. Vena si qdem fomentū neruo suggerit et arteriæ, arteria porro naturalem uenæ calorē et uitalē exhibet spiritū. Quāobrem nō est arteriā inuenire sine tenui sanguine, neq; uenā sine sumido & uaporoso spiritu. Diducitur & corripitur arteria harmonia quadam atq; ratione, motus principiū à corde sumens, sed diducta ex hærentib. uenis tenuem attrahit sanguinem, qui euaporans uitali spiritui suppetit alimentum. Rursus correpta æstum, qui in ipsa est, emittens per uniuersum corpus, ac meatus impellit. Nam cor quicquid purulentum, & glutinosum habet, per os & nasum euaporari educit.

De pulsus ortu. Cap. XIX.

Pulsus is uocatur motus uitalisq; potētia cuius cor est principiū, p̄cipueq; eius sinister uētriculus spiritalis nominatus;

Ingenitamq; sibi uitalem caliditatem omni corporis particulae per arterias distribuit, sicut iecur per uenas alimentum. Proinde aestuante corde confestim totum corpus contra naturam exaestuet & frigente friget.

De uirtutibus quæ in membris sunt.

Cap. XX.



Naturales potestates sunt quatuor: appetendi, retinendi, expellendi, & distribuendi. Quelibet siquidem animalis particula, suum ad se naturaliter trahit alimentum, & tractum retinet, & retentum in suam transmutat substantiam, & superfluum expellit. Inde totum corpus capit incrementum. Secernit aut atq; extrudit superfluum per excrementum feculentius, & per urinam, per uomitum, per sudores, per os, per nares, per aures, per oculos, per respirationem, perq; sparsa spiramenta per corpus. Instrumenta altitia sunt, os, stomachus, uenter, iecur, uenæ oēs, intestina, biles ambæ, & renes. Os primum uentriculo præparat alimentum, in tenues ipsum partes dentibus. & lingua discindens. Deinde obseruatum & concoctum alimentum à stomacho in uentrem demittitur, q; excipiens alius, separat utile & membris accomodat à lapidoso & materioso, & eo quod inutile sit membris, & utile quidem

quidem in humores, succosq; transmutans id remittit ad iecur per uenas emungentes & ad iecur riuulorū modū adducētes. Sūt aut̃ huiusmodi uenæ quæ a uentre alimentū ad iecur eliciūt, perinde atq; radices, quæ ex terra ad stipites euehūt alimēta. Assimilatur nāq; alius terra quæ alimentū suppetit stipitib. ut radicib. uenæ. Ceterū ab alio humorē excipies iecur ipsum cōcoquit, sibiq; similē facit. Sanguis per lienē purgatur, & uesicā fellis exceptricē, & renes. Liene quidē terrestre, & feculentū attrahente, sibiq; alimentū cōparante. Vesicula uero bilis exceptrice acutū ex alimento, quod in humoribus continetur, colligente.

Finis libri primi.

SIMPHO-

RIANI CHAMPERII

Liber II.

De Cephalga caput primum.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



VNC de corporis humani capite morbisq; loquamur, à uertice summo exorsi, ad imas usq; deuecti plātas, nomina modo referentes, nisi speciosum dictu atq; necessariū se

B 3

se

se nobis di. entibus offeret, quod prætermis-
 sū esse uideatur, nō ut resectorum memb. refera-
 mus historiam, quam plures nobis prodiderunt. At
 nostra tēpestāte insignis medicus oratorq; celebris
 Alexand. Benedictus nostri amātissimus, qui, ut est
 acuti ingenij, doctrina bene armatus, ita non minus
 diserte, q̄ grauitē anatomicē corporis humani to-
 tam cognoscendā tradidit, ad quā lectōrē mittendū
 existimamus. Nostrū sequamur institutū cuncta uti-
 liter pstringendo. Quoniā, admonente nos Plin. su-
 mus ad naturalū defectū nostri corporis mētionē
 adducti, p̄sequamur inceptū et humanæ uitæ morb.
 nō inutīli curiositate narremus. His enim enumera-
 tis itelliges penē ip̄osibile esse hominē uiuere sine
 morbo. Nā corporis et animi ualeitudines id cōmu-
 ne habēt, q̄ sanitas in utroq; uno mō attingitur, uir-
 tus enim animi, et sanitas corpis in quadā tēpie, hæc
 humorū, illa passionū est sita. Tēpies aut mediū qdā
 dā est, ac mediū uno mō attingitur, sicut linea recta
 uno mō fit flexa plurib. Et signum à sagittario uno
 mō tāgitur, p̄pterea, ut 2 Ethic. meminit Arist. Py-
 thag. dixerūt malū ad infiniti, bonū ad finiti naturā
 attingere. Vna ergo tēpie corpus bene ualeat, male
 aut p̄p̄e ifinitis, q̄ ex ipsis uocab. cōstat. Sanitas e-
 nim uno uocab. exprimitur, ac morbi nomina prope
 infinita sortiūtur. Adeoq; morborū numerus inua-
 lescit,

lescit, ut medici et qdē doctiss. atq; pitissimi in eis di-
 scernēdis ambigui falsa plerūq; pro ueris accipiāt,
 sed de antiquis pauca ē multis in mediū afferā. Ca-
 pitis partes exteriores his noīb. uocātur. dūmum ca-
 pitis uertex dicitur, qui aliqb. duplex repitur, ij ma-
 crobij et biuertices dicūtur. Βρεῦμα deīde siue sin-
 ciput in frōtem uergit, q; infantib. palpitāt. Frōs po-
 stea et oppositū occipitiū æquamentū capil. ad sum-
 mū uerticē Βρεῦμα diuidens, bina utrinq; tēpora,
 aures, oculi, anguli, exteriores paropiæ, iūiores q;
 qui fontes dicūtur unde lachrym. profluuium. Et Eō
 oculorū magnus ābitus. Supcilia quorū mediū μεσὸν
 φρενον dicitur à Polluce. Palpebræ in qb. lineæ rhi-
 tides et cilia, genæ deinde, malæ, nasus, ethmus. Na-
 riū iūterceptū, globolus, πτερυγία siue phene, buce-
 mystax, labia, os, mētū, quæ oīa faciē numerosæ uae-
 rietatis efficiūt. In capite interdū acutus et pestifer
 morbus est, cephaloē Græci uocāt. Cuius notæ sunt,
 horror calid. neruorū resolutio, ocul. caligo, mētis
 alienatio, uomitus, sicut uox supprimatur, uel sang.
 ex naribus, ut sic corpus frigescat, anima deficiat,
 præter hæc dolor intolerabilis, maximè circa tēpo-
 ra uel occipitiū, interdū aut in capite lōga imbecilli-
 tas, sed neq; grauis neq; piculosa, p hominis ætatem
 est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen
 mortiferus, qui uel uino, uel crudelitate, uel frigore,

uel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores
(ut Celsus inquit) modo in febre, modo sine hac
sunt, modo in toto capite, modo in parte, interdum
sic ut oris quoq; proximam partem excruciet. Præ
ter hæc etiam inuenitur genus quod potest longum
esse, ut humor cutem inflat, caq; intumescit & præ
menti digito cedit, Hydrocephalõ Græci appellât.
De Cephalæa ex traditione Arabũ &
Penorum. Cap. II.



Ephalæa dicitur dolor capitis inuetera-
tus quãdo est per totum caput. Hemicra-
nea autem appellatur dolor in medietate
capitis. Monopagia uero dolor in aliqua parte
capitis. Clauus autem in quacunq; parte minima
sit fixus. Cephalæa uero recipit diuisiones plures.
Diuiditur enim secundum loca & tempora, & se-
cundum causas suas materiales siue efficientes. Se-
cundum loca, quia quidam est dolor extra craneũ
existens, sicut in pelliculis & in carne supra crane-
um existentibus. Aliquando inter pelliculas sub cra-
neo uel in medulla cerebri. Item dolor capitis quan-
doq; fit secundum uiam Crisis, & quandoq; antece-
dit febrem uel concomitatur uel sequitur. Item do-
lor capitis quandoq; est morbus per se, et non cau-
satus ab aliquo morbo, quandoq; causatur ab alio
more

Morbo, quandoq; ab aliquo humore. Item dolor ca-
pitis quandoq; est ex sola mala cōplexione cum hu-
moris uitio, quandoq; ex mala complexione sine hu-
moris uitio, & quandoq; ex causa exteriori, quan-
doq; interiori. Et est aliquando ex causa existente
iuxta caput, sicut de causa priuata capitis, quandoq;
de causa remota in alijs partib. cōtenta sicut in sto-
macho, uel epate, uel in cæteris partib. Aliquādo an-
tem dolor capitis est à morbo cōsimili, quandoq; est
ex officiali. Omnes aut illæ causæ & diuisiones sua
habēt propria signa, quedā tamē accipiūtur ab in-
ditio patientis, sicut signa Cephaleæ ex causa exte-
riori, ut ex calore aëris, uel frigore, uel uigilijs, uel
somno multo, uel ex casu, uel ex percussione, uel
clamore, & usu cibariorum auctorum, ut est uinum
forte, porri uel allia uel nuces & cætera fumosa.
Quedā autem Cephalea habet signa à dispositio-
ne totius corporis, sicut quæ fit à causa interna, ut
quæ fit à repletionē humorum furiosorum calido-
rum, ut quæ fit à febribus, uel à crisi, uel à mala com-
plexione, uel à morbo officiali, ut est oppilatio uel
constipatio, quæ de grossis humoribus nascitur &
uiscosis. Illa autem quæ ex mala complexione sola
nascitur, tot recipit diuersitates & diuisiones, in
quot mala cōplexio diuidi potest, sic potest intel-

ligi de cephalæa humoralī. Iste aut̃ ægritudines maxime discernuntur p̃ urinas, et per circulum ⁊ granula in superficie urinae cōtēta. Quædā aut̃ cephalæa sunt cū pulsatiōe in temporib. ut hæ uidetur esse ex multa sang. ebul. uel ex multa uētositate. Alia aut̃ ē recēs, et hæc est facilis ad dissoluendū. quædā uero est inueterata, et appellatur galeata, et hæc est pessima, habet enim pessima accidētia. Vnde oculi ⁊ nervi eorum multum patiūtur, et sensus debilitantur, imò p̃mixtio ratiōis aliqñ inde puenit, huiusmodi ergo cephalæa frequēter incurrūt homines assueti cibus fumosis natura, sicut sunt nuces, et res ping. et homines assueti caput coopire. nō enim tam forte est caput, qñ p̃ assuesfactionē nimia coopturæ debilitetur cerebr. et fiat tenerius et debilius, q̃ si aliq̃s cōsueuerit paulatim desistat, et dissuescat in tēpato aēre. Si ex sang. sit cephalæa, calorē patitur in capite, grauitatē in frōte, ocul. rubescūt uenæ cū tota facie, et uenæ faciei sunt plenæ, urina rub. et ping. et corpus molle, et pulsus mollis. Si ex chol. rub. infra nares nimium habet calorē, et in lingua siccitatē, uigiliæ et sitis nō desunt, et maior dolor est in dextra parte. Si ex chol. nig. in sinistra parte erit dolor cū frig. uigilijs et grauitate. Si de phleg. sustinet grauedinē et spiritus grauē retentionē cū querela, ⁊ dolorē in occipitio. Cōstāt in. autoritate Gal. Nosse
opora

oportet caput diuidi in 4 partes. Sāg. i fronte domi-
natur, chol. rub. in dextra parte, phleg. in occipite,
chol. nig. in sinistra, in qb. modis cognoscendis me-
dicus opā dabit. Oportet aut intueri ætatem, et æ-
grotātis consuetud. et unde dolor natus sit. Si sit ex
capite cōsiderādum est ex quo sit humore. Si ex san-
guin. uel chol. rub. incidatur cephalica, nisi ætatis cō-
trarietas uel temporis, cōsuetudinis, et uirtutis oc-
currat. Si ergo ad phlebotomandum scarificemus,
plena palma ab utriusq; pedis calcaneo. Quæ uero
profunt chol. rub. profunt et sang. Quæ uero phle-
gmatis & chol. nigre proderunt.

Ex traditione scriptorum recentium
quos neotericos uocant.

Dieta in cephalæa et dolore capitis sit tē-
pata, ut sunt carnes pullorū, pdicis, fasia-
ni, turdi, merula, alaudæ, et minorū auū,
capreoli, annualis agni, porcorum extrema, scilicet
pedes et aures cū agresta, pisces squam. aquæ dul-
currentis, lupi, lucij, darci, dauracæ. Salsamenta,
parū cimini, petrosel. cū aceto. Vinum bene limpha-
tum. Exercitiū sit mediocre, multum enim iuuat ad
fumositatū respirationem. Nemo tamē plectoricus
multū moueatur, qā cito putresceret materia, et de-
ueniret ad feb. uel apost. Declinantia ad frig. sunt
portulacæ, lactucæ, scariolæ, maluæ, pruna, pira



Et poma cocta, cucurbita, cucumeres, melones.

Hemagogum sanguinem mundificans, et cholera purgans sic fit: Recip. Ceterac. politrice, adiantos, capillorum Veneris, hypericon, scolopendria, seminum frigidorum maiorum mundatorum, prunorum, uiolarum, iuiubarum, ana ꝑ 1. bulliant in aqua in cuius colatura cassie fistule, thamarindorum ana ꝑ 6. aut ꝑ 1. mannae electae ꝑ 3. coquantur, in cuius colatura dissolue rheumbarbari electi ꝑ 2. uel loco rheumbarbari, myrobalanorum citrinorum ꝑ 5. Et stet tota nocte sub diuo. Mane cum syrupo uiolato uel aqua praedictae decoctionis cum tota substantia accipiat. In confectione colagogi addatur istis absinthium in prima colatura et herbae magis frigidae. In secunda sem. lactuca, portulaca, papaueris albi, et loco rheumbarbari uel myrobalanorum potest poni scamonij ꝑ 1. secundum tamen uirtutem patientis. Istud haemagogum uel colagogum, quia parum differunt, potest dari singulis mensibus repletis cholera et sanguine siue sit in capite siue in stomacho, etiam in tertiana simplici et duplici et in calefactione epatis, sed non cum scamonio materia indigesta. In Cholera praesina et eruginosa datur trifera saracenica cum rheumbarbaro et praedicto colago. Ita quod apponatur tertia pars

lia pars colagogi propter adustionem. Si ergo ægritudo sit ex sanguine celebrata minutione & hæmagogi datione, dentur electuaria quæ cum mūdificēt & eius feruorem temperent, ut dyaprunis simplicis, zuccarum roß. et uiol. dyaceraceos, dyarhodō abbatis, dy apapaueris, triasantali, dyacitonitē frigidum, rosata nouella cum syrupo uiol. et composito ex herbis frigidis, uel oxizaccara uel syrupo acetoso. Sanguisuga imponatur in uena frontis aut in principio nasi inter duo supercilia, aut in fine nasi, & hoc si oculorum palpebræ graues sint, dolorem tollit. In dolore ex Cholera digesta materia cum syrupis dictis, post purgetur cum colagogis uel medicinis dictis. Tertia die detur rubea in sero. Quarta minuatur de cephalica dextri brachij, post radatur caput. Deinde sequantur unctiones, emplastra, et cætera adiutoria. Vngatur ergo caput cum oleo roß. uel uiol. & aceto, & succo semperuiui, corrigiolæ, plātaginis, portulacæ, succo uuarum immaturarum, aut cum puluere santalorum, rosærum, papaueris, hederæ terrestris temperatis cum muscilagine psyllij. In dolore fortissimo adiungendum est opium. Fomentationes fiant cum aqua decoctionis herbarum frigidarū & arborū. Et si dormire nequiverit cum oleo uiol. opium distempere-

mus

mus, et caput inūgatur cū oleo mādrag. A uīo abstia
 nēdi sunt si forti laborēt dolore, et frixis, salsis et as
 satis. Et fomētation nō adhibeātur, nisi benē certifi
 cato reumate nō esse causā, nec cōponi q̄ si sit prius
 curetur reuma, dein. dolor, aliter dolor augmētare
 tur, et morbus maior uel diuersi introducerentur.
 Dolore existente de phleg. digeratur materia cum
 oximel. cōp. ex rad. foenic. petrosel. raphāi. Apiū in
 dolore capitis et causis matricis apponi non debet.
 Garioph. calamēti, rutā, origani betonic. ex his fiat
 oximel, et detur oximel scyl. uel raphaninū uel aliq̄
 oximel diuret. et elect. Si est ergo ex phlegmate nā
 turali detur dyāt. pliris, dyamargar. Si est ex salso
 dyāt. cum dyaprun. ana, uel rosata cū dyacera seos.
 Incisiuiis frigidis ut syr. acetoso et oximel. sim. si ex
 dulci, eodē modo. Si ex acetos. uel uitreo, digeratur
 cū oxim. scyl. dyacimin. dyacalamen. et in oīb oximel
 ponatur thimus et rosmar. Materia digesta cū
 pil. aureis, uel arab. uel cū benedicta, uel picra, uel
 cū phlegmagogo uel hydrogogo q̄ idē est. Qd' sic
 fit. Rec. fenic. petro. apiij, dauci, carui, an. 3. i. absin
 thij si uis. M. i. q̄a purgat phlegma et colerā indiffe
 rēter. polipod. 3 s. sem. diuret. calid. an. 3. ij. si uolu
 eris q̄ purget p̄urinā, coquātur, colentur, colaturā
 misceatur. 3 s. myrobal. kebul. dimittātur tota no
 cte sub diuo, et mane apponatur syrup. uel oximel.

Et deposita actuali frigid. offeratur. Potest addi
 huic colaturæ agaricus. In dolore facto ex melan di-
 geratur materia cū oximel. simp. uel scyl. uel diure-
 tico quæa. Imodū in quartana de melācolia naturali.
 Et eodē mō fiāt purgationes, stuphæ, et opiat. ex-
 hibet. uel cū melagogo, q̄ sic fit: Rec. se scenic, petro-
 sel. apij, an. ʒ. iij. ihimi, epithimi, sene. cuscute, an.
 ʒ. i. s. ex his potest fieri oxim. Si uis facere cōforta-
 tiuū appone garioph. piperis, macis, ciperi, yreos,
 corticis fraxini, cardamomi, nucis muscate et simi-
 lia secundū q̄ tibi uidetur, uel ex illis solis quassatis
 fiat decoct in uino uel aqua usq; ad cōsumptionē u-
 nius, et colētur, colaturæ addatur myrobal. ind. ʒ.
 s. mane offerantur, uel lib. s. colaturæ adde. ʒ. 2. s.
 ind. in alia ʒ. s. lap. lazuli, dimittantur tota die sub
 diuo. In crastino in aurora offeratur resolutio my-
 robal. Et cum habet tres assellationes, Et attracti
 fuerint humores, detur alia pars, ut humores attra-
 ctos per compressionem ducat. Id potest dari sanis,
 lapsis, et ægris melācolicis de mēse in mensem, Et
 etiā in feb. quart. et delicatis. Et si addātur prædictæ
 decoct. sq̄nanti et centaurij. ana. melior erit. Purga-
 ta materia stuphetur cū herb. dictis in cura phleg-
 quib. addimus lauri et hederæ arboreæ. ana. ʒ. i. iu-
 nipi, calamēti, origani, arthem. ana. ʒ. i. s. Exeūti à
 stuphæ

stupha offeratur methridalū uel theriaca cum uinō decoctionis gamandreæ. Si ex multitudine ciborū & potuum doleat, uomitus prouocetur, et digestio confortetur, & aliquod oleum calidum auribus infundatur, fricatio fiat circa pedes, & lotio aquæ frigide uel aceti circa testiculos. Et cura ebriosorum eis subueniat.

De hemicraneā quam nouitij Emigraneā uocant. Cap. II.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

MOrbus dolorem immensum asserens fit in media cerebri parte, quem uocant hemicranicum, et frequenter in imperio dū paroxysmum agit. Fit autem ex influxu uaporum, uel humorum multorum, uel frigidorum, uel calidorum. Et aliquibus quidem extra caluariam doloris sensus affici contingit. Aliquibus uerò ad capitis intima penetrat. Aliqui porrò circa temporum musculos uehementer dolent. Cognitiones autem ex eis quæ de Cephalæa dicta sunt coniiciantur. Antiquam et difficulter solubilem Cephalalgiam, uel hemicraneā à primordio curare conuenit à sanguinis per uenam detractione, uel purgatione clysteris prius deijciendo. Dubium autem non est quin sanguine abundantes expediat lauare, sanguinem

2

à uena detrahendo, uitioso autem succo afflu-
entes purgare, atque ita localibus utendum ad-
miniculis perfricando, tum uestimento, tum digi-
tis dimidiam frontis partem, presertim quæ sunt
ad musculum temporum calefiat, ante tempus pa-
roxysmi hoc faciendo, post paroxysmum uero u-
tendum quæ hemicranica uocitantur. Calore enim
multo in doloribus significante contineri quippi-
am refrigerans, cum calor excesserit utendum est
satis calefacientibus, misceatur utrisq; confirman-
tium quod qualitatem habeat stipticam. Optimum
autem calefaciens est unguentum quod euphorbij
unciam habeat unam, ceræ uncias tres, olei dulcissi-
mi libram, illinito autem hoc partem frontis dimi-
diam cum musculo temporum. Longe autē utilissi-
mū est ad frigidas affectiones, ut sæpius ante bal-
neum semel utare, à dolore seruās incolumē, hos
iuuat, ita languentes etiam in aurem infusum tepi-
dum oleum euphorbij sensim iniectum, ut satis sit
in libram olei drachmas immittere 4. euphorbij.
Naturali autem quadam ratione uel potestate fa-
cit euphorbium languoribus hemicranicis ipsum
cum aceto dissoluendo. Si igitur dextrum tempus
doleat, perungito sinistrum, si doleat sinistrum un-
gito dextrū, & confestim sedabitur dolor. Aliud

C

Archis

Archigenis: Stœchadis herbā coquēdo cum aqua, uel hydromelle, dato cephalargicis & hemicranicis, utpote solū maximūq; adiumentū. Aliud eiusdē ad omnē capitis lāguorem: Cerui os exurendo, & dissoluendo cum rosaceo illinito locum, uel ocimū dissoluendo imposito, uel mentham cum aceto dissoluendo illinito bis in die. Aut lapathum agrestem & cicadas pariter dissoluito circum illinito tempora, & frontem, & statim mitigabis.

Aliud ad omnem capitis dolorem: Stercus hirundinum antequā in terram cadat cum luto in nido comperto, asperge aceto in uase ligneo & illinito. Aliud: Pyrathos capre (quod est stercus ipsarum) dissoluito, illinito & alligato, hoc facito mane & in meridie, & medeberis.

Ex traditione Pænorū & Arabum.

Eit quādoq; ægritudo praua dolorosa in medietate capitis aliquando in dextro, aliquando in sinistro, & fit fortis in commissura extensa in longitudine capitis, & accidit secundum plurimum cum periodo. Huius ægitudinis causa est eleuatio uaporis humorum, aut propter multitudinem eorum, quāuis sint temperati, aut propter caliditatem eorum, aut ipsorum frigiditatem,

ditatem, quamuis sint pauci. Et ex eis sunt quæ sentiunt dolorem in lacertis temporum suorum quasi tendantur. Et in quibusdam eorum sunt qui sentiunt dolorem uehementem adeò, donec ipsi non tolerant, ut cadant super eos manus omnino. Causa autem in illo est, quia hæc occasio est ægritudo paniculi continentis craneum capitis præter quod cutis sit uacua à dolore. Eleuatio autem horum uaporum & humorum fit in uenis & alaurida, id est, in uenis grossis, aut in arterijs, aut in utrisq; simul. Et fortasse expellunt mēbra quæ sunt intra craneū, scilicet cerebrū, & uelamina, supfluitates quæ sunt in eis ad exteriora, et fortasse eleuātur ad caput ex reliquo corpore uapores et humores mali. Confectio epithematis ad hemicraneā et dolorem capitis calid. Recip. Sem. hyoscyami, sem. lactucæ, sief memithe, ros. santal. faufel, radic. mādragoræ, opiū, fiant ex eis collyria, & distilletur ex eo in aurē cū oleo ros. & aceto uini pauco. Cōfectio caput purgij ad dolorē cap. et hemicran. cal. et dolorē aurī cū calid. & pulsatiōe. Rec. Opij, cāphoræ ana, fiāt collyria similia lentic & dissoluatur 1. aut 2. in oleo uiol. & distilletur in aurē & nasum et est bonū expertū. Cōfectio epithem. ad dolorē cap. frig. & hemicraneā ex uentos. grossa, & dolorē aurī frig.

C 2 Recip

Recip. Castorij, euphorbij, opij, styracis li-
quidæ, piperis, foliorum rutæ, calamenti, sinapis,
ana fiant trochisci & embrochetur, & dissoluan-
tur in oleo, & sit oleum costinum aut nardinum,
& dissoluatur cum aliquo de illis, & distillentur
in aurem quæ est in latere doloris. Auicenna po-
nit emplastrum cuiusdam mulieris narratum per
aliquos medicos quod est efficax, & fit ex decoctio-
ne radicum cucumeris asinini & absinthio in oleo
& aqua & ex decoctione fit embrocha, & ex sub-
stantia rerum fit emplastrum.

Ex traditione autorū recentium.

Pilulæ ad hemicraniam: Recip. Myroba-
lanorum citrinorum, chebulorum, indo-
rum ana ℥ 2. croci orientalis, mastiches
ana ʒ 4. scammonij ℥ 5. aloës epatici ad pondus
omnium, tēpera cum succo fœniculi, da cuncti dor-
mitum secundum uirtutem patientis, picra etiam
ualet multum. Aliquādo est dolor capitis cum mo-
lestatione magna, ut infirmus quasi sentiat percus-
siones & malleationes in capite, nec uocem, nec so-
nitum, uel lumen, nec splendorem pati possit, quod
ex duabus causis cōtingit, ut ex cholera rubea, uel
ex uentositate grossa si caput debile sit. Si ex chole-
ra rubea, est caliditas cum percussione nimia. Ex
uentositate,

uentositate, gravitas & tintinnositas. Morbus hic fit ex humoribus adherentibus craneo. Aliquando in superioribus cranci, ut cutis tacta dolet. Et nota quod radix papaveris masticata, humores capitis per nares purgat. Pilulæ capitales: Recip. Scammonij, mastiches absinthij ana, confice cum succo absinthij. Aliæ capitales ualentes capiti:

Recip. Aloës, colocynthidis, absinthij, succi fœniculi, mastiches, scāmonij ana, piperis longi, cētaurij, basiliconis, bethonicae, herbae perforatae, origani, ungulae caballinae, filicis, osmondæ, iringorum, radicis saluiae ana, tempera cum succo absinthij uel fœniculi, da 5. uel 7. Abstineant à cimino, aniso, et aromatibus, quia subleuant uapores. Utatur tamen uino odorifero & ueteri.

De uertigine, scomaticis. Cap. III.

Ex Posidonio & Archigene.



Vertigo est morbus capitis tenebrositate inducens qui Græcè σκωτωμα dicitur, quod à uerbo græco σκώτωμα deducitur, quod est uertiginor. Turbo etiam latine dicitur. Calidis enim & acutis uaporibus ad caput ascendentibus, et in cerebro animale spiritum uertentibus, primum quidem obtusitates quædam in oculis procreantur, inde etiam in auribus tinnitus,

C 3 continui,

continui, & audiendi difficultates. Præcipue hoc
euenit circa ciborum concoctiones exurgētibus ex
somno, intensa autem ægritudine fiunt oculorum
uertigines, & tenebræ oboriuntur, ut sibi uidean-
tur cuncta spectare uertiginosa, idq; accidit, cum
propere sedilibus exurgūt aliqua antecedente in-
concoctione. Diuturno autem læguore leui de cau-
sa obtenebrantur, adeò ut aliquando cadant, præ-
cipue circumuertuntur, quod alijs fit multis cōuer-
sionibus, hoc illis una, ac si quem alium circumuol-
ui uideant, obtenebrantur, & si turbinem uel quid-
uis aliud rotari prospexerint, idem subeunt, uiuēdi
siquidem spiritus circumuoluto incidit turbini. Mo-
uetur ipse quoq; illo circumlato, atq; ita inaequalem
& turbulentū & inordinatum humorē et spiritus
efficit motum. Ignari autē ægritudine cōsueti cohi-
bendo excremēta, & incōcoctiones, et iuges æstua-
tiones, et ebrietates languorē efficiunt. Comitatur
aut ipsos alui retentio, & ob hoc multa spiritalitas
& tenuium urinarū, & paucarū excrementū, ma-
teria caput occupante, ut plurimum sunt graciles,
& in omni iniectione turbidi. Si igitur sanguino-
lentiora uidebimur nobis in oculis spectare, ad ue-
saniam sunt accommodatiores. Sin autem purpu-
reum spectemus, ad comitiale morbum. Potentia
igitur

igitur ualida existente, & nihil aliud aduersetur, sanguis est detrahendus. si aegritudinis principium sit, & si etiam intercedens tempus aliquod, in sanguinis autem detractio cernendum nec globatim exhauriamus ob eam causam, quæ euenit collabendi, quare multis est utendum ablationibus ex interuallo. inter efficaciora autem purgamina, purgari solent concoctum fœniculum oximelle, habeat etiam diaphœnicon, et rutæ & scammonij compositiones, & gargarismata ex origano & oximelle. Inde etiam naribus cyclamini uel radicis bliti, si perdurarit, secato ad tempora supra aures arterias, prius subducendo aluum hiera, uel clystere. Nutrimenta sint boni humoris, quæ facile digerantur, sine flatu prorsus bona stomacho, & aluo bona, quæ urinam prouocent. Vinum paucum & album & tenuissimum, nec admodum uetus. His congruunt aluminosa suapte natura lauacra, maxima uero & prima & ultima horum custodia.

Ex traditione Pænorum & Arabum.



Vertigo & σκοτομια uisus est corruptela, & subito apparêt patientibus oia quasi uolubilia nebulosa seu tenebrosa.

Causa istorû nimia est humorû abundãtia cû uento

C 4 sitate

sitate mixta, humores isti cum uentositate mouentur, uel fumo in capite de quolibet mēbro sicut stomacho ascendente. Ioannes Damascenus: Pedes infirmi in aqua calida sunt ponendi, à uino abstinant, caulibus, lentibus, lactucis & similibus.

Auicenna: Quæ ex ipsa fortis est, similis est epilepsie, uerum tamen non fit cum spasmo sicut epilepsia. Et uertigo quidem frequēs proprie in decrepitis, nunciat apoplexiam. Et quandoq; soluit uertiginem Soda accidens. Et scias quod scotomia & uertigo cum prolongantur, tunc ægritudo est frigida. Cumq; paroxysmus excitatur, tunc adiuuatur cum fricatione inferiorum extremorum. Scotomia uero & uertiginem factas propter uacuitatem stomachi, sedat acceptio bucellarū infusarum in rob fructuum stipticorum. Haliabbas: Ex humore fit phlegmatico qui in uenis adunatur, quæ cerebrum circum obambulant, aut cholericum humore, aut sanguineo qui in uenis est, nec dissolui potest, uoluiturq; in uenis circa cerebrum, & fit ab inde uertigo, aut ex grossa uentositate quæ bis concluditur uenis nec dissolui potest, sed circūuoluitur cerebro & uertiginem parit. Fit etiam ex oppressione quæ cerebro accidit, præ alicuius carnei ossis ex confractione, aut alia quauis cerebrum opprimēte causa.

Ioannes

Ioannes Serapio: Cognoscitur quod est per comi-
tatem ex malitia digestionis, & ex dolore quæ est
in stomacho, & ex destructione desiderij, & ex de-
bilitate animæ, & nausea, & ex commotione dolo-
ris quandoque, & quiete eius alia uice. Et for-
tasse accedit uertigo ex humore frigido qui an-
nexus est cerebro. Inquit Ioannes: Aut ex humori-
bus cholericis, & differentia quidē est inter ægri-
tudinem uertiginis & sodam, quod soda non qui-
escit uelociter, & uertigo quiescit uelociter.

Ex traditione autorum re-
centium.

In scotomia ex uitio cerebri minutio fiat
de cephalica si nihil obuiauerit, & den-
tur hiera picra, et hiera Gal. hiera for-
tissima, aurea et rubea in sero. Et ophtalmicū nari-
bus fiat, et pilulæ diacastoreæ binæ dissolutæ cū ui-
no naribus iniiciantur, uel succus cucumeris agre-
stis cum aqua tepida instilletur, uel hiera picra,
duæ sint partes aloë & tertia aromatica, si sit ex
stomacho catharticū dare oportet, & uomitū pro-
uocemus, & à cibis indigestibilibus & melancho-
licis & inflationem facientibus & nocturnis cibis
prohibemus, et à cibis grossis ut caulibus, legumini-
bus, & forti uino. Cibis digestibilibus utantur, ut

C S pullis,

pullis, perdicibus, auiculis in aqua non degētibus,
 piscibus aspratilibus, carnibus annualis agni, la-
 ctentibus hœdi, brodio cicerum rubeorum, ouis
 forbilibus. Si sit ex cholera, utantur pilulis confe-
 ctis ex quātitate aromaticarum specierum ad qua-
 rum pondus ponatur rheumbarbari, & ad pon-
 dus rheumbarbari, & specierum ponatur aloë lo-
 tum, & conficiatur cum succo absinthij, uel cum
 melle ad conseruationem, uel dentur pilulæ regis
 Siciliæ quæ uisum clarificant, auditum confirmāt,
 spiritalia confortant, singulas superfuitates à ca-
 pite & stomacho expellunt, sanitatem custodiunt,
 sine omni immutatione diætæ ter uel quater du-
 cūt. Recip. Calami aromatici, cinnamomi, cu-
 bebe, nucis muscatæ, spicæ nardi, macis, carpobal-
 epithymi, uiolarū, azari, gariophilorum, maucis,
 myrobolanorū ana omniū, ʒ 2. turbith, colocinti-
 dis ana ʒ 3. agarici, senæ, rheumbarbari ana ʒ 5.
 aloës succocitrini ad pondus omniū, cōfice cum o-
 ximelle ut melius seruentur, da 5. 7. uel 9. secun-
 dum tenorē uirtutis semel aut bis in hebdomada,
 utantur dianthos, diamargariton, gariophilatū.
 Omnis cibus eorum condiatur cum sale sacerdoti-
 li quod sic fit: Recip. Salis ʒ 1. saturciæ, maiora-
 næ, origani, piperis grana 9. carui, coriandri, ci-
 mini,

mini, cinnamomi, zingib. ana ʒ 2. puluerizentur
 & puluis usui reſeruetur. Sal Marcelli expertum
 ad omnes humores capitis, phlegma de cerebro
 educit, hydropicis, ſciaticis, arteticis, podagricis
 mire ſubuenit: Recip. Salis armoniaci to-

ſti ʒ 12. piperis nigri ʒ 5. cimini, zingiberis, pi-
 peris albi, ſoeniculi, cinnamomi ana, ʒ 4. gario-
 phyl. galangæ, zedoariæ, cubebæ, cardamomi ana
 ʒ 3. hyſſopi, thymi, origani, carui, aniſi, apij, petro-
 ſel. leuiſtici ana ʒ 1. s. tere & in puluerē redige.
 Eo omni prandio utatur loco ſalis.

Digerentia. Recip. Syrupi de ſtœchados
 ʒ 1. oximellis ʒ 5. fiat decoctio ſimplicium ducen-
 tium ad caput.

Caputpurgia: Recip.
 Aquæ maioranæ lib. 1. aceti ſcyllitici ʒ 2. & mi-
 ſceantur. Ad idem: Recip. Aceti ſcylliti-
 ci lib. 1. pulueris origani, pyrethri, macropiperis,
 ſinapis ana ʒ 5. miſceantur, & eſt forte.

Ad idem expertum: Recip. Folia hermæ,
 morſus gallinæ, & fricentur nares & faciet flue-
 re humiditatem. Et in caputpurgijs &

gargarifmis debet apponi ali-
 quid ſalis, ut cerebrum
 ſtimulet.

De Le

De lethargo ex traditione Græcorum & Latinorum.

Cap. IIII.

Ex Archigene & Possidonio.



Lethargus interdū pro furioso ponitur, & phrenetico. Horat. Vt Lethargicus hic cum sit pugil & medicum urget. Videturq; lethargus non absimilis phrenesi, de quo loquitur Archigenes. in phrenesi difficilis somnus prompta ad omnem audaciam mens est, ut in hoc marcior & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas. Lethargi bina sunt principia. Quibus quidem circa præcordia & intestina primi languores in parem morbum cerebrum agunt: quibus circa cerebrum inceperit & quibus statim à principio morbus obuenit, quibus porro ex dilapsu aliquo acutarum ægritudinū, præsertim à phrenitide uehementius ob stuporem immittentia medicamina refrigeratis dilapsus in lethargum efficitur. iam uero sæpius etiam à syncho febris delapsus in lethargū est, atq; ex alijs complurimis ægritudinibus, in quibus præcipue exhaustiones plures sunt cōsecutæ, quandoq; autem etiam in longis febribus cōtingit in periodum ipsos somno demergi & consopiri sicut in amphemerinis cōtingit febribus, et hemitriteis,

teis, est & in quartanis. Et alij quidem cum spasmo e contractione neruorum inferuntur. Alij ex aggregatione, & unam quidem demersionem sustinent, in qua postremo periculum subeunt. Alij in periodis deferuntur & rursus reuocantur. Consideranda itaq; est species delationis, qui enim per periodum somno consopiantur manifestiorem habent pulsum. Qui uero morbum habent nimium & difficulter mobilem, hi etiam ex perrecti aliena efficiunt & obliuiosi efficiuntur. Qui uero in periodum nihil huiusmodi sustinent, & hi cum graui et sublata respiratione deferuntur, ut stertant, & cōpunctiones & gemitus referat expressos dolores: neq; afferre quæat recumbentes quod pars rationalis oblesã sit. Alij autem quietissimè uidentur cōsopiri, & quibusdã membra constringuntur, & rugæ et pallor subest, alijs diffunduntur circa uigores paroxysmorum. Hoc ergo lãguore occupatis, hæc cōsiderent: reuellitur hypochondriũ, & cogitur aluus, & ui excitati ab cōsedentibus rursus in somno rapiuntur, & ipsis aduenit obliuio, frequenter ad mingendum festinent, exhibito eis scaphio, ipsum manu tenendo obliuiscuntur. Intenso aut ac perseuerante malo, totum corpus turbidum tanquam morticinũ euadit, supini prostrati ad pedes defluunt

unt

unt proijciendo manus et crura. Nares quibusdam
distillāt, ipsis os deducitur, inferior gena residens
& depressa spectatur, lāguores ergo Lethargū cō
secuti hi sunt. Media inter phrentiidē & lethargū
ægritudo, quæ species est amentia & mētis aliena
tionis, hāc uero medici uocare cōsueuerūt catochē
& catalepsin, quæ in humore magis accidit melan
cholico, periculosior autē hic morbus est lethargo.
In febribus autē cōsimilis est lethargo, & aliquan
do quidē uidentur dormire, aliquādo aut incōcussa
habent cilia, aut oculis frequenter obnutāt serādo
& reserādo. Aut intenti et emissitijs intuentur ocu
lis, & tanq̄ cōcretos & immobiles tenent oculos,
ac si manū oculis obiectes non cōniuent, obmutesc
cunt & carent sensu, neq; audiunt, neq; respōdent.
Ferūt aut manus suas aliquādo in caput & nasum
tanq̄ pigrescentes nō cum sensu, pulsus exigui, tur
bidi parū admodū absunt ut deficient, flatus quan
doq; densus, quandoq; rarus, & ex interuallis qui
busdā uehementer respirāt, alui & urinæ astrictio
nō ab ariditate. Habent siquidē humorē & multū
ac (ut paucis concludam) neq; omnino similes sunt
phreniticis, neq; lethargicis. Alia aduenit ægritu
do frigidis & humidis inuadentib. cerebrū humo
rib. quæ Carus dicitur cū hebeti febre, cōsequitur
autem

aut sensus alienatio, et immobilitas totius corporis cum detrimento principalium actionum, deducuntur omnifariam oculi. Differt Carus à Lethargo quod in lethargo interrogati respondent, neque omnino muti manent. At Caro circumuenti somno profundissimo detinetur, quod compuncti sentiunt quodam, sed nec loquuntur, neque oculos deducunt. Cura horum sit, ut lethargicorum.

Ex traditione Perenorum & Arabum.

Quandoque accidit cerebro apostema ex humore phlegmatico putrido faciente euenire febre, et accidit ex illo obliuio, et subeth, quod est quia subeth non accidit nisi quoniam febris nocet actioni partis sensibilis quae est illic adeo donec non recipit passionem nec euigilat, et obliuio non accidit nisi quoniam pars qua fit imaginatio laeditur per febre quare non attendit. Et intentio quidem obliuionis est quia non recipit res quae sunt in seruatione, neque accipit eas. Et cum uis curationem subeth et alienationis, oportet ut consideres in eis quae dixerunt antiqui scilicet in uirtute et arte et acquisitione et etate et regione, et quae illis sunt similia. Auienna: Lethargia dicitur apostema phlegmaticum factum intra cranium, et hac aegritudinem comitatur obliuio. Et cum lethargia est in substantia cerebri, subeth est fortior, et difficultas motuum maior

Si autem.

Si autem est in uelaminibus, dolor est fortior, & motus leuiore. Hæc ægri tudo plurimum generatur à comestione ceparum, & à repletionem nimia stomachi, & multitudine potus, & multitudine comestionis fructuum. Constantinus. Perfectio memoriæ & facilitas recordationis, substantialem cerebri puppis stabilitatem, & eius innuit perfectionem. Econtrà hominem obliuiosum & durè intelligentem necesse est faciant, quod sit cum in puppi cerebri humores nascuntur phlegmatici, qui ferè nihil horum prætermittunt memoriæ. Si ex uicino sit tempore cum multa oscitatione & oris apertione, neque meminerint os claudere ex multa phlegmatis frigiditate et humiditate cum in puppi cerebri superat, et animatum spiritum suffocat, hæc infirmitas uocatur Lethargia. Galenus tamen uocat frigidam phrenesim, quæ sæpius contingit senibus in frigidis et humidis regionibus. Si autem patiat puppis cerebri de phlegmate et de cholera rubea commixtis, redditur infirmus quasi mortuus, oculos tamen habet apertos, anima nullam molestationem tolerat. Quiescit cum phlegma in frigidatur et humescatur, expergiscitur et ex siccitate ac acredine cholerae rubeæ. Est & alia species quæ stupor mentis dicitur, et est quasi somnus oculis clausis, quod fit duobus

bus modis, uel enim infirmus nimium est somniculosus, uel parum. Nimia somniculositas tribus modis constat, uel de sola humiditate, sicut ebriosi patiuntur, uel de sola frigiditate, sicut in niuem uel glaciem cadentes sustinent, uel de utroque, sicut in apoplecticis uidemus & lethargicis. Secunda parua, scilicet somniculositas, non est somnus sed quasi pigritantis dormitio, quod non contingit nisi ex defectione & dissolutione uirtutis. Et haec infirmitas uix aut nunquam curatur.

Ex traditione autorum recentium.

Lethargus seu lethargia oppressio est cerebri cum oppressione euaporationum. Et est passio puppis cerebri obliuionem mentis inducens, quae aliquando est uera, aliquando non uera. Vera autem fit ex phlegmate, non uera ex phlegmate & cholera mixtis. Fit autem aliquando cum apostemate, & tunc cum febre. Cum autem fit sine apostemate, fit sine febre ut in senibus. Accidit autem in febre, ut quotidiana continua, & apostematibus peripneumoniae & hemitriteo minori ex translatione materiae ad puppim. Si cholera est, anteriorem partem petit, ut in phrenesi propter similitudinem, cholera in illa parte magis nutritur. Si

phlegma,

phlegma, ad posteriorem partem quæ phlegmatica est. Signa ergo apostematis in posteriori cellula sunt, febris continua, somnus multus, obliuio, uocati uix respondent, oris apertione uix meminerunt claudere, quod ex multa frigidityte & humiditate phlegmatis cōtingit. Si aut ex solo phlegmate sit, signa phlegmatis simplicis apparebunt, ut urina turbida quasi subiugaliū, pulsus mollis, magnus & fluosus, somnus profundus, anhelitus tardus & defectus. Si ex phlegmate mixtis accidentia sunt permixta, ut modo uigilant, modo graui somno opprimantur, urina coloratior, & pulsus uelocior. Signa mortalia: cum liuiditate faciei, tremor membrorum & faciei, sudor in capite solo, sanguisuga apposita non adheret. Si ergo sit ex phlegmate, in loco iaceat luminoso, patiens trahatur per capillos & barbam, utatur colloquijs multis, fiant fricationes fortes pedum & manuum cum sale & aceto scyllitico. fumus foetidus in narib. apponatur, ut ruta, liciuū extinctū, fumus capillorū ustorū, aut cornu cerui et galbani. In nulla aut lethargia apponantur reperiuiua à principio, ne augmentetur frigiditytas, & stupor, sed raso capite fiant inunctiones mediciter calidae, sicut de castorio distemperato cum succo apij, & foeniculi. A principio fiat clystere mollicatium si constipatus sit, deinde mordicati-

HMM.

rum. Mollificatiuum fit ex malua, uiolis, branca uersina, bis malua decoctis in aqua, cuius colatura admisceatur furfur triticeum, & fricetur inter manus, & iterum coletur, colatura admisceatur oleum uiolarum uel commune, & fiat clystere. Mordicatiuum fit ex absinthio, abrotano, calamentho, origano, menta, mercuriali decoctis in aqua marina uel falsa, in cuius colatura resoluator furfur triticeum, & iterum coletur, in cuius colatura ponantur mellis 3.3, salis gemmae 3.2, & iniectiatur. Et in clysteri possunt poni medicinae calidae, ut benedicta, dyaphoenicon secundum discretionem medici. Si corpus sit plethoricum, & fortis est patiens, fiat phlebotomia de cepalica, sed tamen multum consideranda est uirtus, et dispositio ac complexio aegri. Et licet tamen patiens non sit fortis, extrahatur sanguis a naribus cum setis porcinis. Sanguis uero fronti apponatur. Inungantur nares & palatum cum aurea alexandrina distemperata cum uino calido. Nihil uioletum, uel uehementer calidum naribus, uel palato apponatur, ne ex forti dissolutione spiritus animalis suffocetur. Nulla ergo fiat uioleta sternutatio, nec saepe, potest aut fieri ex pipe, castorio, cum oleo uiol. uel lacte mulieris tempatis uel puluere rutae. Epithemata fiant ex mediocriter calidis, ut chamomil. melliloto. aneto,

apio, castorio cum similibus. Et si fiat balneum, caput aqua non tangatur, molestiam enim magnam inferret. In lethargia sine febre sit diæta calida & sicca. post purgetur phlegma, postea detur theriaca, maxime si cerebrum turbatum fuerit. Postea fiat emplastrum de sinapi, euphorbio, distemperata cum aceto. In lethargia autem cum febre non uti multum calidis, nec purgationibus fortibus nisi in declinatione debemus. Debet autem diæta esse declinans ad calidum cum sit temperata. Electuarium ad memoriam restaurandum & cerebrum confortandum: Recip. Cynamomi, rosarum, uiolarum, zingib. cardamomi ana ʒ. i, anthos, dragagati, balsamite, maiorane, corticis citri, ciperi, liquiritie ana. ʒ. i. squinanti, spicæ, gariophilorum, cubebæ, folij, fisti corum, galagæ, senæ, spodij, coralli, mastiches, macro piperis, storacis calamitæ, serici incisi. ana. ʒ. ij, musci. ʒ. s, syrupi rosati quod sufficit & cum zuccaro fiat electuarium in forma liquida aut solida.

De phrenitide siue phrenesi.

Cap. v.

Secundum Græcos & Latinos.



Hrenitis siue phrenesis est morb. lædēs mentem & ad insaniam furoremq; deducens. ἀπὸ τοῦ φρενός, à mente & parte

te rationalis animæ id est, deturbatio mentis, & ex
cordis uitio nasci à quibusdam putatur. Serenus ue
ro Samoniacus. Ex cerebri uitio phrenesis furiosa
mouetur. Amissaq; refert frondens amentia uires.
Latine delirium dicitur. Inde phreneticus qui eo ui
tio laborat, qui latine delirus uel mente captus dici
potest. Sunt tamen tria insanie genera. Incipiam
ab insaniam quæ & acuta in febre est, Græci phrene
sim appellant. Illud inter omnia scire oportet inter
dum in accessione ægros desipere & aliena loqui.
Quod non quidem leue est, neq; incidere potest, ni
si in febre uehementi, non tamen æque pestiferum
est. Nam plerunq; breue esse consuevit, leuiusq; ac
cessionis impetu protinus mens redit. Secundum
genus insanie est quod spaciū longius recipit, quia
ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas exci
tat & consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra
contrahere. Tertium insanie genus est ex his lon
gissimum adeo ut uitam ipsam non impediat, quod
robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius
species duæ sunt. Nam quidam imaginibus non mē
te falluntur, qualem insanientem Aiacem uel Orce
stem poëtarum fabulæ ferunt, quidam animo desi
piunt. Hæc sunt tria insanie genera, de quibus ui
de Celsum lib. tertio, cap. 18. Phrenitis inflāmatio

Circa cerebri tuniculas cum febris acuta comminutis
onem ac distractionē inferens intelligentiæ & mē-
tis. Raro autem phrenitis à principio se coniicit fe-
bri. In multis ferè incipit à die quinto uel sexto, uel
adhuc seriusscule eodem ferme periculo succensa,
proinde alij quidē die septimo, alij nono ab aliena-
ri detrahiq; incipiunt. Differentiæ autem phre-
nitidis plures, uerum maximè principales tres.
Aut enim phantasticum solum oblaesum, in ipsis ue-
ro custoditur rationale & memoriæ conceptacu-
lum, aut rationale solum offenditur, conseruatur
autem phantasticum & memoria. Aut etiam phan-
tastici & rationalis est offendiculum, sed memo-
ria conseruatur. Memoria uerò deleta in febrili-
bus ægitudinibus pariter ut plurimum aboletur
etiam rationale & phantasticum. Anteriore ergo
cerebri parte oblaesa phantasticū duntaxat offendi-
tur. Media uerò aluo offensa cerebri auerso fit ra-
tionalis, parte uero quæ ad neruulū posterioris ce-
rebri tēdit oblaesa, uis recordandi amittitur, cū ipsa
frequēter duo reliqua. Quibuscūq; igitur offensum
est phantasticū, ij iudicāt recte, at imagines concipi-
unt alienas. Quib. aut oblaesum rationale solū mēte
uidēt recte, at malè iudicāt. Cōuenit igitur parti ma-
gis offensa adminiculari et ne quidē quicquā aliorū
negligere.

Ex

Ex traditione Pænorum & Arabum.

Phrenesis calidum est apostema in quibusdam cerebri pelliculis, quam semper sequuntur uigilie & alienationes. Aliquando etiam apostema est in cerebri substantia, quod pessimum et molestissimum est. Nascitur duobus modis, uel ex incensione cholerae rubrae cerebri ascendentis, uel de sanguinis ebullitione in corde, cuius fumus cum ascenderit cerebrum fit apostema, deinde uigilie & alienationes comitantur & dolores. Phrenesis quæ ex qualibet alia passione nascitur, uel est ex diaphragmatis apostemate, uel ex stomachi passione, siue ex matrice, ex quorum colligantia per nervos cerebrum patitur. Membris quoque his in pristinum statum redeuntibus, & cerebrum sanatur, & alienatio illa quæ ex stomachi contingit uitio paulatim augmentatur, postquam quiescit dolor, febris extinguitur, morbus tamen non dimittitur quia in cerebri substantia esse certificatur, unde eorum status debilis est, & rarus. Alienatio autem illa quæ ex augmento febris acutæ est, ex fumo est caput ascendente acuto et pungente, febre quiescente & alienatio quiescit. Si e contrario certificatur apostema esse in cerebro uel in ipsius pelliculis. Gal. enim inquit: Alienationem sequuntur acuti humores punitiui præter

D 4

maniam

maniam & melācholiā, quæ tribus modis est, uel
in cerebri substantia, uel in stomacho, & sibi perti-
nentibus, sicut hypochōdria cum inflantur, ex cho-
lera enim nigra in phantasmatis, & in alijs acci-
dentibus est diuersa, si tamē in quodam comitatur,
ut Hippocrates in Aphorismis testatur. Si timor ali-
cui immoretur sine causa, passio eius est melanco-
lica, unde omnes hanc passionem habentes sine cau-
sa semper sunt tristes, qui interrogati cur tristan-
tur, non habent quid respondeant. Alij mortem ti-
ment, uel quamlibet aliam rem patiuntur irrationa-
bilem. Alij mortem amant, & nimium eandem de-
siderant. Galenus in lib. passionum, non est, inquit,
mirandum si cholera in fundo rationabilis animæ
dominetur, & timorem, & tristitiam, aut mortis su-
spitionem patiantur, cum in corporibus exteriori-
bus nihil obscuritate sit timidius, unde si aliquid ob-
scurū rationalis animæ partem cooperiat, necesse
est ut patiens timeat, quia secū portat unde timeat.
Quod ergo nos exterius ex obscuritate huiusmodi
aëris patimur, necesse est ut ex cholera nigra, cum
ad cerebrum ueniat, melācholici patiātur, uel cum
ascendat eius fumus sicut in hypochondriacis uide-
mus. Auicenna: Melācholia est cum malitia aestima-
tionis & cogitatione corrupta & timore & quie-
te,

se, nec est in ipsa agitatio uehemens. Mania uero tota est agitatio, & saltus, & inquisitio, & lupinositas, & aspectus cui non assimilatur aspectus hominis, imò luporum. Et cum mania ut plurimū nō est febris, sed charabitus non euacatur ab ea. Mania canina est in qua est associatio uehemens & amicitia cum obedientia, & conuenientia simul, & in ipsa non est crudelitas contentionis sicut in mania lupina. Et hanc scilicet caninam plurimum non resoluunt nisi hæmorrhoides & uarices. Et dicitur melancholia mutatio æstimationū, et cogitationum à cursu naturali ad corruptionem, & timorem, et ad malitiam. Et non dicitur melancholia nisi cuius euentus est à cholera nigra nō adusta. Et multotiens fit per mutatione ex epilepsia. Multiplicatur generatio ipsius in eo cuius cor est uehementer calidum, & cerebrum ipsius est humidū. Et hæc ægritudo plus accidit uiris, sed in mulieribus est deterior. Et species istæ scilicet melancholiæ sunt indefinitæ, id est, indeterminate. Rasis: Quando aliquem febris cōclusa continua inuasit cum forti capitis, et oculorum grauedine, & in facie atq; oculis uehemens fuerit rubedo & capitis dolor & horror luminis affuerint, & in pulsu uelocitas, & frequentie superfluitas inueniantur, signa phrenesis certissima iudicantur,

D S

buntur,

buntur, quod si lingua nigra aut citrina fiat, & permisceatur intellectus et multum fuerit alienatus, et uigilauerit multum, iam phrenesis perfecta erit. Et cum alicui cogitationes malæ sine causa manifesta acciderint, et timor et tristitia in eo præualuerint, melancholiæ principium in eo erit. Cum autem res ad hoc deuenierit, ut etiam ea quæ cogitare coepit ore promat, uerbaq; sua atq; actus permisceat, iam melancholia perfecta est. Haliabbas: Phrenesis aut ex mala complexione fit calida, quæ cerebro et ipsum operienti et circunvoluēti accidit operimēto, aut ex calido, quod in operimento fit cerebri, apostemate, uel in ipso cerebro, aut si quæ in uenis cerebri sunt, cholera fuerint multiplicatæ. Et quæ ex apostemate fit, difficilior est et fortior. Apostema autem calidum ex cholera fit rubea, aut ex sanguine et aliquoties aliquid admiscetur phlegmati. Isaac: Phrenesis absolute dicitur apostema calidum nascens in pelliculis cerebri ex ebullitione sanguinis in corde existentis, quam consequuntur uigiliæ & alienatio, et nonnunquam phrenesis est apostema in uentriculis cerebri quod est peius & molestius.

Ex

Ex traditione autorum recentium.

Causa phrenesis ut plurimum est incensio cholerae rubae in uentriculis cerebri existens, et ebullitio sanguinis cordis, quia sanguis in corde bulliens, cum cholera rubea emittit fumum ad caput, generatq; apostema calidum et cholicum. Haec est causa vera phrenesis, quae est per se morbus et non per alium. Quidam arbitrati sunt quod fumus quidam ebulliente cordis sanguine ad caput ascendens calidus sit et humidus, quod falsum est. Fumus enim ad caput saliens si fuerit humidus eliquabitur, et inferius ducetur, in pectoris concavitatem descendet. Si aut illius fumi humiditas ad pectus descenderit, in diaphragmate apostema generabit, et pleuresis nuncupabitur. Pars uero fumi quae in capite remansit dissoluta, per poros cum sudore et fumo egredietur. Sed phrenesis quae fit ex ebullitione sanguinis non est simili modo, quia fumus qui oritur est calidissimus et siccissimus de genere cholerae aquae ad cerebrum ascendens nullam habet humiditatem qua possit eliquare et inferius ad diaphragma descendere ut illic generet apostema, unde est necesse est cerebro inuiscetur, et apostema generet, quod phrenesis dicitur. Differt enim phrenesis à pleuresi, quia causa phrenesis est de fumo calido igneo

igneo & sicco. Causa uero pleuresis fumus calidus
& sanguinolentus. Proinde antiqui phrenesim fe-
brem appellauerunt causon, & pleuresim febrem
acutam. Est & alia species phrenesis accidentaliter
alium sequens morbum, sicut phrenesis quæ fit pro-
pter pleuresim, quæ fit duobus modis. Vno modo
propter neruorum colligantiam quam cerebrum ha-
bet cum diaphragmate, quemadmodum cerebrum
patitur ex passione stomachi & matricis propter
colligantiam neruorum quam habet cum eis. Vnde
aliquando phrenesis fit propter putredinem quæ
est de phlegmate, quia cum putrefit ascendit fu-
mus ad caput & generat phrenesim. Et aliquan-
do fit per unctionem cholerae & mutatione eius ad
cholera nigram. Hoc genus phrenesis pesti-
mum est & difficile ad curandum. Et quia dispu-
tatio est de acuta febre cum phrenesi, dicendum est
quod ipsa phrenesis fit propter cholera rubeam
in cerebro bullientem, & ad cerebrum ascenden-
tem, dicamus ergo eius significationes. Hæc phrene-
sis uera plurimum iuuenibus accidit cum labores
magnos faciunt, & eorum complexio calida est &
sicca, & tempus æstiuum & regio, & aer calidus et
ficcus. Sed oportet nos intelligere, quia cum quædã
res aliam superat, extinguatur uirtus rei quæ uinci-
tur,

tur, sicut uidemus fieri in ebrietate. Fumus enim uini cooperit & uincit lumen mentis & uirtutem & actionem sensus & uoluntarij motus. Simili modo fit in hoc morbo, quia cum extraneus calor naturalem cooperit, ac uincit calorem, lumen & splendor eius extinguit, & facit constipationem stuporem atq; defectionem. Habet enim hæc ægritudo hæc accidentia quæ sunt ab ea separabilia, nec ei accidunt nisi cum febris augmentatur, habet etiam alia quæ sunt inseparabilia, sicut dolor capitis et spiritus angustia, & cum status febris appropinquat, ad eum ueniunt accidentia, sicut sitis nimia, & siccitas oris & palati, lingue asperitas & nigredo, & angustia, & cordis tremor, stupor & defectio, mutatio faciei à naturali ad innaturalem colorem, sicut ad citrinitatem. Si causa phrenesis sit cholera rubea in cerebro bulliens, aut in ruborem, si causa eius fuerit ebullitio sanguinis in corde existens, quod si patiens hæc in æstiuo tempore fuerit, calor illius erit pungitius & intolerabilis in toto corpore, et alienationes et uigiliæ eis sæpe generantur & cetera accidentia quæ dicta à nobis sunt in libro febrium de causonide. Sed in melancholia quæ est sine febre signa principij eius sunt, estimatio mala, timor sine causa, uelocitas iræ, dilectio

etio solitudinis, tremor, uertigo, sonitus, tinnitus, et
proprie mirachius. Species istæ indefinitæ sunt, qui
dam eorum timent casum coeli super se, quidā quod
terra absorbeat eos, quidam latrones timent, ali
qui lupos ne ad eos ingrediantur. Quādoq; res pro
prie habent in hos impressiōem, et cum hoc quan
doq; imaginantur res coram oculis suis quæ non
sunt sanæ, et quandoq; imaginantur seipsos reges
factos, aut lupos, aut dæmones, aut aues, aut instru
menta artificialia. Quidam eorum sunt qui rident
et proprie quorū melancholia est sanguinea, quia
imaginantur res placidas. Quidam sunt qui plbrāt
proprie quorū melancholia est pura, et quidā dilie
gunt mortē, et quidā eorū abhorrent. Et aliquādo
causa melancholiæ est in cerebro per essentiam, ali
quando facta est comitate totius corporis, aliquādo
causa est in splene, aliquādo in stomacho, aliquando
est in mirach. Cholera nigra faciēs melancholiam,
cum ipsa est cū sanguine tunc ipsa est cū gaudio, et
comitatur ipsum tristitia uehemens, si aut est cum
phlegmate, tunc ipsa est cū pigritia et paucitate ca
liditatis ipsius et quiete, si est cū cholera, est cū agi
tatione et lesiōe, et dæmonio, et est similis mania, si
uero fuerit cholera nigra pura, tūc cogitatio in ip
so erit plurima, audacia erit minor nisi moueatur
et

LIBER II.

et irascatur. Et habet odiū cuius nō obliuiscitur. Cu-
ratio eius ita fīda est. Si uides uenas plenas tūc cho-
lera nig. est sanguinea, phlebotoma ergo ex nigra,
imō oportet ut secūdū dispositionē oēm à phleboto-
mia incipias nisi timor uehemētis debilitatis affue-
rit, oportet ut phlebotomiā amplifies aliquādo ut
nō affluat subtile et retineatur grossum et inde au-
geatur. Cōsidera q. duorum laterū capitis sit graui-
us, et phlebotoma cephalicā eiusdem lateris. Quan-
doq. erit necessariū tibi ut phlebotomes basilicā, et
ante phlebotomiā uenarū frōtis minus, plus cū inue-
nis signa cōmunia, deinde si inuenis humorē melan-
cholicū declinare ad frigus, euacua cū pil. factis ex
epithymo et aloë, et incipe à digestiōe. Pil. ex epith.
et aloë ī principio leues in qb. est epith. deinde cū de-
coctione epithym. et agarici, postea si nō cōferūt ad-
ministra hieras magnas, lapis lazuli iuuat, lapis ar-
menus, pil. factæ ex eis iuuāt, administratio dictarū
medicinarū in aqua casei. Si nō cōferūt reitēra curā,
cū euacuationib. subtilib. Exptū est potare infra scri-
ptā triferā epithymi: Rec. triferæ 3. 2, epithymi. 3.
1, hieræ 3. s. Omni mēse euacua cū hieris magnis do-
nec remoueat egritudo. Odoramēta bona uideli-
cet muscus, ambra, et iuuāt humectatiōes, et aqua de
coct. absin. hij: Digestiūm usuale: Recip. seri capri-
ni, aquarū acetosæ ana 3. 1, succi sol. bliti 3. 1. s. lu-
puleo

pulorum, absinthij ana. ℥. i. sachari albißimi ℥. i. s. istum accipiat debite calidum, eo utatur quatuor diebus cōtinuis. Aliud: Recip. Sirupi de pomis. ℥. i. de bizantijs. ℥. s. de epithimo. ℥. iij, aquarum acetosæ. ℥. iij, lupulorum, buglossæ. ana. ℥. i. misce. istud assumat debite calidum post coenam per octo horas. Solutium minoratiuum: Recip. Casiæ electæ. ℥. i. dioscori. ℥. iij, thamarindorū. ℥. i, aquarū lupulorū, buglossæ, endiuie. ana. ℥. iij, fiat potio, istud accipiat per octo horas post finem coenæ calidum. Solutium eradicatorium: Recip. Solutium superscriptum, adde rheubarbari electi. ℥. i. epithimi. ℥. i. s. spicæ granati. ℥. iij, mellis, passularū ana. ℥. s. rheubarbarū prius minutim incisum, deinde leuiter tritum & non pistatum infundatur in dictis aquis per horas 12. deinde optime exprimatur & coletur, ultimo reliqua addantur, & fiat potio, & assumat calidum. Confectio confortatiua: Recip. Gemmarum electuarij de gemmis sine speciebus ana. ℥. i. specierum diarhodō abbatis, trochiscorū de rheubarbaro ana. ℥. i. radicū capparorum, specierū triasandalorum, sem. acetosæ ana. ℥. s. zuccari albißimi. ℥. 6. misce, & cum aqua acetosæ fiat confectio solida in morsellis, ℥. iij. pro morsello, accipiat morsellum mane diebus alternis & post assumptionem stet ieiunus horis tribus

tribus. Hæc digestiua & solutiua & confortatiua
ualent contra accidentia melancholica & choleri
ca. In cura phrenesis phlebotometur primo de ba
silica patiens, & si adhuc sufficiat uirtus fiat phle
botomia de uena in medio frontis, sed secundum
Alexand. de illa quæ est in summitate nasi, uel in
tromissis setis porcorum per nares fluxus sangui
nis prouocetur. Hoc autem facto à principio, raso
capite superpone oleum rosatū cum aceto fortissi
mo in frigidato in niue, deinde folia stiptica super
ponantur, ut sunt folia plantaginis, lanceolatæ, uel
etiam caulis & salicis. Ponantur in domo obscura
picturis uacua, quia picturas multum diligit intue
ri, spargantur folia salicis, myrtæ, ros. & omnia
aromatica frigida per domum, odoret campho
ram. In fronte capitis pone opium, si uirtus sit for
tis, si debilis sit, opium caue, utatur syrupo papau
eris, bibat aquam hordei cum semine papaueris.
Postquam feceris hæc, fiat clyster: Recip. Absin
thium, maluam, uiol. sem. frigida mundata cum a
qua decoctionis istorū fricetur fursur & coletur,
in colatura ponatur ℥ s. diaprunis uel oximellis
laxatiui ℥ i. salis gemmæ ad quantitatem ℥ s. misce
atur & hoc fiat sæpe, lapso autem spatio 24. hora
rum, iam potest opinari apostema esse collectū in
E prora,

prora, & appropinquare ad hoc quod confirme-
tur cum materia sit uelocis motus, et si sit instantia
uigiliarum resoluentibus insistatur, ut cum succo
apij, uel accipiamus catulum scissum & calidum
superponamus, uel gallum cum interioribus suis
per medium scissum, hoc fiat pluries, hoc enim at-
trahit materiam & attractam conbibit, talia tamē
attractiua in principio caueantur, & magis reper-
cussiuus utantur. Si autem uirtus fuerit debilis, ut
nec clystere, nec phlebotomiam possit tolerare, so-
lis suppositorijs est utendum, primo lenitiuis, &
postea mordicatiuis. Dieta uero si uirtus sit fortis
aut nulla sit, aut tenuissima donec uideatur phre-
nesis remitti & feb. alleuari, & tunc erit dieta
ingrossanda, & post quartum diem & ad minus
post septimum uinum exhibeatur.

De epilepsia seu comitiali mor-
bo. Cap. v.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Comitialis morbus seu maior morbus, mul-
tis nominibus ab autorib. medicis appel-
lari solet. Aliqui sacrū, alij epilepsiā, alij
lunaticū, alij aut herculeū, quod Hercules eū morbū
passus sit, nominarūt, alij caducū morbū maluerūt
appellare, unde Seren. ait: Et subiti morbi species
cui

cui nomen ab illo. Quod fieri nobis suffragia iusta
recuset. Sæpe etenim mēbris atro lāguore caducis.
Consiliū populi labes horrēda diremit. Ipse deus
memorat dubiæ p tēpora lunæ. Conceptū talis quē
sæpe ruina profudit. Morbus iste inter notissimos
est, homo subito concidit, ex ore spumæ mouentur,
deinde interposito tempore ad se redit, & per se
ipsum consurgit, id genus sæpius tam uiros quàm
fœminas occupat, ut Celso placet. Morbusq; ipse
aut recens consumit, aut durat usque ad ultimum
uitæ diem. Et lunaticus dicitur, quod eum qui inter
lunio natus est hunc morbum ferè pati compertū
est. Comitialis autem idcirco dictus est, quod
hoc morbo laborantes in comitijs maximè detegi
solebant. Interrumpebantur comitia quo die ali-
quis concidisset. Erant autem comitia conuentus
populi à simul itando ita appellata. Sacrum ideo
dictum uolunt quasi execrabile, eò quod spūto eum
solemus abominari, alij dicunt ideoquē quod sa-
cram partem corporis, id est, cerebrum occupat.
Et ideo etiam Græcè ἱεγὰ νόσος, id est, sacra
passio dicitur. Inde uenit Epilepticus, qui uulgo
caducus dicitur, quo uocabulo utitur Firmicus ma-
ternus sæpe. Germani hunc morbum sancti Valen-
tini uocāt, et nos Galli morbum sancti io. uocamus.

E 2 Sunt

Sunt comitialis morbi tres differentiae, omnium autem ipsorum commune est cerebrum oblanguescere, aut in ipso primo consistente languore, uel per consimilem uentris, oris ægritudinem, raro autem fit tertia species morbi comitialis à parte aliqua, cui insederit languoris exordium, siue sentiat ipse ægrotans in caput ascendentem morbum. Perspexi (inquit Aëtius) in puero principium affectionis à memoria factum, hinc tempore subsequenti in copiam peruenisse, ac lumbos et spinam ad ceruicem in caput usq; conscendisse. Cumq; capiti inhæsisset non ulterius proserpsisse. Idem solet accidere ubi à Scorpione quispiam cōpunctus sit, aut à uirulento aliquo attactus. Quidā enim à Scorpione compunctus aiebat, se uideri grandinibus sauciari, eratq; totus frigore suffusus, sudorq; obrigebat, uix tandem oblati adiuuentis euasit incolumis. Fieri igitur non impossibile est, ut in membro aliquo principali huiusmodi gignatur essentia citra causam aliquam extrinsecus inuehentē, eamq; præsertim cum in parte nervosa consederit, continue uim remittit in principium. Si diuellas magnum digitum pedis ipsius in quancunq; partem, & exfluente sanguine labia prolapsi illinias, cōfestim suscitabitur. Ne continuè cadant, inquit Archigenes, eryngij mōtā
ni no

ni nominati, cuius folia angusta & minora, & flores aurei coloris, oculi faciem habentes, huius radicem incidito & diligenter cribellato, ex eo dato acetabulum ad dies 5. mellis immittendo quantum satis sit, ut crassitudinē habeat, idq; facito ad 365. dies, nam ad annum ita faciendo non fines morbum inuadere. Inquit Aesculapius: Oxalida seu oxilapathum præcipue uiridem plurimum dato quoti-
die à prima luna ad 30. usq; dies, ipsa autem oxalis herba uiridis data cum uino insanientibus in statum adducit suum naturalem. Arguit epilepticos suffumigatio, qua conseruantur, bitumen, gagates lapis, cornu caprillum, & odor caprini epatis tostati, & iecur ipsum mansum.

Ex traditione Pænorum & Arabum.

Epilepsia non est nisi spasmus corporis totius, ueruntamen non est semper, & est cum nocumento actionum membrorum principalium. Et fortasse accidit cum læsione stomachi & in quibusdam membris cum læsione aliorum membrorum sicut manuum & pedum. Paulus uero algenti dixit se uidisse hanc ægritudinem accidisse ex matrice, & illud fuit in muliere prægnante, & postquā ipsa peperit quieuit ægritudo.

E 3 Generatur

Generatur aut̃ hac ægritudo, secundum intentionē
Galenī ex humore qui oppilat meatus uentriculo-
rum cerebri, humor uero iste grossus secūdum plu-
rimum est uiscosus phlegmaticus, & fortasse est in
modico decliuis ad choleram nigram, et secundum
sententiam Aristotel. non generatur nisi ex uento-
sitate grossa quæ oppilat meatus uentriculorum ce-
rebri, & prohibet ipsam subtilitatem penetrare, et
dare membris motum, propter illud ergo epilepsia
accidit subito et quiescit subito. Quod est quia uen-
tositas est uelocis motus. Constantinus primo uia-
tici. Epilepsia apoplexiæ est uicina, locus enim est
idem, & materia unde nascuntur frigida est &
grossa. Sed tamen apoplexia totius uirtutis per mē-
bra discurrentis ablatiua est. Epilepsia uero cum
motu est disturbatio, unde medici epilepsiam uo-
cant apoplexiam parua. Quæ tribus ex causis est,
uel est ex phlegmaticis humoribus, uel melancholi-
cis nascentibus in prora cerebri, uel ex uentositate
frigida & grossa dominante cerebro, uel ex humo-
ribus cuilibet alij membro dominantibus sicut sto-
macho, cum enim humor aliquis nascitur in his mē-
bris, fumus eius per nervos ascendit ad cerebrum,
grossitudine, cuius ui oppilantur spiritus animalis,
unde caducus morbus cōcreatur sine ullis acciden-
tibus

tibus antecedentibus & ore spumant. Epilepsiam quæ ex humoribus in prora cerebri fit, timor & grauitas capitis præcedunt, & pigritia atq; tenebrositas in oculis. Accidentia uniuersalia sensus ablatiua & uoluntarij motus sunt hæc: mens cito corrumpitur & patiens spasmat, sed tamen cito sanatur. Aliquando & egestio et pollutio hanc passionem comitantur, & urina præter uoluntatem emittitur. Hæc passio semper temporibus uenit determinatis, unde Galenus: Epilepsia quæ crescete lunæ uenit suam materiã significat humidissimã. Aui-cenna: Multotiens sentit epilepticus aliquid eleuari ex pollice pedis sui, aut alterius partis quod est sicut uentositas frigida, & tendit uersus cerebrum ipsius. Cum ergo peruenit ad cor & cerebrum ipsius, incurrit epilepsiam. Et nos testificamur uidisse res mirabiles in hac ægritudine. Etiam epilepsia fieri potest propter uermes ascarides. Et quidam modus epilepsiæ compositus cum sincopi, nominatur præfocatio matricis. Epilepsiam secundum plurimum antecedit spasmus, deinde post ipsum fit epilepsia, & illud quoniam si confirmatur spasmus est epilepsia, motus sternutationis est quasi motus epilepsiæ leuis, & epilepsia est quasi sternutatio multa & fortis.

E 4 Et cum

Et cum accidit epilepsia plurimum est ex phlegmate. Et epilepsia melancholica fortis est et deterior. Et habens epilepsiam post 25. annos moritur cum ea. Epilepsia autem mulierum & infantium, & omnium quorum est sanguis paucus, est parua propter constrictionem uenarum, & coitus plurimus, & delitiae, & quies, & paucitas exercitij est ex causis epilepsiae.

Ex traditione autorū recentium.

Epilepsia humor est frigidus humidus, quo uentriculi cerebri non perfecte opilantur, prohibens animam ad declarandam actionem quoad natura uias cerebri ex illo humore exoppilauerit. Vulgus uero dicit accubatum & iram dei esse, & aliquando concomitatur stupor cum ipsa, aliquando permutatur ad paralyfim sicut & apoplexiam, & paralyfim multotiens praecedit stupor. Et spasmus non necessario coniungitur epilepsiae, ut quando epilepsia est in subiecto in quo uirtus est impotens ad expellendam materiam, ad extremitates neruorum & origines, ut quando causa epilepsiae est uapor aut materia subtilis substantiae et non multum acutae qualitatatis, quorum non est causare spasmum. Cura epilepsiae quando est in principio: Recip. Syrupi de stœchados

stœchados ʒ 1. oximellis simplicis ʒ s. aquarum
maioranæ ʒ 1. s. saluæ ʒ 1. acetosæ ʒ s. misce.

Minoratiuum: Recip. Pilularum de hiera de
scriptarum in recepta infra scripta, agarici ana ʒ
1. zingiberis grana 2. agaricus infundatur in oximelle
simplici, deinde misce, & fiant pilulæ 7.

Pilulæ de hiera de quibus supra: Recip. Spe
cierum de hiera picra partem 1. aut de hiera Gale
ni maiori, aloës succocitrini electi partes duas, mi
sce, & cum syrupo de stœchados fiat magdaleon
pro pilulis.

Eradicatiuum solutiuum: Recip. Pilul.
foetidarum de hiera de quibus supra, agarici
ana ʒ 1. zingiberis grana 2. misce ut in primo mi
noratiuo, scilicet infundendo agaricum in oximelle
simplici. Solutiuum facile: Recip. Pilularum
alephanginarū ʒ 2. agarici ʒ 1. agaricus infunda
tur in oximelle simplici, deinde misce & fiant pi
lulæ.

Cerebri & neruorum confortatiuum &
causarum tam antecedentis quàm coniunctæ dige
stiuum & resolutiuum: Recip. Radicū pœoniæ
ʒ 2. specierum diamusci dulcis ʒ 1. s. cassiæ lignæ
ʒ s. sacchari albißimi ʒ 6. pistanda pistentur, de
inde omnia simul misce & cum aqua maioranæ &
saluæ ana, fiat confectio solida in morsellis ʒ 3.
pro quolibet.

Aliud cerebri confortatiuum effi

E 5 catius:

catius: Recip. Specierum diambrae 3. s. ofsis de corde cerui 3. 1. radice pœoniae 3. 2. carpobalsami, gallie moschatae ana 3. s. linguae arietis 3. 1. sacchari albißimi 3. 8. puluerizāda puluerizētur, fiat confectio ut supra. Aliud efficacius: Recip. Radicum uitis albae, radicum aristolochiae rotundae ana 3. 1. radice andacochae, radice pentaphyllon ana 3. s. spicae, epithymi ana 3. s. sem. plantaginis 3. 2. corallorum rub. 3. 1. puluerizāda puluerizentur, deinde ex omnib. simul mixtis fiant pilulae 7. pro 3. Digestium usuale: Recip. Aquarum betonicae, salviae ana 3. 1. maioranae 3. 1. s. radice pœoniae puluerizatae grana 2. sacchari albißimi 3. 2. misce. Caputpurgium & cerebri confortatiuum: Recip. Aquarum maioranae 3. 1. succi foliorum bliti 3. s. nigellae 3. s. pœoniae 3. 1. mannae electae 3. s. omnia misceantur. Cerebri confortatiuum: Recip. Theriacae Andromachi 3. 1. s. Cerebri & nuchae confortatiuum: Recip. Vnguenti de bdellio Mesuae 3. 1. corallorum rub. 3. 2. seminis plantaginis 3. 1. oleorum liliorum alborum 3. 1. spicae 3. s. ladani quod sufficit ad omnia simul tenacitatem faciendam, cerae nouae, quod sufficit pro unguento molli puluerizanda puluerizentur, & fiat unguentum ad lentum ignem. Cura epilepsiae confirmatae in qua

qua potest dari syrupus talis: Recip. Syrupi de
stoechados ℥. i. oximellis scyllitici ℥. s. aquæ sal-
uæ, aquæ maioranæ ana ℥. i. s. pulueris seminis
pœoniæ ℥. s. misce. Pilulæ efficaces: Recip. Pi-
lularum de hiera maiori, cochiarum, agarici ana ʒ
i. salis gemmæ, grana 2. misce & cum electuario
Indo quod sufficit ad incorporandum formentur pi-
lulæ 7. Pilulæ faciles: Recip. Pilularum de hie-
ra simplici ʒ. 2. agarici ʒ. i. salis gemmæ gran. i.
misce, & formentur pilulæ cum dicto electuario.
Confectio: Recip. Myrobalanos chebulos conditos
numero 2. diamusci dulcis ʒ. 3. diacastorij ʒ. s. aro-
matizentur cum seminibus nigellæ, siseleos, pœo-
niæ ana quod sufficit ad aromatizandum. Cly-
ster: Recip. Mercurialis M. i. s. maluæ M. i. stœ-
chados, maioranæ, radicum foeniculi, petroselini,
centaurij minoris ana M. s. seminis cartami ʒ. 3.
cassie fistulæ, hierepicræ ana unc. s. sacchari rub.
unc. i. uitellum oui i. olei anethi unc. 3. herbæ, radi-
ces semina bulliant sufficienter, deinde optimè ex-
primantur & colentur ultimo, duobus cyathis di-
stæ colaturæ reliqua omnia addantur & fiat cly-
ster. Masticatorium: Recip. Siseleos drachmam
unam, mastiches drachmam s. nucis moschatæ scriu-
pulum unum, pyrethri drach. i. ceræ quod sufficit
ad in

ad incorporandum misce & fiant pilule parue,
 olfaciant rutam sepiissime. Mastice sepe masti-
 chen. Caputpurgium: Recip. Aquarū maioranæ
 3 2. pulueris radicum ireos 3 2. nucis muscate 3
 1. misce. Summum remedium est mutare aërem
 humidum in siccum, ut Auicenna prima tertij cap.
 2. de epilepsia, et Hippocrates 2, Aphorismorum:
 Analepsia seu catalepsia eandem habent curam
 cum prædictis, & cum scotomia & dolore capitis
 ex causa remota. In nulla epilepsia debet dari opi-
 ata nisi stomacho inanito & purgato. Omne enim
 anthidotum, excepto sale sacerdotali & Marcelli
 & diacitoniten, & similibus confortatiuis, stoma-
 cho inanito conuenit exhiberi.

De incubo & succubo.

Cap. VII.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Incubare dicuntur ij qui dormiunt ad
 accipienda responsa. Vergilius: Pellibus
 incubuit stratis. Incubare etiam pro co-
 ire accipitur, unde incubi dicti sunt Syluani et Fau-
 ni, quos improbos quandoq; fuisse mulieribus com-
 pertum est, & earum appetisse & peregisse con-
 cubitum. Item quidam esse demones quos non
 nulli

nulli Clusios nuncupant, hos nonnulli existimant spiritus esse elemēto aëreo corporatos. Nam ut hoc elementum etiam cum agitur flabello, sensu corporis, tactuq; sentitur, ita hos dæmones hanc etiam pati libidinem posse, ut quando possunt sentientibus foeminis misceantur. Dæmones quidam scripserunt animas hominū esse & ex hominibus fieri lares, si meriti boni sint. Lemures seu laruas, si mali. Dæmones enim aliquando humana corpora sunt ingredientes, uel uiuentia adhuc, uel iam mortua, & sub humana specie modo ineuntes mulieres, qui incubi dicuntur, modo se uiris subiicientes qui uocantur succubi.

Ex traditione Theologorum:

Incubus ab incubando dictus est, eo, scilicet quod appareat phantasma graue incubare homini in somnis ac si cum eo cubaret, quod phantasma homines dormientes secundum plurimum reputant esse dæmonem, quod, ut uolunt Theologi, aliquando est uerum, sed minus post aduentum Christi cum antea cum hominibus magis conuersarentur. Propter quod sciendū de intentione Augustini 15. de Ciuitate dei, quod reperiuntur dæmones qui dicuntur incubi & succubi. Imō unus & idem est incubus, postea succubus.

bus. Vnde demon aliquando suscipit formam quā
ex aëre conficit, colorem enim suscipit per multam
condensationem sicut aqua per congelationem.
Assumit ergo formam alicuius mulieris cum aliquo
uiro consueta, & cum illo succubo uir coit putans
coire cum muliere cuius formam dæmō assumpsit,
cum demon sit succubans in modum mulieris & re
cipit sperma, quod conseruat, & factus postea in
cubus accipiens formam uiri alicui mulieri consue
ti, & secum coiens interdū ipsam imprægnat. Nec
est dicendum inde genitum esse filium dæmonis,
sed uiri cuius sperma recipit, quod postea in matri
cē iniecit, sicut nec imprægnata in Lanello secundū
quod recitat Auerrois peperit filium Lanelli, sed
eius qui spermatizauerat in Lanello. Et hoc modo
affirmant multi fuisse genitos gygantes, quorū ma
ior copia fuit ante diluuium quā post. Legitur e
nim in historia beati Bernardi quod demon siue in
cubus annis pluribus cum muliere quadam dormi
uit, etiam marito mulieris in eodem lecto condor
miente, hoc tamen nephas ignorante. Itaq; tandē
mulier pœnitentia ducta ualens deinceps licentia
re & expellere incubum, non potuit, ubi beato
Bernardo conquerens, qui ipsum dæmonem ar
dentibus candelis excommunicauit, & sic mulie

rens

rem liberauit ab incubo. Item beatus Augustinus
 15. de Ciuitate dei ait: Creberrima fama est, mul-
 tiq; experti sunt, uel ab illis qui expertos se audisse
 affirmant Syluanos atq; Faunos, quos uulgo incu-
 bos uocant, improbos sepe mulieribus extitisse, &
 earum appetisse & peregisse concubitum. Item in
 historijs Arcturi regis Britanniae sepius leguntur
 huiusmodi accidisse.

Ex traditione Pænorum & Ara- bum medicorum.

Incubus describitur ab Auicenna prima
 tertij tractatu quinto, capite proprio sic:
 Incubus est aegritudo in qua homo sen-
 tit cum somnum ingreditur fantasma graue super
 se cadens & comprimens ipsum, & angustiatur ei-
 us spiritus, & intersecatur uox ipsius & motus ei-
 us, & fortasse praefocatur propter pororum oppi-
 lationes, & cum ab ipso separatur excitat eum
 subito. Rasis Pœnus cum huic non succuritur,
 quando assiduus fit & multiplicatur, perducit ad
 epilepsiam, & fit ab assiduatione multitudi-
 nis sanguinis in corpore. Et signa eius sunt:
 Rubedo oculorum, & diminutio somni.

Cura

Cura eius est uetosatio cruris assidua post phlebotomiam saphenæ, & minoratio cibi, & dimissio uini. Et fit ex dominio phlegmatis, & signa eius sunt tarditas sensuum, & multitudo sputi, & muscilagines, pigritia corporis, & mollificatio eius, & cura eius est cura epilepsie phlegmaticæ.

Extraditione autorum recentium.



Incubus est ægrotudo quia sensibilibus lædit operationes. Si enim accipiat incubus pro oppilatione est ægrotudo in uia. Si uero accipiat pro istis actionibus læsis, scilicet motu, anhelitu, & uoce, quamuis sit actio uel actiones læse, & per consequens accidens ægrotudinis, est tamen ægrotudo ex eo quod motus impeditus impedit anhelitum, & anhelitus impedit uocem. Sentit autem homo cum somnum ingreditur phantasma graue cadens super ipsum & comprimens ipsum, quod phantasma secundum plurimum existimant esse demonem propter opinionem uulgariam quod demones de nocte ambulēt, & cum hominibus coniungantur ipsos lædentes, illud enim nocumentum perceptum in somno facit hominem sic iudicare. Patientes incubum excitari debent, ut calor ad interiora decurrens exteriora petat, poros aperi

ros aperiat & spiritus effundantur, & uentositas
 & fumus conclusus consumatur & euanescat, ple-
 nitudini obuiet. Pallor autem & pavor in his peri-
 culosi sunt. Periculosius autem est si sine somno ca-
 dant aut quasi suffocentur, & post accessionem ad
 sensum non redierint, & corpus tremebundum in-
 ueniatur, ut sudor frigidus à stomacho uel capite
 cum nimia pulsatione cordis. Facies eorum aqua ir-
 roretur, & pede uel manu trahantur, uel uocife-
 rentur quousque ad rectitudinem sensus ducantur.
 Reliqua fiant ut in epilepsia.

De apoplexia. Cap. VIII.

Ex traditione Græcorum et Latinorum.



Attontus dicitur stupidus, & secundum
 Seruium, cui casus uicini fulminis & so-
 nitus tonitruum dant stuporem. Et fit ali-
 quando ex morbo, hoc est ex percussione quam sæ-
 pe mors sequitur, hæc Græcè ἀπὸ πλῆξις siue ἀ-
 πὸ πλῆξις dicitur. Hic morbus etiā dicitur sydera-
 tio, quia cum repētino quodā impetu eueniat, non cau-
 sa aliqua inferiori, sed è cælo uel quadā syderis pro-
 uenire putatur. Hic dicitur etiam Epilepsia, Astro-
 bolia, inde syderati, id est, sydere percussi, & sy-
 derationem passi. Inde etiam Apoplectici, latine
 F attoniti,

attoniti, quorum uidelicet & corpus, & mens stu-
pet ictu fulminis uel morbo. Scribit diuus Hierony-
mus, Valentinianum imperatorem subiti sanguinis
eruptione mortuum esse, quæ græcè Apoplexis di-
citur. Inde scribit in epitaphio Nepotiani, Et ad
præsidem de contemptu seculi. Persuasum autem
uulgo est eum qui repentina morte corruit, eueni-
re id gutta sanguinis è capite in cor delata. His (ut
uult Celsus) sanguis mittendus est, ueratro quoq;
albo, uel alui ductione utendum. Tunc exhibendæ
frictiones, & ex media materia minimè pingues,
cibi quidam etiam acres, & à uino abstinendum.
Archigenes inquit: Apoplexiæ morbus ingens na-
tura est & celeriter graue. Primum quidem alicu-
ius membri paralyti longitudine temporis, uel toti-
us corporis destitutione, uel intelligentiæ obscuri-
tate euenit, magis quidem senibus & per hyemem
& statu frigido, & in magnis incoctionibus suc-
cessionibusq; ingentibus & immoderatis uinolentis.
Talia nanq; habitum refrigerant, ac (ut paucis
dicam) huic ægritudini succumbentes uiuunt mor-
te contaminati, uel omnino citra sensus. Apoplexia
(inquit Galenus) morbus est quo attoniti euadunt
homines, quorum corpus & mens stupeat. Fit in-
terdum ictu fulminis, interdum morbo. Sanè re-
solutio

solutio neruorum frequens ubique morbus est, sed interdum tota corpora, interdum partes infestat, ueteres autores illud apoplexiam, hoc paralyfim nominarunt, sunt qui utrunque uocitent paralyfim. Apoplexia repente ortum indicat suum humorem crassum, uel frigidum, uel glutinosum alueolis cerebri dominantioribus inhæsisse impleseque ipsos, non fit ex distemperantia totius ipsius essentie. Magnitudinem autem periculi conijcio ab respirationis detrimento. Cum enim multum impeditam uideris respirationem, ut uix suum obtineat locum, non exiguam conijcio esse ægritudinem ex cerebri affectione. Est sanè apoplexia (ut diximus) ferè sensus ablatio, & totius corporis concussio, atque immobilitas cum principalium membrorum detrimento statim eueniens. Primum (inquit Archigenes) corpus oleo calido perungendum est, caput uero aspergendum rosaceo cum aceto, in aceto uero præcoquendum serpillum, uel spondylum, & olfactui castorium admouendum. Succus panacis de galbano. Deducendo autem os mellicratum instillandum est, præcipue penna oleo cyprino, uel irino, uel narcissino aspergendo immitte ipsum, et uomitus irritandus, et anus perpetuo pungē

F 2 dus ruta

duſ ruta & cumino, cum nitro & melle ſpiritu pro-
uocando. Quod ſi hæc non profint, utendum cly-
ſteribus ex decoctione furfurũ & cucumeris agre-
ſtis radice, & centaurij, nitroq; & melle, his per-
actis ſanguis eſt detrahendus pronunciando peri-
culum, & ex dextra ſit manu.

Ex traditione Pænorum &
Arabum.



I omnes uentriculi cerebri impleantur
humiditate ſolius ſanguinis ſiue phleg-
matis, ſeu mixtorum cum alijs humori-
bus, & ex hac materia oppilentur uentriculi cere-
bri, totius corporis ſenſus atq; motus auferuntur,
& eſt quaſi non intelligens, non uidens nec audi-
ens, & quaſi exanimatus, omnes enim ſenſus ani-
mæ corrumpuntur niſi ſolum motus thoracis in an-
belitu, qui ſi auferatur efficitur infirmitas moleſti-
or & peior, hanc infirmitatem Philoſophi apople-
xiam magnam uocant. Raſis Pœnus: Apople-
xia fit ex ſanguine, & ſigna ſunt rubedo maxilla-
rum & faciei, ita ut ſit quaſi ſuffocatus, et exubera-
tio alguidegi & uenarum. Et cura eius eſt phlebo-
tomia ambarum cephalicarum ſimul in hora una,
& aſſiduatio uentofarum poſitarum ſuper crus, et
minoratio cibi, & dimiſſio uini & lactis, & aſſi-
duatio.

duatio balnei. Et fit ex humoribus crudis phlegmaticis. Et signa sunt mollificatio corporis, albedo coloris, & multitudo muscilaginis & sputi. Et cura eius est hiera, diacolocynthida, et cochia, & hiera Rufini, & enemata calida & acuta, & olfactus plantarum calidarum & odoriferarum, & musci, & gallie, odorare rutam & castorium, & gargarismus cum sinapi & syrupo acetoso, & hierapicra, & sternutatio cum pipere & castorio, & cōdisi, & similibus. Serapio: Scias quod apoplexia accidit quando læditur origo nervorum, & læduntur cum ea membra corporis omnia, quare destruitur motus eorum, & ipsorum sensus cum nocummento operationum omnium membrorum principalium. Causa huius ægritudinis est phlegma frigidum grossum implens uentriculos cerebri & prohibēs spiritum animalē penetrare. Et scitur quod huiusmodi humor coartatur in uentriculis cerebri principalibus, in hac ægritudine non sanatur sanatione integra, sed redit ad paralysim. Quod est quia si esset in non principalibus uentriculis sicut est epilepsia, natura mundificaret eam uelociter. Auienna: Aliquando accidit ut homo apoplexiam incurrat, & non fit differentia inter ipsum & mortuum, deinde reuiuiscit & sanatur. Et propter hoc

F 3 uolunt

uolunt ut tardetur sepultura ambigui 62. horis ad minus. Apoplexia uero resoluitur secundum plurimum ad paralyfin. Si apoplexia accidit cum caliditate & siccitate complexionis tunc est res praua. Aegritudo quæ est contraria complexionis non accidit nisi propter magnam causam. Et raro apoplexia accidit à caliditate. Apoplecticus clamat in aduentu eius. Cum seni acciderit uertigo concomitās iterata, tunc illud nūciat apoplexiam. Repletio uero apostematis est ex speciebus apoplexiæ parua, quæ cum apoplexia fuerit febris, tunc illic erit apostema secundum plurimum. Potus eorum sit aqua mellis pura cum speciebus. Haliabbas: Hoc autem accidēs curationi difficile est, imò incurabile si fortis sit passio, nec facile sanatur si debilis, in paralyfin & faciei transit contorsionem. Quæadmodum Hippocrates in Aphorismorum libro loquitur dicens: Apoplexia si fortis sit curari nequit, & si debilis facile non est.

Ex traditione autorū recentium.



Apoplexia tres habet gradus, in quadam est repletio omnium uentriculorum & panniculorum & totaliter, & hæc est maior. In quadam uero est repletio omnium sed non totaliter omnia sunt repleta, sed secundum ma-

ior em

iozem eorum partem, & hæc est media. In tertia uero omnes panniculi humiditatem habent extraneam, sed nō sunt repleti nisi ad medium uel citra, & hæc est minor. Prima uero est mortalis, quia uirtus regitiua cerebri extinguitur, nec aliquid recipit de uitali spiritu à corde, quia uia sunt penitus clausæ, & eorum anhelitus uix percipitur, uocem habent penitus strangulorum, neque spuma potest exire, neq; possunt suspirare. In media uero anhelitus est inordinatus magis exiens per os quàm per nares, & bene spumant. Hæc autem non euacuatur à timore magno, quia si sanatur difficilimè sanatur. Non enim aliter potest curari nisi per mutationem in alium morbum. In minori uero suspiria sunt ordinata, & cum facilitate suspirant, & hæc facilius curatur. Qui plurimam utuntur phlebotomia, & medicinis calidis resoluentibus in senectute incurrunt apoplexiam, quia talia faciunt humores leuiter moueri, qui moti in senectute & non expulsi cerebrum comprimunt & ledunt. Habentes uero complexionem & ætatem humidam, & eorum regimen & corpus humidum, citius incurrunt apoplexiam, & maxime si sit communis frigiditas. Apoplexia quæ uenit in decremento lunæ minus molesta esse consuevit.

F 4 Si apo-

Si apoplecticus desiderat sibi multos cibos & potus afferri diuersos & statim uisos abominatur, mortem significat, si non spes curationis beneficio medicine postulabitur. Si ex sanguine statim minuat de uena cephalica si fortis sit, quod etiam summum remedium est in omni apoplexia de quocunque humore corpore existente pletorico. Et si de alio humore quam sanguine, purgandi sunt fortibus medicinis calefacientibus & dissoluentibus et attrahentibus humores à cerebro, ut hiera fortissima Galeni, Theodoricum, stomaticum laxatiuum cum colocynthida. Dentur pilule si sit ex phlegmate: Recip. Aloës, euphorbij ana, formentur cum succo porri. Præceperunt enim antiqui in maioribus morbis fortioribus uti medicinis. Corpore ergo mundificato si fieri potest, uel si non, statim dentur theriacæ in acceßione ad potandum § 2. uel potio sancti Pauli cum uino decoctionis castorij. Vomitus autem prouocetur cum euphorbio, castorio, pyrethro, digitis uel penna in ore missis. Blanca data multum ualet corpore existente forti, similiter pilule foetidae. Si ergo phlebotomiam nec catharticum suscipere potest propter defectum ætatis uel uirtutis timorem inducentis, poterit ad localia transcurrere. Capite ergo abraßo fiat em
plastrum

plastrum de sinapi distemperato cum fortissimo aceto admixto castorio uel euphorbio. Fiat etiam emplastrum aperitiuum ex fœnugræco, fursure triticeo in modico uino coctis. Inunctio fiat cum unguentis calidis, aperitiuis, dissolutiuis, acutis cum euphorbio, castorio, pyrethro, uel de succo apij cū puluere euphorbij, uel succo rutæ, nasturcij, saluæ, cum prædictis. Sternutationes fiant cum pyrethro, castorio, helleboro, & similibus. Succus centaurij & urticæ occipitio cum sale apponantur. Gargarismata fiant cum pyrethro, euphorbio, & similibus. Clyster fiat attractiuum, mordificatiuum, & laxatiuum de folijs maluæ, bliti, radice cucumeris agrestis, oleo & melle, & ut antiqui uolunt, de helleboro, mercuriali, aceto, & aqua bullitis apposito fursure & sale armoniaco, oleo & melle. Ungatur anus cum felle tauri. Suppositorium fiat de 3. 2. nitri 3. 1. s. castorij, scamn. o. nij 3. s. in omnibus autem hic semper fiat processus à debilibus ad fortiora. Cornu caprinū cōbustū uel asæ foetida naribus applicentur. Et omnia ista de minori aut media apoplexia intelligimus. Maiorem enim, secundū Hippocratem, soluere impossibile est: Notatu dignū est quod in apoplexia et paralyti, et spasmō de repletionē summa cura est pro

F S uocatio

uocatio febris,dieta autem sit & calida et sicca,ui-
num excellentissimum in declinatione

De paralyfi. Cap. IX.

Ex traditione Græcorum &
Latinorum.

Paralyfis neruorum est dissolutio tremo-
rem inducens & manus præcipue red-
dens inutiles, tanto proteruior morbus
quanto & latere minus potest, & membri magis
necessarij usum excludit. Videns enim natura cre-
asse se hominem nudum, imbecillem, ac inopem,
manus excogitauit, ut hoc uno instrumento muni-
mentorum, quæ pecudibus dederat, defectum sup-
pleret ei; sarciret. Παράλυσις Græcè, dissolutio
neruorum Latine dicitur, & Græcè ἡμιπληξία,
hoc est, semiapoplexia, cum alteram tantum cor-
poris partem id malum inuasit, dum enim totum
corpus, apoplexia dicitur, nunc utrunque, teste Cel-
so, paralyfis appellatur & acuitur antepenultima,
inde paralyticus dicitur. Hi & Græco uocabulo
κλινικοὶ dicuntur. Vnde in Euangelio legimus: Pe-
tronellam κλινικὴν factam, hoc est, paralyticam,
& in lecto decumbentem. Diuus Hieronymus in
Epitaphio Fabiolæ uidetur differentiam facere in-
ter

ter paralyticum & clinicum, dum inquit: quem nū-
dum & paralyticum & clinicum non Fabiolæ ue-
stimenta texerunt. Verum apud Hieronymum: Cy-
pria, itemq; Plinium non legitur clinicus sed cluni-
cus, ut sint qui morboſi ſunt in clunibus atq; languē-
tes. Clunes autem partes poſteriores ſignificant.
Clinicus autem medicus dicitur qui medicamentis
curat languentes, à lectis ægrotantium quos fre-
quentat dictus, inde & κλινικὴ medicine genus.
Cunctorum quidem neruorum ſenſu pariterq; mo-
tu deleta apoplexia nominatur, in alterutra parte
dextra ſiniſtra uē ſi contingat paralyſis à Græcis,
ſyderatio à Latinis nominatur partis eius cui ob-
uenit. Hic autem inuadit morbus humoribus mul-
tis & tenacibus, & craſſis neruos operientibus,
quibus contra propoſitum noſtrum motus effici-
untur. Non dubium ergo quin educendus ex-
hauriendusq; ſit humor, neque in his commodius
poſſis inuenire principium quàm à ſanguinis è ue-
na detractiōe. Quod ſi aduerſetur ætas uel habi-
tus, tempus, & inſtitutio, & iam præteritus uictus
reliquaq; quæ ſanguinis è uena prohibent detra-
ctionem, moderatam conuenit eſſe ablationem,
ne refrigeretur. Nam frigidity cum aridity
morbum efficit, quare ſolum materia per ſanguinis
detractiōem

detractionem comminuenda præcipue senioribus.
Fiat autem ablatio à partibus sanioribus. Potus pa-
ralyticis de quo ita Archigenes in epistola ad Mar-
sum ait: Est autem præstans remedium à me ma-
gnopere approbatū ad huiusmodi affectiones hoc:
Castorij, seminis rutæ agrestis, pyrethri, acori ana-
obulus, piperis grana 10. cum hydromelle cyatho-
rum 2. dato dimidium primo. Cum fuerit confirma-
tior totum. Aduerte cyathum habere cerates tres
cum acetabuli mensuram significat. Interim tegan-
da sunt membra pelliceo tegmine, aspergēdo oleo
cucumerino uel glaucino, ætate grandioribus etiā
castorium inspergendum. Expedit autem instaura-
re asperersionem, sitq; cibi quā fieri possit paucitas
minima, sint sorbitiones halicæ, pultis & ptisanæ
succij, à sanguinis detractione cum abierint dies a-
liquot. Aluus primum subducatur clysteribus,
inde ex aloë & polypodio, & colochintide asper-
gendo purgandum. Conuenit autem etiam hicra
Archigenis pro uiribus sumpta post purga-
tionem. Perunctiones sunt poten-
tissimæ. Aluus sit perpetuo
soluta.

Ex

Ex traditione Pænorū &
Arabum.

Natura diuisit cerebrum in duas partes, scilicet, anterius & posterius, tamen si cut lineam rectam. Cum ergo accidit aliquid ex accidentibus, & nocet lateri uni, efficit latus reliquum per operationē suam naturalem absque nocumento. Et propter illud creati sunt duo oculi, & duæ nares, & duo uasa cerebri, & duo testiculi, & quæ illis sunt similia. Cum ergo uincit humor uiscosus super duo uasa cerebri, tunc non accidit cū illo nisi apoplexia, sicut diximus in illis quæ præmissa sunt. Si autem resoluator hoc, et declinet humor ad latus debilius, sequitur illud ægrotudo paralysis. Propter illud ergo mollicantur nerui omnes, neruos uero qui in altero existunt latere non consequitur nocumētum, oportet ergo in principio huius ægrotudinis, ne administrentur ex medicinis quæ euacuant uiolenter, quoniā humor non est digestus, & est adhuc in principio. Rasis: Paralysis est duarū specierum quarum una fit ex dominio phlegmatis super caput, & signa eius sunt signa apoplexie phlegmaticæ. Et cura eius est sicut cura illius. Et species eius secunda fit successione

cessione percussione aut casus, & signa eius sunt quod mollificatur totum corpus, aut aliqua membra eius post illud. Cum ergo remanet mollificatio secundum suam dispositionem & minuitur, tunc non est ei cura omnino, & quando minuitur & non remanet secundum dispositionem suam, tunc curatio eius est, ut emplastretur super locum ubi fuit percussio cum emplastris calidis, et inungatur comprimendo cum oleis calidis, sicut oleum de olivis, in cuius ℥. 1. sint dissolutæ castorij ℥. 2. & euphorbij ℥. 1. & sicut hoc emplastrum: Recip. Cere ℥. 5. & olei de lilio, & de narcisco ana ℥. 30. myrrhæ, & opopanax ana ℥. 5. castorij ℥. 3. euphorbij pondus ℥. 2. aggregentur omnia & fiat emplastrum ex eis in latere altero. Auicenna: Paralysis absolute significat illud quod significat mollificatio in quocunque membro sit. Proprie autem significat id quod est commune unius duarum partium corporis in latitudine. Et si communicaret utrisque lateribus simul & cum hoc membri capitis esset apoplexia. Et aliquando est paralysis quæ est crisis in ægritudinibus acutis, scilicet, in apostemate cerebri cum febre continua, qua permutatur materia ad nervos. Et quodcunque membrorum mollificatorum, & paralyticorum secundum colorem

lorem reliqui corporis existens non minoratur, neque extenuatur, est de quo maior est habenda fiducia quàm illud quod diuersum est ab hoc.

Paralysis uero ueniens à remotione spondylium mortifera est secundum plurimum, sed quæ fit ab ictu non conterente neruos uehementer quandoque sanatur, si autem superfluat non est spes ut sanetur. Ad paralysem uero fit permutatio ex apoplexia, epilepsia, colica, præfocatione matricis, & febribus longis secundum semitam crisis. Et dicitur quod cum urina infantis est uiridis, nunciat paralysem aut spasmus. Oportet autem ut sit intentio tua in ægitudinibus neruorum quandoque, scilicet, stupore, spasmus, tremore, paralyse, & saltu, intentio posterioris partis cerebri. Studeas ut facias compati famem, & longam sitim tolerare. Et aqua melior est eis quàm uinum. Vinum enim materias in neruos penetrare facit, & plurimum quidem ipsius quandoque acescit in corporibus eorum, & fit acetum. Acetum autem est ex rebus quæ neruis sunt nocibiliores. Et oportet ut ponatur medicinæ super principium neruorum mouentium membrum, nam positio earum super membrum paralyticum non affert iuuamentum de quo sit curandum. Et oportet ut clysterizetur clysterib. fortib. & collyria fortia supponantur

supponantur, & eorum materie ad inferiora inclinentur. Quandoq; plures eorum iuuantur cum his quæ infrigidant, & confortant, & prohibent materias fluere, & cum medicatur calidis augmentatur ægrotudo. Et quando aggregantur paralysis & febris in aliquo, tunc oximel cum saccharo rosato est conueniens medicamen in illa hora. Et non properes in usu medicinarum fortium in principio rei, imò tarda usq; ad quartum & septimum.

Ex traditione autorum
recentium.

Paralysis est oppilatio neruorum sensibilium uel motiuorum et eorum relaxatio, membra à sensu uel motu priuans uoluntario uel utroq;. Oppilantur enim nerui sensibiles & motiui ex humore phlegmatico uel sanguineo, uel melancholico supra ipsos fluente & relaxante. Ad quod notandū, quod quemadmodū nucha oritur à pāniculis cerebri, scilicet, pia matre et dura, ita nerui à nucha. Ex filis ergo piæ matris & duræ fit nucha, etiā filis ulterius procedētibus generantur nerui et uenæ, & ulterius progredientib. cōtextitur coriū. in omnibus ergo his sunt lōgitudinales et latitudines, et texētes, id est, trāsuerfantes.

Sensibiles

Sensibiles autem, ut uolunt quidam, fili oriuntur à prima parte capitis, motiui à posteriori. Sed quia in nucha coadunantur in neruis cum oriantur à nucha, mixti sunt & coadunati, unde nerui sensibiles omnes sunt motiui. Veruntamen neruorum dicunt esse diuersitatem, quoniam pars interior oritur siue contextitur ex filis interioris panniculi, exterior exterioris. Vnde secundum interiorē recipit sensum, secundum exteriorem motum. Et secundum oppilationem factum interius uel exterius (ut dicunt) auferitur sensus uel motus, uel secundum diuersitatem humoris fluentis, & diuersitatem filorum recipientium, est diuersitas egritudinum. Quando autem humiditas indefinita fluit super neruos, oppilat ipsos, unde impeditur transitus spiritus & claritas. Fuerunt autem qui dixerunt nullum neruum concuui, nisi opticum sensum & motum subito fieri. Transitum autem spirituum, cum sint corporei, non posse esse subitum, quare spiritus non deferre sensum & motum. Dixerunt ergo hoc per irradiationem animæ per claritatem neruorum. Si ergo umbrosa materia oppilet neruos, prohibetur transitus uirtutis illuminantis membra, quare cadit sensus et motus. Et hoc idem patet, si membrum aliquod oppiletur inter epar & membrum nutriendum, prohibetur

G

hibetur

hibetur transitus uirtutis illuminantis mēbra, quare cadit sensus & motus. Et hoc idem patet, si membrum aliquod oppiletur inter epar & membrum nutriendum, prohibetur uirtus immutatiua peruenire ad ipsum, quare non nutrietur, grossum enim impedit transitum subtilis. Alijs autem secundum hoc uidetur superflua esse generatio spirituum cum si re spiritibus uirtutes compleantur, sed dicimus huiusmodi irradiationem nihil aliud esse quam spiritus irradiatos. Eorum ergo generatio etiam est continua, & motus imperceptibiliter uelox, ut patet in uisu. Sed cum nutrimentum membri non impedit transitum spiritus, quare nec humor oppilans uidetur impedire. Membrum enim ex quo generatur etiam nutritur, etiam ex quo nutritur oppilatur. Sed ad hoc dicendum quod nutrimentum membri simile est in essentia membro et qualitati, quare non impedit, humor autem non digestus, etiam si materialiter possit esse nutrimentum, cum non sit essentia completa, substantia liter nec formaliter a nutrimento est alienus, quare nec operationem nature suscipit, nec digestionem, unde umbrositate et grossitudine transitum inhibet. Paralysis alia mortificationis, & alia remolitionis. Paralysis mortificationis habet fieri ex melancholia uel oppressione neruorum sensibilium, id est

cum

cum amittitur sensus uel minoratur. Principaliter
paralysis remollitionis ex phlegmate uel sanguine
uel oppilatione neruorum motuorum; id est cū mo-
tus principaliter diminuitur. De sola enim cholera
nequit esse paralysis. Item paralysis alia uniuersa-
lis, alia particularis. Vniuersalis est quæ mediā cor-
poris partē uniuersaliter occupat. A lesione enim
partis denominatur paralysis. Particularis paraly-
sis est quæ fit in aliqua parte corporis, ut facie, lin-
gua, manu, uesica, stomacho, pede. Paralysis autem
sepiissime fit ex phlegmate, raro ex melancholia, rā-
rissime ex sanguine. Accipiant cognitiones ex quo
humore fuerit paralysis ex ætate, tempore, regio-
ne, & habitudine præcipue. Regimen totum in pa-
ralysi & proprie nutriens generaliter sit calidum
& siccum in primo usq; ad secundum inclusiue ad-
libitum & secundum necessitatem, & ipsum non
transcendat secundum gradum. Singulo die uētris
beneficiū habeat, aut naturaliter aut artificialiter.
Clyster lenitiuum: Recip. Brodij pulli optime pin-
guis cōpletæ decoctionis ℥. 12. utellos ouorum. 2.
numero, olei liliorum alborum ℥. 4. pulueris sacha-
ri ℥. 1. salis cūmunis ℥. 2. misce, & fiat clyster, et po-
test addi casia fist. ℥. 1. hierepicræ ℥. 5. utatur isto
clysteri semel in hebdomada uel āplius. Et si esset

tempus calidum, loco olei liliorum ponat tantundē
olei oliuarum. Aliud efficacius: Recip. Foliorum bli
ti M. 1. s. mercurialis M. 1. stœchados, saluie ana.
M. s. uitellum oui. 1. casie fistule ℥. 1. hieræpicæ, sa
chari rub. ana ℥. s. olei liliorum alborum ℥. 3. salis
communis ℥. 2. herbe istæ bulliant in aqua fluuiali
quod sufficit pro debita quantitate, deinde optime
exprimatur & coletur ultimo ℥. 1. 2. colaturæ reli
qua addantur & fiat clyster. Solutium materierū
communium uirtuti familiare: Recip. Casie fistulæ
℥. s. aquæ saluie, quod sufficit ad ipsam casiam mun
dificandam ab arillis suis, & ad eandem dissoluen
dam proportionē misce, & fiat potio, stet ieiunus
horis quatuor, & pro ferculo comedat blitū cum
boragine & fœniculo, & carnes hœdi pulli uel ui
tuli aut similes. Aliud efficacius solutium: Recip.
Mannæ electæ ℥. 1. aquæ saluie quod sufficit & fi
at potio ut prius. Digestium facile & usuale: Re
cip. aquæ mellis factæ secundum canones ad hoc
quod sufficit pro decoctione infra scriptorum triū,
saluie partes. 2. maioranæ partem mediam, ros
marini partem unam, incidantur minutim & simul
bulliant usq; ad consumptionem tertiæ partis, &
ultimo colentur & accipiat calidum in aurora plu
ribus diebus continuus, & post stet ieiunus horis
quas

quatuor. Diuersium: Extrema fricentur cum pan-
no suaui ter calido per horam ante cibum. Si iterum
uult medicamē efficacius tunc Recip. Syrupi de stœ-
chados ʒ. i. oximellis simplicis ʒ. s. aquæ saluæ
ʒ. i. s. aquarū hyssopi, absinthij ana ʒ. i. misce, post
uero debitam assumptionem alterius digestiuorum
suprascriptorum sumat dosim ex pilulis sequenti-
bus: Recip. Pil. alephanginarum, agarici ana. ʒ.
i. salis gemmæ, zingiberis ana gran. i. misce & cū
syrupo de stœchados formentur pilulæ 6. Caput
purgium per nares attrahendum: Recip. aquæ ma-
ioranæ ʒ. 2. pulueris nucis muscatæ ʒ. i. mellis ʒ.
2. misce. Digestiuum familiare: Recip. aquæ saluæ
ʒ. i. aquæ maioranæ, herbæ hyssopi, absinthij ana ʒ.
i. pulueris nigellæ ʒ. s. sachari albi ʒ. 2. aut mellis
ʒ. 3. misce. Solutiuum usuale & facile: Recip. pilu-
larum suprascriptarum quantitatem ad libitum. Ce-
rebri confortatiuum, suffumigetur camera ex thu-
re. Hunc uerò fumum à longe recipiat & non radi-
os directos, aut suffumigetur cum auihus cypri arti-
ficialibus, uel ligno aloës ad libitum. Cerebri con-
fortatiuū ut supra: Recip. Cubebarum ʒ. i. s. carda-
momi ʒ. i. nigellæ torrefactæ ʒ. 3. misce, deinde li-
gentur in sindone graneo subtili & raro. Istam mi-
xturam odoret crebro, & proprie stomacho ieiun-

no. Cerebri confortatiuum et cordis: Recip. Theriaca debita fermentata 3. 1. s. aqua salvia 3. 2. misce. Ista theriaca assumat stomacho ieiuno in aurora per decem horas post coenam, et post ipsius assumptionem stet ieiunus horas 6. et interim dormiat, sed non amplius duabus horis. Aliud: Recip. Acori nutriti secundum canones 3. 5. Aliud: Rec. Dyacori 3. 3. Solutiuum aliud facile: Rec. Pil. Assai eret, agarici ana 3. 1. salis gema, zingib. ana gran. 1. misce, et cum Syrupo de stœchados fiant pillulae. 6. 1. starum pilularum assumat ab una ad duas diebus continuis aut interpolatis sero dum uadit dormitum, et aliquando ante coenam. Cerebri, uisus stomachi, et epatis confortatiuum: Recip. Myrobalanum chebulum conditum numero. 1. hunc assumat in aurora diebus ad libitum. Aliud efficacius cerebri confortatiuum: Recip. Florum salvia uiridis quod sufficit pro conserua delectabili, mellis electi lib. 2. specierum diamusci dulcis 3. 1. misce, deinde fiat conserua secundum canones. Cerebri nuchae et neruorum confortatiuum: Recip. oleorum liliorum alborum unc. 2. spica, chamomila ana unc. 1. specierum dyamusci dulcis 3. 2. misce. Ex hac uncti one ungantur nucha, spondilia colli, et omnia spondilia spine et etiam membra lesa. Solutiuum cradicatiuum

dicatium: Recip. specierum hierapicre Gal. pil. scetidaru, agarici ana ʒ. i. salis gēme gran. i. zingib. gran. s. misce, et cū electuario ludo q̄ sufficit ad incorporandū formentur pil. ʒ. pro. 3. istarū sumat. ʒ. 2. in aurora. Et in termino quinq; horarum post ipsarū pilularū assumptionē assumat pro lauatiuo unū cyathū aque ordeī exorticati calidum sine saccharo, deinde post unā horā prandeat, istas pilulas assumat post cōpletam assumptionem digestiui supradicti. Cōfectio olei de serpentib. ex quo unguentum præcipuū in paralysi, et fit ex serpentib. uis amputatis capitibus, et caudis spacio quatuor digitorum, interiorib. proiectis, reliquis in olla positis, supra quā sit olla posita pforata in fundo, bene sigilletur in medio, ne aqua intret os ollæ superioris bene claudatur in caldario, in aqua bulliēte ponatur. Distillādo distillabit pinguedo cui addatur radix caparis, succus cētaurij, castorij et similia, et fiat unguentū præcipuū in paralysi remollitionis. Centauriū in uino et oleo coctū ualet. Similiter sinapi et eius semen. Post debitā purgationē singulis 15. diebus offeratur theriaca prædicto modo, et singulis mensib. stupha de calamētho, origano, saluia, cōsolida, maiorana, nasturcio, præmula ueris, lauendula. Exeunti à stupha detur aliqua conserua ut acori supradicti.

G 4 De

De spasmō, tetano, stupore, tremore,
& saltu. Cap. X.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Ræci spasmus dicunt, nos nervorum rigorem, illi tetanum, nos nervorum distentionem. Tetanus cervicis est morbus qui rectam & immobilem cervicem rigore nervorum intendit, & qui hunc morbum patiuntur, ΤΕΤΑΝΙΚΟΙ & latine obstipi vocantur, ex quo genere ὀπίσθονος & ἐμπροσθένονος sunt. ὀπίσθονος sunt qui rigore cervicis inflexibili laborant, & caput scapulis intenditur. ὀπίσθεν enim retro significat, et τόνος intētio uel rigor. Plin. lib. 26. capite 13. In spasmaticis tremulis opisthotonicis alemoe radix bibitur ex aqua mulsa. Sunt aut spasmatici (ut transeunter exponam) quibus aliquid intus conuulsum est, ἐμπροσθένονος uero est ubi mentum pectori ex nervorum rigore annexum est. ἐμπροσθεν enim ante significat. Spasmus membri est patientis abbreviatio, & in longo imminutio à naturali quantitate, hocq; aut in toto fit corpore & vocatur tetanus, atq; hoc ut membrum ab utroq; equaliter extendatur latere, fitq; rectum & in nullam declinat omnino partem, & spasmus qui non extenditur ex membri in utrunq; latus distentione. Cum
statim

statim à principio aut non multo post principium
aegritudinis gignuntur spasmi & expectant, ortūq;
expletionis habuerint cum sudoribus multis praece
dentibus uel uomitibus, uel uentris educationibus,
uel sanguinis magna constiterit eruptio, & cum ali
cui humectantium confestim contigerit cunctas di
uelli partes, repletionem fieri necesse est. Si autē ex
febris exurens aduenit spasmus in uehementi to
tius corporis ariditate, praecipue neruosis aduenit
partibus, estq; huiusmodi maximorum causa malo
rum & propē remedium non admittens. Cum igitur
ante corporis partes intendit ἐμπροσθεν vos
uocitatur, cum uerò post ὀπίσθεν vos, at cum ae
que, ut in partem aequalem aequē intendatur, τῆτα
vos nominatur. In uehementi itaque ariditate spaf
mos, nemo unquā medicatus est. At ex multitudi
ne uel inflāmatu factas multi sunt medicati, affluen
tiam exhauriendo, inflammatum suis & idoneis cu
rando ad mediculis. Fit autem spasmus, ac residet in
uomitibus uehementer diuulsorum, succurrit his cē
taurij tenuis succus, seseli cum oxymelle uel oxy
crato, castorium uero non solum potum sed etiam
extrinsecus perunctum conuenit. Hæc autem profe
rimus eis qui obliuione sepulti sunt. Capiuntur (ait
Archigenes) etiam morbo aliter quā dictum sit,

& absautiationibus, mulieres quoq; in abortu. Qui autem in percussione tetani fiunt, non admodum sanescunt, neq; infantibus neq; senibus tetanicus aduenit morbus. Infantes nanq; comitialis morbus potius infestat, quare non est negligendum, sed è uena sanguis detrahendus, præsertim si in percussione tetanus fiat. Est autem auferendum quantum satis, non equidem ad animæ usq; defectum, nutriendusq; æger pauca halica cum mellicrato, exiguum sit quod probetur. Vnctiones autem & astrictiones admittantur. Inde etiam cataplasmata languentibus sunt locis admouenda, quæ callandi & distrahendi uim habeant, necnon conciliandi, præsertim musculis qui ad ceruicem & maxillas & spinam intenduntur admouenda. Omnium autem efficacissimum est castorium leuigatum datum uno cochleario, post hæc perunctiones ani utiles ex ruta et opopanace. Opitulatur etiam immixtio olei ex ruta cum terebinthina, dandæ sunt etiam ipsius Archigenis hieræ drachmæ 2. cum castorio æque cum ptisanæ succo & melle. Inde aliqua aliorum danda, ipsum quoq; per se castorium exhibendum.

Ex

Ex traditione pœnorum & Arabum.

Spasmus & tetanus sunt non uoluntarij motus, quos membra uoluntariū motum habentia patiuntur propter repletionē neruorum uel inanitionem eorum. Est autem triplex, uel enim spasmus est anterior, uel posterior, uel tantum tetanus, quia spasmus tetanus. Gal. tetanus à spasmo specificatur, sed tamen in membris non apparet spasmus, quia antè & retro æqualiter neruū constringuntur. unde hoc nomē propriè sortitur Haliabbas. Omniū autem harū origo diuersitatum, aut ex repletionē est, aut ex euacuatione, aut frigida mala cōplexione, aut ex calido certe apostemate quod in neruis fit. Et attende quoniam passionēs hę, scilicet paralysis & faciei contortio, apoplexia, spasmus ex repletionē, peiores sunt & uehemētiōres tunc cum iuuenib. & pueris æstate fiūt. Quę etenim has faciūt passionēs causę complexionibus eorū minime conueniunt. Minus autem malę sunt quę senibus & hyeme fiunt propter passionū eorū cōplexionib. & tēporib. cōuenientiā, hęc Haliab. 9. theoricę. Auicēna spasmus est ægritudo neruosa qua mouētur lacerti ad sua principia, et inobedientes sunt in dilatione. Materialis uero spasmus multotiēs accidit secundū semitā permixtionis materię,

teria, sicut successione synanche, pleuresis et sirzē.
Spasmus cum dominio siccitatis accidit, ut contrahatur lōgitudo & latitudo equaliter, colligitur igitur ad seipsum sicut est dispositio corij positi ante ignē. Spasmus qui non proportionatur ad materiā est causa rei impediētis à qua nerui fugiunt & cōgregantur ad expellendum ipsam, & causa ista est dolor. Et omnis quidem spasmus sequēs uulnus, est mortalis. Et cui accidit quartana raro accidit ei spasmus, nam securus est ab eo. Et cum corpus in spasmō declinat ad anteriora, tunc spasmus est in laertis anterioribus & cum ad posteriora, tunc est in posterioribus. Tetanus autem est aegritudo officialis prohibens uirtutem motiuam à contractione membrorum, de aptitudine quorum est ut contrahantur propter nocumentum in lacertis & neruis. Tetanus autem secundum uirtutem est contrarius spasmō, & ingreditur in genus spasmī introitu contrariorum in genere uno, & eius cōparatio ad causam unam est eueniens casu contrariorū. Cum duo spasmī in duabus partibus contrarijs aggregātur, fit tetanus sicut est ante & retro. Tremor est morbus officialis propter defectum uirtutis motiue, à motu lacertorum secundum continuitatem ipsius grauitatis. Et commouentur motus uoluntarij cum
motu

motibus non uoluntarijs, id est, à grauitate membri factis. Tremor autem est nocumentum in uirtute motiua, sicut stupor est læsio in sensibili. Et tremor quidem in senibus medicamine non remouetur. Stupor autem morbus est officialis faciens euenire in sensu tactuali nocumentum. Cum perseuerat stupor & prolongatur, perducit ad mollificationem, aut epilepsiam uel spasmus uel alcuzen uel paralysem communem. Ex curis conferentibus stupori, est exercitium illius membri & assiduatio motus eius. Saltus id est iectigatio, est motus lacertosus, et quandoq; mouetur cum eis cutis adhærens. Et accidit saltus ex accidentibus animalibus plurimum, ut gaudio, ira, tristitia. Serapio: Saltus fit ex uentositate grossa, uaporosa, quæ ingreditur in membrum, & facit ipsum accidere. Sed significat quod ex humore grosso illud quod testificatur. Quod est, quia saltus fit ex uentositatibus uehementis frigoris in corporibus frigidis phlegmaticis, & in temporibus frigidis, & in regionibus quæ simulantur istis. Quapropter non est inter curationem huius ægritudinis, et tremoris differentia. Rasis: Cura stuporis est phlebotomia & minoratio cibi, & completa cura est sicut cura paralyseos quæ est ex frigore. Tremor autem fit propter casum uirtutis post ægritudinem.

Et

Et cura eius est, additio in cibo & somno & in rebus odoriferis. Et fit ex assiduatione uini. Et cura eius est abolere uinum, & assiduatio sudoris in balneo. Et fit ex dominio phlegmatis, et debilitate nervorum. Et cura est cura paralysis quæ est ex frigore. Cura etiam torture est sicut cura paralysis cum gargarismo & masticatione thuris & administrationis nucis muscate & retentione eius in ore suo, & uaporetur cum aceto in quo bullitum est calamentum, & ungatur comprimendo cum oleo narcissino aut de lilio tepidis, & tendatur cutis frontis ad inferiora, & ligetur.

Ex traditione autorum recentium.

Spasmus est contractio nervorum motum uoluntarium impediens. Cum enim propter plenitudinem uel eorum inanitionem contrahantur propter lesionem ingressam super ipsos, retrahuntur ad suum principium. Unde secundum antiquos est contractio uel extensio nervorum & lacertorum in collo precipue & ceruice existentium. Et notatu dignum est quod nervi à pāniculis cerebri oriuntur à nervis lacerti, à lacertis fila, quæ faciunt chordā. Fit autem proprie in lacertis mediantibus, quibus defertur motus. Unde dico contra aliquos quod septem lacerti ueniētes in profunditatem sensus gustus perficiunt. Lacerti enim solū in lingua seruiunt ad faciendū

dū motū ut sit habilis secundū uoluntatē mouētis ad
formationē sermonis. Spasmus aut̄ alius est de ina-
nitione, alius de repletionē. Spasmus de inanitione
non curatur, quia nerui aridi humectari non pos-
sunt nisi mediante humore. Digestio enim non est
nisi à calido & humido, humidum deficit & exha-
lante humido simul exhalat quod secundum natu-
ram est calor. Deficiente ergo calido & humido
deficit digestio, igitur & nutrimentum. Deficiente
nutrimento cadit uirtus, quare & uita cum funde-
tur in calido & humido. Si ex repletiōe fuerit spaf-
mus, & sanguis fuerit in causa, phlebotometur
de uena mediana, uel apponantur uentosæ cum
scarificatione circa collum et occiput, et postea in-
ungatur collum, ceruix, et spina cum oleo rutaceo,
et detur eis mel cum castorio. Aliqua tamen non
ponunt uentosas, utere tamen eis secundum quod
uidebitur dispositio ægri. Ieiunare debet per tri-
duum omnis spasmofus de repletionē. Si uero ex alijs
humoribus sit ut phlegmate et melācholia, pur-
getur humor in causa quam urina demonstrabit
cum hierapicra et benedicta, uel dentur pil. sequen-
tes: Recip. Castorij, assæ foetidae, petrosel. serapini, a-
na, et formentur pil. 7. pro. 3. cum Syrupo de stœ-
chad. da ut uidebitur, etiam ualet: Recip. piperis, o-
pjj,

pij, ana. da cum uino in pauca tamen dosi. Vngatur cum unguentis calidis et siccis, ut martiaton et aragon, oleo rutaceo Vesica plena oleo super locū dolentem ponatur. Detur eis diacastorium, quod si non habeas distempera castorium cum melle et exhibe, uel castorium cum ruta. Sacellatio fiat cum sale torrefacto. Sternutationes et gargarismata et inunctiones fiant ut in capite de paralyti docuimus. Et nutriatur cibus subtilibus et tenuiter. Cura tetani est ut spasmi. Sed in cura tremoris et iectigationis, quia fiunt ex frigidis humorib. castorium cum uino calido iuuat, præcipue si cum nausea fiat addita lauentula uel saluia. Confortatiua generaliter dare cōuenit ut diamarg. gariophil. dianthos, diaciminū, diasatyrion. et uinū aromaticū cū speciebus confortatiuis cōditū. Vngatur cum marciatō, aragō, cum oleo laurino uel iuniperino. Et maxime articuli cum sale confricentur. Fomentetur aqua marina, decoctione agnicasti, betonicæ, sauinæ, fiant balnea sulphurea & nitrosa, purgentur cum blanca, aut benedicta, cum hermodactylorū puluere, & si sit ex sanguine phlebotometur, & fiant alia quæ diximus in paralyti.

De

De catarrho seu distillatione, coryza
& brancho. Cap. XI.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Distillatio morbus est quando humor distillat ex capite cum nocumento, quæ Græcè *κκττασσυμὸς* dicitur, secundum non nullos catarrhus, coryza, branchus. Distillationes meminit Diuus Hieronymus contra Rufinum dicens: Nemo enim unquam carnem suam odit, regio morbo laborantes, phthisi, & catarrho, & distillationibus mortem uitæ præferant, & sua oderint corpora. Grauedo etiam significat distillationem humoris ex capite, quæ teste Celso, nares claudit, uocem obtundit, tußim siccam mouet, quæ Græcè *κὀρυζα* dicitur. Hippocrates uero distillationes omnes & grauedinē nominat coryzas. Aliquando tamen grauedo accipitur pro torpore, & capitis grauitate somnolenta. Grauedinosi dicuntur non solum (teste Cicerone in quarta Tuscul.) qui grauedine infestantur, sed etiam qui procliuiiores sunt ad hunc morbum. Rheuma uel rheumatismus dicitur eruptio siue fluxus à *ῥέο* quod est fluo. Plin. lib. 28. cap. 8. Elephanti sanguis præcipue naris fluxiones omnes, quas rheumatismos uocant, sistit. Grauedinis & distillationis causa est cerebrum. In frigiditatibus

H

tibus

tibus nanq; actum ad distemperamentum, in ossib.
autem æstuans & succensum calore, cumq; plus ui-
ni & austeri sumptū est, repletur caput lauacraq;
calidiora subiuit, & larga caloris suffusio subiuit ca-
put, præsertim calidum nutrimentumq; in uentre
accensum & non sedens in caput impetū facit, ple-
num caput deorsum porrò humorem transmittit,
& siquidem in nares ea defluit redundantia, κατὰ
ῥῆνα cum morbum uocant Græci, grauedinem nostri,
unde grauedinosi qui ei morbo obnoxij, sin autem
in guttur morbum efficit uuam appellatum gignit,
quod Græci uocant κατὰ τὸν ῥιῖνα, distillationē nostri,
hic morbus circa gurgulionem consistit, alioquin in
tumorem consurgit. Expeditissima igitur est in na-
res osq; fluxus delatio, est etiam cum in oculos ir-
rumpit, aliquando etiam in aures. In os autem dela-
tionem suscipit etiam stomachus, & aspera arte-
ria necnon guttur, humectatum autem guttura de-
fluentibus in ipsum à capite humoribus. Primo qui-
dem raucam efficit uocem, postea uero pusillā red-
dit, quod si augeatur intendaturq; malum, tota uox
amittitur, coalescit nanq; cum gutture ipsa aspera
arteria. Et si defluxus acutus sit, non in uocem mo-
do pernicies ad dicta membra peruenit, sed etiam
molestissima quædam penetrat abrosio, natura hu-
iusmodi

inmodi, cuiusmodi sepe cutis diuinitus euadit ci-
tra causam aliquam exteriorē, ita autem etiam
pulmo ipsis exulceratur, & morbus quōdā à Græ-
cis, à nostris Vomica dici solet quibusdam alijs satis
dicunt Tabem appellari. Sin autem in stomachum
& uentrem defluxus conuertatur, qui frigidus sit,
in frigidam distemperantiam corpora perducit. Si
uero calidus, calidam exulcerat, id quoque postea
aliquando, à principio autem appetitus offendit &
concoctionis, si ergo defluxus frigidus sit, sero con-
coquitur ac etiam non concoquitur, acutosq; efficit
appetitus, qui si corrumpatur in corruptionem pul-
menta perducit, uel pruritus ructusq; remittit, uel
sonoros uel acidos uel alterius alicuius qualitatis
cuiusuis. Ecligma ad distillationem: Mellis uncia. 2.
butyri recentis uncia, coquendo, ac diuidendo in
duas partes, lingendum dato in quibus educatione
opus est.

Ex traditione Pænorum & Arabum.



Et tarrhus aut fit cum febre, aut absq; fe-
bre. Et cura eius est qui cum febre, phle-
botomia, deinde sumere in potu aquam

H 2

hordei

hordei cum uiol. conditus & oleo amygdalarum.
Et cura eius qui est sine febre, est cum decoctione
hyssopi minoris, & caueat ab eis quæ sunt salita &
pontica & salsa. Coryza autem fit ex frigidityte
adueniente capiti, & cura eius est ut uaporetur cū
milio calefacto, aut panno calefacto, & introitus
balnei in quo non madesiat caput suum cum aqua,
& proiciat super corpus suum & pedes aquam ca-
lidam plurimum, & ungat pedes suos cum sambu-
co, & dimissio uini, & abscissio cursus ex naso per
suffumigationem cum chartis de panno, aut cum
panno, aut cum thure, aut cum xylo aloës. Et
fit ex calefactione adueniente capiti ex sole, aut aë-
re austrino, & signa eius sunt pruritus, & mordica-
tio, & rubedo in oculis. Et cura eius est balnea-
tio in aqua tepida munda dulci, & suctio olei uiolæ
cum naribus & olfactus camphoræ, & aqua rosa-
rum, & abscissio cursus qui fit ex naso cum sulphu-
re infuso in aceto ex quo fiat suffumigatio, & suffu-
migetur cum camphora supra uitreatum, & attra-
hat humorositatem uenientem ad nares, ut non de-
scendat ad pectus aut ad pulmonem aut guttur cū
emunctione, quia in hoc est expulsio nocuenti ca-
tarrhi ab istis membris, & uaporet caput cū aqua
calida, & attrahat per nares uaporem eius, & mul-
tiplicet

triplicet emunctionem & non dormiat super ceruicem, & dimittat uti longo somno. Haliabbas: Est autem catarrhus superfluitatum humidarum fluxus & descensus à cerebro ad nares & gurgulionem, meri & guttur canalemq; pulmonis. Et si superfluitas hæc ad nares descēderit Coryza uocatur, quod si ad guttur & pulmonis canalem, operimentumq; illa inuoluens aspirauerit, raucedo fiet et tuſſis leuis. Quod si ad pectus et pulmonem, pessima fit ab inde tuſſis. Catarrhi autem ex calore fiunt quemadmodum æstate capiti accidit ex solis ardore, aut frigore quemadmodum fit in hyeme ex aëris frigore.

Secundum doctrinam autorum recentium.

Contra reumatis et catarrhi dispositionē ualet regimen in sex rerum non naturalium administratione, ut in fluxu subtili ad pectus sit qualitate ingrossatium et infrigidatium, sed remissius infrigidatium quàm ingrossatium. Digestuum. Recip. Syrupi de stœchados, oximellis compositi ana. ʒ. ʒ. misce, sed dosis sit ʒ. 2. cum decoctione cubebarum, nucis muscatæ, anisi

H 3 masti-

mastiches, et cyperi. Solutiuum: Recip. Pil. cochiarū
 3. 1. Tragea confortatiua: Recip. Trium piperum
 3. 1. zingib. 3. 2. gariophilorum, galange, stœcha
 dos ana 3. 1. cubebarū, nucis muscatae ana 3 s. anisi
 3. 3. coriandri 3. 2. sachari quod sufficit, sit dosis in
 ieiunio unum coclear usq; ad dies quatuor, postea
 uero potet modicū uini subtilis. Ceraū. Recip. La
 dani 3. 1. aloës 3. s. pulueris pulegij, calamēti, stœ
 chados ana. 3. 1. macis, corticis citri ana 3. s. incor
 porentur omnia simul addito modico aceti, & ap
 plicetur parti capitis abraſe. Vnguentum pro sto
 macho in casu isto: Recip. Masti. bes 3. 1. aloës 3. s.
 cinamomi, gariophilorum ana 3. 1. ligni aloës, folij
 ana. 3. s. olei nardini, ceræ quod sufficit pro unguē
 to, ex isto actu calido ungatur stomachus ieiunus. Si
 sit catarrhus subtilis & aquosus diuertatur & fri
 centur suauiter, & tempore paruo, stomacho ieiu
 no, habito uentris beneficio, cum panno lineo, bra
 chia à cubito infra, & tibie à genu infra. Balneen
 tur eadē partes ut infra: Recip. Viol. M. 2. hordei
 exorticati 3. 1. milij 3. 4. rosarum. M. 1. s. foliorū
 uitis M. 2. foliorū cardamomi. M. 1. s. misce & bul
 liant & fiat lotio. Valent uentosa sicca & oppo
 nantur modis & ordinibus quibus supra, sit lotio.
 Attrahantur calida per nares ad libitum stoma
 cho

cho ieiuno. Attractiuum per nares: Recip. Succu cau-
liū 3. 2. succi anagallid. 3. 1. succi chelidoniae 3. s.
myrrhæ 3. 2. sarcocollæ 3. 1. aquarum hordei, uol.
maioranae ana. 3. 1. misce. Aquam teneat in ore ad
libitum. Aliud prohibens fluxum: Recip. Boliar. ter-
ræ sigillatæ ana. 3. 1. myrtill. papaueris alb. ana. 3.
s. amidi 3. 1. olibani 3. 1. spicæ 3. 2. misce, & cū sy-
rupo de myrto quod sufficit formentur pilulæ ad
quantitatem auellanae, teneat in ore inter genā &
maxillam, & proprie in nocte. Contra branchum:
Colluat sibi os stomacho ieiuno & mane cum uino
saluiato, & hoc semel in hebdomada, & non cali-
do tempore, & sit ex uino nigro mediæ uinositatis
secundum hunc modum factum: Recip. Saluie M. 1.
stœchados. M. s. mellis electi 3. 2. pulueris nucis mu-
scatæ 3. 1. uini nigri mediocriter uinosi lib. 3. saluia
& stœchados minutim incisa bulliant in uino usq;
ad consumptionem quartæ partis, & in
fine addantur pulueres, misce
& usui serua.

H 4 De

De λήχηρ seu mentagra siue pudenda
gra, quam nostri Neapolitanum mor-
bum uocant, Itali uero Gallicum.

Cap. XII.

Secundum Græcos & Latinos.



Λήχηρ Græcè dicitur, quæ Latine menta-
gra dicitur, ut habet Plinius lib. 26. ca-
pite 1. uerba eius sunt: Sensit et facies ho-
minum nouos, omniumq; æuo priore incognitos nō
Italie modo, uerum etiam uniuersæ propè Europæ
morbos. Grauißimum ex his λήχην Græco nomi-
ne, Latine quoniam à mento serè oriebatur, iocula-
ri primum lasciuiæ, ut est procax natura multorum
in alienis miserijs, mox et usurpato uocabulo Men-
tagram. Tu ne dicas lichena uti alij faciunt, quod
item malum lichenas dicunt. Celsus papulas nomi-
nat. Galenus in libro qui diffinitiones medicinales
inscribitur, lichen ita diffinit. Lichen est asperitas
cutis cum magno pruritu. Hunc morbum nonnulli
ita describunt: Morbus Neapolitanus seu lichē, est
pustulæ ex uaria humorum corruptione generatæ
propter nimiam aëris in calore atq; humiditate præ-
sertim intemperiem, pudenda primum, deinde reli-
quum corpus cum magno plerunq; dolore occupan-
tes. Est enim morbi genus grauißimū, occupat ple-
runq;

runq; totos uultus, oculis duntaxat exceptis, & in
colla pectusq; ac manus foedo uitis fursure descen-
dit. Tyberij primum Caesaris principatu hic mor-
bus in Italiã irrepsit, contagione eius per quendam
Persinũ equitem Romanũ questorium scribã ex A-
sia importata. Nec foeminae uel serui, aut ex infima
plebe homines id malum sensere, sed procures oscu-
landi maximẽ consuetudine. Adueneruntq; ex Ae-
gypto homini morborũ patente medici hanc solam
curam profitentes ingenti suo lucro. Constat sane
Manilium cornutum legatum Aquitaniæ sestertia
ducenta ad eius morbi curam expendisse. Aliqui
hunc morbum Milium uocitant. Et nos dicimus in-
ter epidimias, hoc est morbos populatim uagantes,
debere connumerari. Hec uero aut diuina ira, ut
theologi sentiũt, aut ui astrorũ, ut astrologi opinan-
tur, uel ex certa aëris intemperie, quẽadmodũ medici
arbitrãtur, eueniũt. Hos medicos hac parte sequen-
tes, causas naturæ proximiores nonnulli assignant.
Illud satis cõstat, eo anno quo Mētagra cœpit pul-
lulare, magnã aquarũ per uniuersam ferẽ Europã
fuisse exuberantiam. Testis est italia, quæ prima id
malum sensit, in qua Tybris ita intumuit, ut tota sit
facta Roma nauigabilis. Quam rem Pōtinius Le-
tus nostri temporis poëta celeberrimus eleganti te-

H 5

trastu

trasticho, publica columna impresso designauit:
Tempore Alexandri sexti, nonisquē decem-
bris.

Intumuit Tybris bis senas circiter ulnas.

Insula quæq; domus facta est medijsq; repente

Circunducta uijs æquabat cymba fenestras.

Deucalioneo uix tantum tempore tellus.

Diluuium passa est, latuit cum tota sub undis.

Non aliter enim quàm in Romano Tybris, in agro Mantuano & Ferrariensi Padus, in Colonien-
si Rhenus, in Venetia Athesis. In Gallia Lugdunensi
Rhodanus, Arar et Iuris. In Gallia Aquitanica Garu-
na, Gironna et Dordonna. In Gallia belgica Mosæ,
Mosella. In Parisiensi agro Sequana, et in Hispania
Iherus, Bethis, Mineus & Tagus, extra solitos li-
mites exundarunt. Tactis deniq; imbribus annus il-
le ubiq; maduit, ut terris exinde humentibus atque
stagnantibus minus mirandum sit æstiuum aërem
ad illam uenisse intemperiem, calidam scilicet &
humidam, quam philosophi atq; medici omnium pu-
tredinum matrem esse confitentur. Similem uel pe-
iorem aliquando fuisse, ea scilicet tēpestate qua Go-
thi Italiam bellis infestabant, ex qua ingens orta
est pestilentia. Quidam medici decepti similitudi-
ne,

ne, elephantiasim esse putauerunt. Alij autem impetiginem seu uolaticam dicunt. Alij esse speciem lepræ affirmarūt. Reliqui Sabaphati speciem esse maluerunt, Alij bothor, alij achores, alij t hani, alij psidracia & exanthemata esse opinati sunt. Nos autē, si aliquando fuerit morbus iste, lichen seu menta gran aut pudenda gran appellare maluimus. Penis enim cutis qua integitur non simplex est, sed neruosæ naturæ, sensumq; tactus plurimum possidet. Ob eam causam uenereo contractu nouus, uel saltē medicis ignotus prioribus syderum pestifero, aspectu, morbus Neapolitanus seu lichē ad nos ex Oriēte irrepsit, tanta omnium membrorum sceditate, cruciatibusq; nocte presertim, ut lepram alioquin insanabilem siue elephantiasim horrore superet, non sine uitæ perniciē. Hæc pestis reliquas prouincias iam infestauit, quæ etiam præsanatis facile repullulat, magna omnium medicorum ambage. Ex Occidēte uenere empirici qui magno questu urbes circumicrunt, id tantum profitentes.

Iuxta

Iuxta mentem Penorum Arabum.

SCias quod causa impetiginis, quæ acci-
dit in forma faciei, & tota superficie cor-
poris extrinseca, est uirtus naturæ quan-
do expellit superfluitates malas, & remouet eas à
membris principalibus ad exteriora. Et causa fa-
ciens materiam est humores acuti subtiles, quæ per
miscēt humores terrenos grossos. Et propter illud
declinat hæc ægrotudo ad duo latera similiter, quo-
niam acuitas humorum, & eorum subtilitas ponit,
materiam acutam uelocis excitationis. Et grossitu-
do humorum terrenorum, & tarditas eorum con-
trariæ sunt ei quod dicimus, & ponūt ægrotudinem
difficilis motus & tardæ sanationis. Si ergo uincen-
tes in hac ægrotudine sunt humores acuti, tunc ipsa
moratur tempore paruo, & resoluitur uelociter,
quod si in ea uincunt humores terrestres, tunc spa-
cium eius est longum & cum labore resoluitur. Si
autem humores omnes in ea sunt æquales, tunc æ-
grotudo est media, in mora sua & curatione. Ra-
sis: impetigo est res similis sahaphati siccæ, cui con-
fert assiduatio inunctionis, & ut fricetur uehemen-
ter, deinde liniatur cum oleo & omnibus lenifican-
tibus, & confert etiam ut fricetur cum acetositate
cilri, & liniatur cum acatia & aceto et armoniaco,

¶

Et confert ei oleum de tritico, et olcum de corticibus nucum uiridium. Cum autem antiquatur, et sit sahaphati, indiget sanguisugis et fricatione et omni cura sahaphati antiquæ. Cōstantinus: Impetigo duobus modis fit, uel enim est æqualis in superficie corporis, et fit de cholera nigra et fece sanguinis, aliquando cum prurigine uel superficietenus combusta, cuius color est citrinus, uel rubori continuus, aut contiguus, et est surfurea fissa et pruriginosa, nascens de materia melancholica, uel cholerica nimis incensa.

Ex traditione autorum recentium.

Impetigo est quæ uulgo uelatica dicitur, secundum alios fœdatio cutis serpēs cum pruritu: secundum alios sicca et aspera scabies, et prominens. Alij definiunt morbum similem scabiei squamosum corpusq; dehonestantem. Cassius uero fœlix, ut allegat Simon Ianuēsis, ita dicit: impetiginem Græci lichenas dicunt, Latini zernas. Nascuntur ex melancholico humore, rotundo schemate in superficie cutis cum ingenti pruritu, dicit et Serpiginē dici, cum serperæ coeperit, et dicitur impetigo ab impetu, unde Samonicus. Si uero uerum est quod ducit ab impetu nomen, hoc matutina

na

na poteris cohibere salua. Impetiginis autem quatuor species ponit Celsus, quas, qui uolet, apud Cornelium legat. Aliqui morbum Neapolitanum elephantiam dicunt esse non impetiginem. Plinius loquens de elleboro ait: Medetur, inquit, elephantiae albae & lepris. Præterea de elephantia si dixit libro 26. capite 1. Hunc morbum usque ad tempora magni Pompei nunquam fuisse in Italia, deinde breui restinctum fuisse. De elephantia si loquitur Lucretius lib. 6. sub his uersibus. Est elephas morbus qui propter flumina Nili nascitur Aegypto in media, neque præterit unquam. Mesue autem tractatu de medicinis solitis cap. de confectione Hamec, inquit: Confert ægritudinib. cutis sicut est scabies, morphaea, lepra, cancer, elephantia & impetigo. Qui autem hunc morbum elephantiasim esse affirmant, ita diffiniunt. Elephantiasis est passio crassa & pustulosa dispargibilis præcipue secundum corpus, extrema colorem habens secundum oculorum albedinem emittens aliquantulum superfluitatem liuidam, & male olentem ex phlegmate grosso, aut ex nigra cholera proueniens, distatq; ad similitudinem elephantis. Causa igitur elephantiasis coniuncta, ut in hac diffinitione dicitur, est cholera nigra, aut phlegma grossum actu tale

lem ægritudinem facientia, esto quod multotiens. Gal. nominet melancholicum sanguinem. Vbi est aduertendum quod merito huiusmodi causæ coniunctæ ex intentione Galeni uenari possumus elephantiasis differentiam. Nam si ex ipso phlegmate proueniat, elephantiasis alba generatur. Et propterea apud autores multotiens inuenitur elleborum mederi elephantiasi albæ. Vbi uerò à nigra cholera admixta sanguini eueniat subrubæ elephantiasis species, accipientur ut de cholera nigra. Galenus: Inquit enim, quando niger humor qualitatibus sobrius fuerit, sanguini commixtus, subrubeam elephantiasim operatur. Itidem dicamus si à nigra cholera proueniat, tunc sub nigram ægritudinem operatur. Istarum autem ægritudinum & specierum prima est minus maligna, licet crassiores & pinguiore efficiat pustulas, quæ tunc temporis plurimum inuadit. Reliquæ uero maligniores existunt. Sed apud Paulum elephas ex melancholico & feculentiori & quasi luto sanguinis, aut flaua cholera, aut bile utrisque ultra modum adustis fit, nec mentionem facit de phlegmate, quo fit ut diuersimode accipiant elephantiasim. Dicamus nunc transeunter curam huius morbi siue fuerit lichen, siue impetigo, aut elephantiasis.

Quam

Quantum ad dietam cibi & potus, & debitam ad
ministrationem omnium quæ sub rebus non natura-
libus continentur. Regantur & dietentur quemad-
modum in scabie impetigine, cancro, lepra, & mor-
bis melancholicis ab autoribus ample scribitur. Ta-
men unum moneo, ut tales hac ægritudine labo-
rantes utantur tenui dieta, & quanto commodius
fieri potest, tanto subtilietur magis, inspectis sem-
per ætate maximè & uirtute ac consuetudine.

Quantum autem ad medicinalia. Quæcunque di-
gerunt phlegma grossum aut nigram choleram
sunt conuenientia, & talia sunt buglossa, borago,
fumus terræ, asparagus, lupulus, pimpinella, scolo-
pendria, lauendula, & huiusmodi. Omnium isto-
rum aut aliquorum fiat decoctio cum iniectione sa-
chari & accipiantur per octo dies ʒ. 4. aut 5. ma-
ne. Aliqui cum prædictis faciunt bullire myrobala-
num chebulum, aut indum, aut immittunt follicu-
los senæ. Digestium usuale: Recip. Syrupi de fumo
terræ, mellis rosati colati ana. ʒ. 1. aquarū endiuie,
lupulorū, & buglossæ ana. ʒ. 1. misce, fiat syrupus,
aromatizetur cum puluere diacaparidis ʒ. 2. detur
ut supra. Solutium: Recip. Hermodactylorum, my-
robal. chebulorum, indorum ana. ʒ. 1. florū buglos-
sæ & boraginis ana. M. s. bulliant in octo uncijs
aquæ

aquæ scolopendriæ, aut lupulorum, & fuerit pa-
rum febricis endiuie, & facta decenti decoctione,
Recip. Agarici albi & electi 3. 1. salis gemmæ 3.
s. & infundantur condecenti tempore in 3. 2. præ-
dictæ decoctionis, et fiat expressio cui addatur dia-
catholiconis 3. s. diaphœnicon. 3. 2. mellis rosati
colati unc. 1. & misceantur simul cum prædicta de-
coctione. Poterimus uti electuario Hamæ, & alijs
quibuscunq; phlegmatis grossi, aut nigre cholere
eductiuis. Aduertendum tamen est quod euacuatio-
nem eradicatiuam debet phlebotomia præcedere
uirtute & ætate consentientibus. Pilulæ Galeni
quas mirabiles appellat: Recip. Zingiberis, myro-
balanorum Indorum, chebulorum, corticum cucu-
meris asinini, uel loco eius elactery interioris, colo-
chintidis, salis Indi, hermodactylorū, hieræ picræ,
satyrionis ana partes æquales, serapini ad duplum
unius prædictorum & non omnium, pistentur pi-
stada subtiliter & fiat massa pro pilulis cum aqua
endiuiæ, & fiant pilulæ 7. pro 3. da aliquando du-
as, aliquando unam, aliquando tres, quarum usus
sit de tertio in tertium secundum uirtutem patien-
tis. Chamomila, oleum anethinum, ibiscus, ualent
contra dolorem membrorum in isto morbo. Cassia
fistula multum ualet in mitigando dolores exterius
I applicata.

applicata. Vnguentum: Recip. Saponis albi & minuti, & in parua folia redacti unc. 3. multotiens loti in succo endiuiae & plantaginis, deinde bulliat in succo lapatij acuti usq; ad lenem spissitudinē, præterea Recip. Mastiches, thuris ana 3. 3. armoniaci, sulphuris uiui, nitri ana 3. 1. cum cera, & parum olei chamomilæ fiat unguentū. Modus autem administrationis est, ut una die utantur hac unctione, alia die lauentur cum aqua in qua decocta fuerit malua, & excorticatum hordeum, aut farina lupinorum. Sunt tamen multi qui uolentes citius euadere in hac ægitudine, utuntur infra scripta unctione per quinque dies cooperientes se in lecto quo ad plurimum sudant, utentes tamen bona diætā. Recip. Resinæ pini, thuris, mastiches, tartari albi, lithargyri auri, argenti uiui, olei laurini, olei uulpi ni, olei abietis, cuscute, succi pomorum arantiorum ana unc. 2. axungiae porcinae colatae unc. 6. redigantur omnia simul miscendo in formam unguenti. Ab hac tamen unctione caueant qui sunt debilis complexionis, & potius sophistica inueniatur quàm uera, nam uidi plures recidiuasse ut prius.

De oculo

De oculorum morbis curationibusque
eorum. Cap. XIII.*Ex traditione Græcorum et Latinorum.*

Oculus, ut in metaphysica inquit Aristoteles, ad rerum scientiam plurimum confert. Nam longe plures, quam ceteri sensus, rerum differentias nobis ostendit. Democritus tamen, ut altius contemplaretur, sibi oculos eruit, et sciendi desiderio maluit Tiresias esse quam Strabo. Sic enim teste Varrone, nuncupatus est quidam qui centum trigintaquinque millia passuum peruidebat, et ex Lilybæo Siciliæ promontorio numerum nauium exeuntem ex Carthaginis portu classe deprehendebat. Oculi certe, sicut plurimum profunt corpori et scientiæ, ita plurimum nocent scientiæ. Propterea dicitur in Psal. Auerte oculos meos, ne uideant uanitatem. Et Propheta dicit: Mortem per fenestras, id est, peccata per sensus ascendere. Oculi, ut ad uitia transeamus, ex omnibus animalibus soli homini diuerso colore uisuntur, ceteris in suo cuique genere, præterquam in equis, similes, sicut et uni deprauantur, unde Strabonum et pecorum cognomina. Hæc enim uitia nutricum indiligentia sæpe contrahuntur.

I 2

Mediocrates


Mediocrates oculi, optimi ab omnibus habetur. Crassiss tenuibusq; membranis constat oculus, callosæ enim firmæq; materiæ propter frigora caloresq; constituuntur. In his humida salina perpetua est, quoniam lubrici, ac mobiles propter occurstantia esse debent, & lachrymarum inde copia iugiter emanat, uel ui uel spontè, frigore uel impetu. Circa pupillam nigram uariat, ob id iris à quibusdam uocatur, quæ atrii coloris cernitur, uel nigri, glauci, cerulei cæsiq; nonnullis rufi, fului, caprini, qui optimos mores indicant, & clarius cernere existimant. Et modicus quoque situs optimorum morum indicium est, sicut quibus mediocriter conuiuent, qui uero rigidi sunt impudentiam notant, qui nimium conuiuent inconstantiam significant. At ex morbis, ut in attonitis, rigent. In oculis animus ipse inhabitare creditur, ob id osculantur, ita animum ipsum attingere existimantes. Oculorum alij nisi ex longinquo contuentur, alij nisi propè admota cernunt, hi lusciosi siue noctilopæ dicuntur. Quidam noctu expergefacti paulisper aliquid contuentur cati more, mox paulatim tenebris se adducentibus nihil cernunt, multis à somno protinus aperti oculi scintillare uidentur. Oculorum cura uaria ferè est, & multiplex. Quandoquidem membrum etiam ipsum,

ipsum, oculus inquam, non simplex est, sed uarie
 compositus, tunicis & humoribus, prætereaq; cilijs
 ornatus. Natura nanque à cerebro delatos nervos
 in oculorum regionem ὀπτικὸς græca uoce nun-
 cupatos, quod se uisui suggerât, atque pariter cum
 ipsis transmittendo partem cerebrum ambientium
 duarum tunicularum, quæ μὲν γὰρ uocitantur,
 augendo, ac ueluti dilatando ipsis in oculo tunicæ
 lis esse largita est. Intima autem tunica, quæ uocant
 Græci ἀμφιβλυστοειδὲς ex optico nervo à na-
 tura producta est. Ab ea porro porrecta tunica
 γλαυστοειδὲς nuncupata, à tenui meringe exorta,
 quæ ad pupillam circuli insignita foramine est. Ha-
 rum autem ambarum, quæ exterior tunica κερ-
 τοειδὲς appellata ex crassa meringe ortum du-
 cit. Omnium extima alba est, quæ forinsecus ossi ca-
 pitis obuoluta, ortum habet ex adiacentibus oculo
 corporibus. Humida in oculo sunt tria, in loco inti-
 mo comprehensum cauitate amphiblistroides tu-
 nicæ, quod ὕδατος à Græcis nominatur. Vitro
 nanq; tum substantia, tum colore consimile est. For-
 ris autem in fine amphiblistroidis tunicæ κρυ-
 σταλλοειδὲς humidum est, quod δ'ὕδατος, & φάκος
 uocitatur, simile quidem colore cry-
 stallo est. Figura uero lenti extra circumfunditur
 ἰ 3 ὠοειδὲς

ὠσίδες humidum, quod tam colore, quam substan-
 tia simile sit tenui albugini, quod in ouis est. Quod
 igitur omnium intimum est, ὑαλσίδες humidum
 ad alendum crystalloides comparatum est. Forin-
 secus autem circumfusum ὠσίδες ad id intingen-
 dum productum est, & ne permittat oculum à lu-
 ce solis obladi. Cilia uero confederunt in tunica,
 quæ epipephycos appellata. Horum singula mor-
 bum ab oculo arcant. Multa autem multorumq;
 autorū collyria ad id apta sunt, nouisq; etiam nūc
 mixturis tēperari possunt, cum lenia medicamenta
 & modice reprimētia facile et uariē misceantur.
 Est igitur Philonis collyrium quod habet cerusæ
 elotæ, spodij, gummi, papaueris lachrymæ com-
 bustæ singulorum 3. 1. illud scire oportet hic quo-
 que omnia medicamenta singula per se teri, dein-
 de mixta iterū adiecta paulatim, uel aqua uel alio
 humore. Cleonis nobile admodum collyrium: Pa-
 paueris lachrymæ frictæ, croci, gummi, singulorū
 3. 1. 5. quibus cōteruntur, adiicitur rosarū succus.
 Aliud eiusdem ualentius: Squamæ æris, quod scomo-
 nia appellant 3. 2. croci 3. 1. spodij 3. 4. plumbi
 cloti & combusti drach. 1. gummi tantundem.
 Aliud quoq; ad idem est, maximè ubi multa pituita
 profluit: Castorij 3. 2. croci 3. 2. s. alacis 3. 2. myr-
 rhe

rhæ 3. 2. lycij 3. 1. cadmiæ curatæ 3. 4. stibis tantundem, acatiæ succi 3. 1. s. quod miscuit, liquidum in pixidicula seruatur. Theodotus uero huic compositioni adiecit: Papaueris lachrymæ combustæ 3. 2. æris combusti & eloti 3. 1. nucleos palmarum combustos 3. 4. gummi 3. 1. s. Nilei collyrium omnium optimum id habet: Nardi Indici, papaueris lachrymæ singulorum 3. 1. gummi 3. 4. croci 3. 1. s. foliorum ros. recentium 3. 2. Quæ uel aqua pluuiali, uel uino leni sub austero coquuntur. Phyletos collyrium ad pustulas oculorum, id habet: Myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum 3. 1. plumbi eloti, terræ samiæ, quæ escera uocatur, tragachatæ singulorum 3. 4. stibis costi, amyli, singulorum 3. 1. s. spodij eloti, cerusæ elotæ, singulorum 3. 1. & 3. 2. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vsus collyrij, uel ex ouo, uel ex lacte est.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.

 Φθαλμία est calidū apostema nascens super pelliculas abuginis oculorum, cuius causa interior est uel exterior. Exterior uero est maior uel minor, & causa enim eius est fumus, calor solis, siue puluis. Interior est ex humoribus ad coniunctiuam tunicam confluentibus, unde oculi patiuntur apostema, sicut & cætera cor

I 4 poris

poris membra. Causa est defectio recipientium membrorum, id est, oculorum, & abundantia humorum à capite manantium. Panni in oculis & albugines fiunt ex uulneribus uel pustulis, quorum utrumque est curabile. Fiunt autem ex humoribus inter uenam & crystallinum se locantibus & coagulantibus, qui si sint subtiles, succus papaueris russi sufficit ad medicandum. Crustula est sanguis qui ad coniunctiuam à suis descendit arterijs cum ipsa creperint. Fit autem duobus modis, scilicet, ex oculi percussione & fissura coniunctivæ, uel ex apostemate in coniunctiva & non ex sui fissura. Lachrymæ causam exteriorē non habentes ex humoribus à capite descendentibus ad oculos esse intelliguntur. Hi humores per uenas cranei descendentes subteriores, siue superiores, qui cum sint super corneam, infirmus patitur tetenositatem in frontis uenis & temporum. Si ex uenis sint subterioribus, fiunt lachrymæ cū sternutationibus. Si uero uideatur quod sint ex uenis cranei superioribus, uenæ in temporibus uel post auriculas incidantur, & super frontē desiccantium cataplasma apponamus. Sūt quidam à uespere in antea non uidētes, quibus uena cephalica est incidenda & danda hierapicra, & leni cibo nutriendi sunt, abstineāt à cœna in nocte. Huius passionis

passionis causa est motus humoris multum grossi,
unde spiritus ingrossantur, & uisus obscuratur.
Hec saepe accidit in eis qui habent oculos debiles
nigros & paruos, & spiritum uisibilem debilem,
accidit etiam ex ægritudine diuturna. Rasis: De
bilis uisus fit ex humiditate, & signa eius sunt
quod additur post comestionem et somnum, & sa
tietatem nauseatiuam proprie, & fit ex siccitate,
& signa eius sunt quod fit fortis cum fames adest,
& in meridie, & alleuiatur somni hora & come
stionis. Et fit ex stomachi lesione absq; ægritudine
in oculo, & signa eius sunt quod non est semper,
imò fit fortis cum est satietas nauseatiua, & destru
itur omnino in tempore famis. Fistula in lachry
mali fit ex humiditate currēte ex lachrymali. Sera
pio: Scias quod ungula est additio nernalis in tuni
ca coniunctiua incipiens à lachrymali maiori. Et
dilatatur usq; ad nigredinem oculi. Et quando ma
gnificatur ualde cooperit pupillam & prohibet ui
sum, quod si ungula induratur & magnificatur &
præterijt ei tempus longum, tunc eius curatio est
cum medicinis acutis quæ abstergunt sicut æs adue
stum, & sal armoniacus, & calchadis, & radix li
lij. Auicenna: Imaginationes sunt colores qui senti
untur corā uisu ac si ipsi sint mixti in aëre. Et cau

I 5 sa in

sa in eis est statio rei non peruiæ inter glaciale & inter ea quæ uidentur. Cum autem uides imaginati ones remoueri & redire, & addi, & minui, scias quod non sunt aquosæ. Et quâdo cōtinuatur sanitas oculi eius qui habet imaginationes, sex mēsis est secundum plurimū in securitate. Et confert in principio aquæ phlebotomia arteriarum post aurem. Et hierapicra est mirabilis iuuamenti, & similiter pilulæ aureæ.

Quid de his sentiant Neoterici.



Ὀθαλμία uera, est apostema calidū cō iunctiue, & hæc ut plurimum sit à mate ria sanguinea uel cholerica. Si ex multi tudine sanguinis, signa eius sunt, uehementia rube dinis oculorum, & magnitudo inflammationis, & multitudo tentionis. Et cura eius, est phlebotomia cephalicæ ex manu opposita oculo infirmi, & col lyrium album Rasis, & distillatio in eo cum lacte, & si fuerit multitudo lippitudinis, tunc puluis al bus Rasis. Si sit ex cholera, signa sunt apostema, in flatio, tentio, & lippitudo, et cursus lachrymarum minor, & adustio in oculis, & punctura sicut pun ctio acus & spinæ. Et cura eius est, solutio uentris cum aqua fructuum, & cum decoctione myrobala norum, & assiduatione emulsionis lactis in eo, & effusio-

effusionis eius in eū, & distilletur in eo muscilago
 psyllij, & muscilago sem. citoniorū, & collyrium
 cāphoratum & opiatum, & si dolor sit fortis, &
 cōprimantur pedes eius, et fricētur & ligētur ma-
 nus eius & pedes cū ligatura forti. In ὀφθαλμια
 fiat iste syrupus: Recip. Radicū fœniculi, petrosel.
 ana unc. i. euphragiæ, maioranæ, betonicæ, chelido-
 niæ ana M. i. sem. anisi, fœniculi, cinnamomi ana
 3. s. sacchari lb. i. fiat syrupus, dosis 3. i. s. cū aqua
 decoctionis maioranæ. Sumpto syrupo purgetur cū
 pilul. cochijs Almanforis, & cum pilul. aureis Nico-
 lai ana 3. i. s. postea sumat semel in septimana 3.
 i. aut 2. pilul. lucis maioris secundū Mesue. Fiat hic
 puluis quo utatur in cibis suis: Recip. Euphragiæ
 3. i. zingib. cinnamomi, sem. anisi, sileris montani,
 maioranæ siccæ ana unc. s. gariophyl. cardamomi
 ana 3. i. fiat puluis, lauet frequēter oculos cū aqua
 decoctionis fœniculi. Fiat caputpurgiū cum succo
 bliti & succo maioranæ dissoluto in uino. In prin-
 cipio opthalmiæ frigide placet mihi medicamen-
 Galeni, quod sic fit: Recip. Sarcocollæ 3. 10. sem. li-
 ni 3. i. aloës 3. 2. spumæ maris, croci ana 3. s. succi
 chelidoniæ 3. 3. terantur omnia ut alchool, uel bul-
 liant in uino cum aqua rosarū, & coletur, & pona-
 tur intus in oculū & grossa substātia super oculū.

Contra

Contra uisus debilitatem ex pano: Recip. Pilularum lucis minoris Mesue ꝯ. 2. agarici ꝯ. 1. salis gemmæ, zingiberis ana granum 1. misce cum syrupo de stœchados, & succi fœniculi ana, reformentur pilulæ 7. istæ pilulæ dentur secundum canones. Confortatiuum uisus & oculos clarificās: Recip. Succorum chelidoniæ ꝯ. s. rutæ ꝯ. 3. fœniculi, rosarum, uerbenæ ana ꝯ. s. sacchari candi, puluerizati ꝯ. 2. misce. De istis succis pone in oculis actu frigidis duas uel tres guttas tempore calido, uel recenti tempore calido tepidis stomacho ieiuno per horam ante cibum. Mollificatiuum & panum delens in oculo: Recip. Sanguinis columbæ extracti à uena quæ est sub ala sinistra per phleboto-
miam, de isto sanguine æger imponi faciat in oculum octo diebus continuis quater in die, post dies octo transeat ad infra scripta: Recip. Succorum fœniculi ꝯ. s. uerbenæ, chelidoniæ, rutæ ana ꝯ. 1. rosarum ꝯ. 1. s. antimonij ꝯ. s. corallorum rub. ꝯ. 1. croci granū 1. sacchari candi, puluerizanda puluerizentur, & fiat collyrium, utatur tepido non frigido nec calido, semet in die duas aut tres guttas imponendo. Panum ipsum delens fortius prioris: Recip. Succorum absinthij ꝯ. s. fœniculi ꝯ. 1. radicis acori puluerizatæ ꝯ. s. basiliconis ꝯ. s. antimonij ꝯ.

nij 3. 1. aloës, succocitrini 3. s. mellis electi 3. 1.
puluerizentur puluerizāda, deinde omnia simul mi
sce ut supra. Contra catharactam non confirma
tam digestiuum: Recip. Syrupi de stœchados 3.
1. oximellis, scyllitici 3. s. aquarum fœniculi 3. 2.
euphragiæ 3. 1. misce, & assumat sicut sumuntur
digestiua. Solutiuum eradicatiuum: Recip. Pila
la de hiera simplici, pilul. cochiarum, agarici ele
cti ana 3. 1. zingiberis grana 2. agaricus incisus
infundatur in oximelle scyllitico quod sufficit, &
fiant pilulae 7. & assumat modo eradicatiuum.
Collyrium ad dilatationem uuæ ex percussioe: Re
cip. Tutia, croci, myrrhæ ana 3. 1. cōficiantur cum
succo fœniculi, rutæ, et maioranæ, fac collyrium.
Ad pustulam oculi cum sanie: Recip. Vini albi 3.
2. gariophilorum 3. 2. aloës 3. s. mellis 3. s. stent
in infusione ad solem per duos dies. Postea coletur
subtilissimè & mittatur in oculum mane & sero.
Ad sebel: Recip. Tutia, lapidis hemathitis ana 3.
1. ponatur in panno subtili, & postea ponantur
in pane crudo, uidelicet in medio panis, & postea
in furno, & postea extrahatur, et ponatur in aqua
rosarum & coletur, & iterum ponatur in aqua ro
sarū et exiccetur, & addatur sacchari albi 3. 2. fiat
puluis. Ad ungulam secundum Rasim, secūdo cōti
nensis

nentis ualde bonum: Recip. Thuris minuti optime triti unc. s. aspergatur super aqua calida, & dimitatur sic p horas 2. postea collyrizetur et ponatur in oculū. Valet etiam cinnamomū & cymīnū ad ungulam, ut ponit Auicenna, secundo canone: Ad imaginatiōes ualet fumus croci bulliti in uino et aqua, recipiendo illud ad oculos: Cōfectio lachrymas cōstringens, phlegma destruens, cerebrum calefacit, dolorem & hemicraneā expellit, oculos aperit, supercilia releuat, clarificat mirabiliter lumen, & adiuuat illos qui non expedite loquūtur: Recip. Olibani, castorij, nucis moschatæ, gariophylorum, cardamomi, croci, foliorū lauri, spicēnardi, sem. anethi, sem. apij, sem. basiliconis, carui Alexandrini, et fœniculi ana unc. 1. nepitæ, pulegij, seminis rutæ, hyssopi ana 3. 2. seminis hyoscyami, papaueris albi, camphoræ ana 3. 1. s. Hæc omnia terantur subtiliter, & cribellentur præter olibanū quod debet bullire in bono melle despumato, & liquefacto olibano cum melle remoueat ab igne, & projiciatur in alio uase, & species prædictas similiter projicias, & ducas usquequo cum melle bene incorporentur, & in uase uitreo reseruetur. Puluis pro recuperatione uisus: Recip. Nucis moschatæ, ligni aloës, sileris montani, mastiches, euphragie, carui, croci, anisi,

ci, anisi, fœniculi ana 3. 3. fiat puluis, & sumatur
in cibis. Puluis quem ordinauit gentilis ad debilita-
tem uisus, et est mirabilis iuuamēti. Recip. Euphra-
giæ, betonicæ, sem. anisi, cinnamomi, fœniculi, zin-
giberis, cardamomi, sem. petroselini, sileris mōta-
ni, origani, cubebarū ana 3. 2. gariophil. 3. 1. fiat
puluis quo utatur patiens in cibis & extra cibū.

De ægritudinibus aurium.

Cap. XIII.

Iuxta Græcos & Latinos.

Aures semper patent, quoniam sensus is
etiam dormientibus necessarius est, ut à
somno excitemur. Somnus (ut Platoni
placet) per aures cerebrumq; & sanguinem usque
ad animam penetrat in sedem iecoris. Aristoteles
uero, ab auribus meatus ad occipitis partem pene-
trant, sicut oculorū ad uenas circa cerebrū sparsas
tendunt. Alibi olfaciendi, inquit, audiendiq; contin-
gunt aërem externum pleni spiritus natiui, ortiq; à
corde tendant ac desinant ad uenulas cerebro con-
iunctas. Quidam philosophi auditum portam men-
tis uocauerunt. Auditus enim (teste Aristotele) dis-
ciplinæ sensus est. Et qui eo carent disciplinā non
capiunt, qui uero audiunt, & si cœci sunt, plurima
& discere & docere apti sunt. Didimus cœcus uir
literatiss.

literatissimus, et sacrae scripturae sacramenta doctissimus tempore Antonij abbatis floruit in Aegypto. Beda quoque in omni disciplina et in sacra lege apertissime eruditus coecus fuit. Aurium dolores ob refrigerationem fiunt, quae à uentis fit, uel aquis frigidis, uel medicaminibus in quibus lauatur, et ex ardore uel ex cutis metu, uel introrsus ex neruo auditorio significatur dolor, et ex spiritu flatuoso meatu non habes. Frigore solo factum dolorem calefacientia statim curat. Cepa igitur uel allium ebulliens in oleo medetur cunctis refrigerationibus. sunt quoque euphorbium admodum paucum multo oleo admixto utantur, aut pipere accuratissime dissoluto cum uino et oleo. Prodest autem etiam amaracinum, et optima nardus, et laurinum oleum, et ruta oleo cocta dulcissimo plurimum confert. Cum autem medicaminosa aqua in meatum auris infusa fuerit, statim oleum infundere prodest abluendo aurem et molli lana macerando, prodest etiam multum si oui tenue, et albumen infundas cum lacte mulieris tepidum immittendo. Cuncta namque adhibeantur mediocriter calida. Iuuat autem ipsos etiam adeps anserina. Plurimum namque per os exugens attrahit aquam, uel calamo exugendo uel canali instilla cum cepe cum adipe anserina, id namque ualde parat. At si quis eo pede subsultet, ac eo lateris succussu moueatur, unde

unde auris dolor uexat, facile aqua excutitur. Si auris dolor cum pondere capitis fuerit, crassi & pituitosi in causa sunt doloris humores, id potueris ex antecedente uictu deprehendere. Nitrum igitur atq; Aphronitrum auricularibus medicaminib. admiscebis, album quoq; & nigrum elleborum, amygdalaq; amara, & aristolochiam, & cucumer agreste, & bryoniae radicem, & centaurij magni radicem, & parui comam, & irim, casiam, ac prorsus cuncta amara sine morfu ac molestia purgant meatus & abstergunt, secantq; oppilata ex crassis humoribus. Appolonij medicamē ad subitos sonitus, & sibilos in auribus factos: Acetum acutissimū calefacito, & instillato, uel acetum cum rosaceo calefacito & infundito. Si perdurarit cuminum, rutam, anetū, & gith coquito cum aceto immitendoq; rosaceum utere. Quibus uero obest audiendi difficultas, purgandi sunt hiera, uel ex aloē, & colochintide catopotijs. Rursus omnis piscis fel infusum iuuat, & perdicis & capræ. Vbi uermes orti sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi. Cauendumq; ne postea nascatur, ad utrunq; proficit album ueratrū cum aco contritum. Elui aurem oportet uino in quo martubium decoctum sit.

K

Ex

Ex traditione Penorum &
Arabum.



Egritudinum quæ in auribus fiūt, alia est
cuius causa est malitia complexionis tan-
tum, & alia est cuius causa est oppilatio,
& alia est quæ fit ex uentositatibus grossis quibus
non est penetratio. Et alia est quæ fit ex apostema-
te. Et alia quæ fit ex ulcere quod est in foramine au-
ditus. In pluribus autem horum accidunt propter
illud dolores in membro de superfluitate sensus.
Constantinus: Passio auditus triplex esse uidetur,
uel enim ex toto aufertur, & surditas uocatur, uel
pars solum aufertur, & auditus fit grauitas, uel fit
extra naturam, sicut cum auditur molendini sonus,
siue cuiuslibet rei sibilus. Si ex apostemate uel alijs
supradictis careant, auriculæ tamen sonitum uideā-
tur retinere, intelligendum est ex grossa esse uen-
tositate, uel ex uiscosis humoribus, uel ex auditus
defectione, uel qualibet alia re intercidente. Aliquā-
do etiam patiūtur ex acumine sui sensus. Si ex gros-
sa sit uentositate continuum erit, si ex grossis sit hu-
moribus uel uiscosis, grauitas infirmo gignitur,
non tamen tam grauis sicut prior. Aliquando auri-
culæ ex complexionis patiuntur mutatione in frigi-
ditatem, siue: calorem, uel de rebus interius nascen-
tibus

tibus sicut humoribus, uel de exterioribus, sicut aëris frigidityte uel caliditate. Ex calore sentit ardorem nimium, & refrigeratur frigore aëris, & e contrario in frigido. Et aliquando auriculæ patiuntur ex sanie. Si autem doluerit nimis à medicaminibus, incipiat à extinguentibus dolorem. Si sanguis subito & sine dolore ab auribus exeat, nec aliquid aliud extrinsecus siue intrinsecus antecedit, intelligitur causa esse in capite quam natura laborat expellere. Auicenna: Nocumenta auditus quandoq; accidunt secundum semitam crissum, & secundum semitam permutationis materie in fine ægritudinum acutarum, quandoq; remanet post recessione febris grauitas capitis, et quandoq; fit nocumentum quod est huius capituli. In dolore uero & grauitate communicant omnia, quæ sunt ex apostemate, & materia ubicunq; sint. Et ne intendes ad curationem eius adhibenda stiptica & apocrustica in principio, imò adiuues ad trahendum materiam ad apostemata cū omni ingenio, etiam cum uentosis si non fuerit uelocis attractionis.

Neotericorum de hoc sententia.

Passiones plures accidunt auribus, aut in auditu, aut in sibilo, aut in tintinnitu, aut in dolore, aut in sanie, aut in

K 2

qualibet

qualibet parte. præter naturam ibidem contentā,
ut apostemate, uel solutione continuatis. Iste autē
passiones causas habent proprias in aure, aut in ce
rebro, aut in toto corpore. Adest ergo nocumen
tum in auribus, uel ex passione, uel ex compassione.
Si ergo fiat ex compassione, ut si causa in cerebro
sit, uel in toto corpore, significatur ex nocumēto ali
orum sensuū, & motuum, et ex mala complexione,
uel dispositione corporis & grauedine capitis &
dolore. Si autem sit ex ipsa aurium passione, non o
portet quod in alijs apprehensiuīs & motiuīs ali
quod sit nocumentum. Hoc circa aures communiter
est prænotandum. In manatione saniei ex aure, sin
gulo die beneficium habeat uentris saltem semel, et
si non naturaliter saltem artificialiter cum enema
te infra scripto. Non stet in lecto amplius nouē ho
ris, & in hyeme non dormiat plus septē horis. Aë
rem cohabitet siccum & debitæ caliditatis. Portet
caput cōuenienter calidum et magis in nocte quā
in die. Non teneat aures obturatas & proprie de
nocte, sed solū coopertas. Iaceat de nocte super au
re unde fluit sanies, exercitetur cōuenienter & pro
prie stomacho ieiuno mane & sero, euitet melācho
lias quantum potest, utatur gaudio uirtuoso. Ene
ma diuersuum & materierum communium educti

num:

uum: Recip. fol bliti, maluarū ana. M. 1. mercurialis.
 M. 2. saluie, stœchados ana. M. s. florū chamomilæ
 ꝯ. s. seminum fœnugræci ꝯ. 6. uitellū oui. 1. casie
 fistule ꝯ. 1. hieræpicræ, sachari rub. ana. ꝯ. s. olei
 communis ꝯ. 3. salis ꝯ. 1. et fiat clyster, ut decet se-
 cundū artem. Solutium minoratiuū materierum in
 capite & stomacho peccantiū usuale & facile: Re-
 cip. Pil. de hiera simplici ꝯ. 2. salis gemmæ, zingib.
 ana. gran. 1. agarici ꝯ. 1. istud solutiū assumat in
 aurora, deinde dormiat per horā tantum. Quibus
 pilulis potest uti à tribus ad 5. ad libitum omnibus
 diebus 10. cum modis suis. Digestium dictæ mate-
 riæ et cerebri cōfortatiuum: Recip. Aquarū saluie,
 uiolarum ana. ꝯ. 1. zingib. albi ꝯ. 1. aquæ maiora-
 næ ꝯ. 1. istud digestiū assumat calidū per octo di-
 es. Aliud solutiū & eradicatiū: Recip. Pil. de hie-
 ra simplici Gal. ꝯ. 2. agarici ꝯ. 1. misce, & cum dia-
 phœnicone ꝯ. sufficit fiant pil. 7. Istud sumat in au-
 rora modo quo supra, quod solutium accipiat tan-
 tum semel post digestionem. Lotio à capite diuersi-
 ua brachiorū et crurium: Recip. Florū chamomilæ,
 melliloti. ana. M. 2. saluie. M. 1. stœchados M. 1. s.
 uiolarum ꝯ. 1. lactucæ M. s. misce, & bulliāt in suffi-
 cienti aqua ad tertiæ partis consumptionē, & laue-
 tur brachia à cubito infra, & crura à genu infra om-

ni die semel aut bis ad libitum ante prandium, uel
coenam, utatur diebus alternis tota hebdomada
singulis mensibus, & uti incipiat die sequenti dicm
assumptiōis solutiui eradicatiui. Medicinæ ponēdæ
in aure à qua fluit sanies: Recipe. Aquæ mellis ℥. 3.
aloës, thuris ana. ℥. 2. myrrhæ ℥. 5. Istius aquæ dua
as aut tres guttas tepidas ponat in aurem per horā
ante coenam diebus alternis, deinde teneat aurem
obturatam per unam aut duas horas, & post aurē
obturet, deinde dormiat cum aure cooperta, sed
foramine obturato. Mixture: Recipe aluminis u
sti, mellis ana. ℥. 1. misce. inuoluatur tenta cum mi
xtura cum tenta linea & breui, et in aurē ponatur
per horam ante coenam cum modis in impositione
aquæ supra scriptæ, deinde cum uadit dormitum ex
trahat tentam ab aure qua utatur diebus sex inter
missis in spatio. lx. dierum & ea utatur reiterando.
Mixture alia: Recipe. Olei amygdalarum amararum
℥. 2. myrrhæ ℥. 5. croci. gran. 3. aloës ℥. 1. misce,
dum præsumptio est futuri doloris auris, tunc istis
us olei tepidi duas aut tres guttas in aurem ante
coenam imponat cum modis descriptis in usu aquæ
mellis, quo olea solum utatur præcedentibus digea
stiuo & solutiui & enemate supra scriptis, & do
lore præsepte aut præsumptiuo de proximo fieri.

Ad

Ad ulcera in aure sumatur secundum Rasim sarco-
colla, thus, myrrha, spuma maris, baurac, bolum
armenum, scoria ferri, flos æris & aloës, deinde
abluatur cum aqua & aceto tribus uicibus, post in-
uoluatur licinium cum melle in medicamine & po-
natur in ea, de medicamine fiant collyria, & cum
necesse fuerit distilletur in eam semel cum aqua
mellis, deinde administretur licinium. Quando e-
greditur sanguis ex aure absq; percussione & ulce-
re, distilletur in ea succus porri permixtus cum
aceto, aut succus granati elixati cum aceto, aut dis-
soluatur in aqua mellis in quo sunt mel & sarcocol-
la, & si fuerit antiquum sume scoriam ferri, & in-
funde in aceto mense uno & sit acetum apud te, et
effundatur ex eo in aurem ex qua egreditur humi-
ditas. Et quando fit dolor in aure ex paruis anima-
libus ingredientibus in eam, distilletur in ea aqua
in qua dissoluta sint aloë & succus foliorum cappa-
ris, aut succus absinthij, aut acetum forte, & sit to-
tum calefactum. Cum ergo sedatur dolor, & rema-
net grauitas fac eum sternutare cum condisi, & re-
tine ambas nares & iam infusum sit ante illud o-
leum tepidum. Et similiter est cura uermis in aure.
Ad sibilum aurium post purgationem distilletur
frequenter in aure hoc medicamen: Recipe succi

K 4

porri

porri ꝑ. i. succi maioranæ, succi rutæ ana. ꝑ. s. castorei ꝑ. i. musci granum. i. misceantur omnia & bene incorporentur, & tepesfiāt quando distilletur. Ad dolorē auris uehementē: Recip. Farinæ fabarū unc. 2. decoquātur in uino cocto et deponātur desuper. Ad surditatē syrupus: Recip. Acori, stœchados arabici, passularū ana. unc. s. liquiricæ, radicū fœniculi, cinamomi ana. ꝑ. 2. mellis lib. s. fiat syrupus. Sumpto syrupo per sex dies, purgetur cum pilulis cochijs Almanforis ꝑ. i. deinde omni septimana sumat ꝑ. i. harum pilularum: Recip. Cinnamomi, zingiberis, xylobalсами, carpobalsami, acori ana. ꝑ. s. spicæ, croci ana. ꝑ. i. rosarum rub ꝑ. s. aloës succi cotrini & epatici ana. ꝑ. 3. fiant pilulæ cum succo fœniculi, sumat sero quando uadit ad lectum alleuiata cœna. Facta prima purgatione incipiat omni sero quando uadit dormitum sumere ꝑ. i. huius mixtionis: Recip. Pliris arcoticon drach. 2. diamargaritonis unc. i. misceantur, & non bibat cum ea, continuet longo tempore. Facta prima purgatione, incipiat distillare in aurem hec: Recip. Vini subtilis parū dulcis, urinæ pueri ana. unc. i. bulliant, cum unc. i. mellis, & si cum hoc non uidetur fieri sufficiens abstersio, addatur parum unguenti Aegyptiaci secundum Mesue. Quando autem existimatum fuerit quod

quod mundificatio facta fuerit, fiat hoc medicamē:
Recip. Olibani, sarcocollæ, myrrhæ, aloës ana. 3.
1. dissoluatur cum uino & cum licinio ponatur in
aure. Ad dolorem auris postquam transiit princi-
pium, oleum de corticibus ouorum commendatur
ab Auenzoar, cui debes credere. Item emplastrum
farinæ seminis altcæ, florū chamomilæ ana. unc. 2.
coquantur in uino dulci, & postea accipiatur cepe
ualde coctū, & misceatur cū his, & ponatur desup.

De egritudinibus nasi, dentium, gingi-
uarum, & oris. Cap. XV.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

EMinentior faciei pars est nasus, chartila-
ginosus, ab osse incipit quod est inter su-
percilia, & hunc nominamus, qui in
globulum desinit: mouetur in homine labrorum su-
periorum motu, in canibus sua neruorum syrigia
mouentur, & contrahuntur, hac parte aërem attra-
himus reddimusq; hinc sternutamenta ciuntur, quo-
niam ad cerebrum certam uiam habet, polypus
& carcimomata nasum infestant. Narium uena si
inciditur, adeo sanguinem indefinenter quandoq;
fundit, ut sistendi modus non sit. Dentem ab eden-
do quidam appellatum uolunt quasi edentem. Alij

K S

autem

autem aliter deductum esse uolunt. In dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, à medicis remedia plurima accepta sunt, in quibus uide Celsum lib. sexto, capite 9. Sed agrestium experimento cognitum est, cum dēs dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, & in peluem coniici, supraque aquam infundi, colarique iuxta sedentem hominem undique ueste contactum, tum in peluem candentes filices demitti, sic ut aqua tegantur, hominemque eum hiantem ore uaporem excipere undique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idque saepe longiorem saepe annuam ualeitudinem bonam praestat. Hulcera autem quae in meatibus nasi simpliciora curant, Andronius, Pasionque, & Polydes, & Antonius Musa, & Bythimus, aliquando quidem uino dulci pastillos dissoluendo, quandoque austero, aliquando ex aceto uinoso uel acuto iuxta casus morbi, inuenerunt medicaminum usus. Archigenes autem pinguibus in talibus usus est, plumbi scoriam dissoluendo cum uino uetere et myrtino cuiuslibet aequa parte coxit uase testaceo in prunis assidue mouendo, cumque spissiculatum lubricumque fuerit medicamen tollit in pyxide plumbicam, ibique custodit. Oribasij ad narium hulcera: Lythargiri

thargiri 3. 6. plūbi usti et loti 3. 4. myrrhæ, aloës,
ana 3. 2. ciciidia 3. cum uino myrthino utere. Aliud
eiusdem ad simpliciora nasi hulcera: Lythargiri 3.
6. cerusæ 3. 8. corticis pomi punici 3. 4. aluminis
scissi 3. 3. uino dissolue, & myrthinum immitte o-
leum, custodi in plumbeo uase & utitor. Appoloni-
us autem in narium sanguinis eruptione pollicem
pedis digitum, inquit, liga pacabisq; multam, quæq;
cohiberi non possit sanguinis eruptionem, gestetur
aqua pluuiæ frigida in ore, cucurbitulam in occipite
imò admoue cum ablatione. Intestinis magnam
admoue cucurbitulam, si dextra pars sanguinem
profundit, si autem sinistra, spleni. Ad cuncta
in labijs hulcera ex uitiosaquæ consuetudine, O-
strea exusta dissolutissima insperge. Quidam e-
tiam non exusta sed dissolutissima aiunt indidisse,
& affecutos quod uolebant. Ad motos dentes,
& cruentas gingiuas medicandas, sistetq; proflu-
entem pituitam & dentes albos reddit: Aluminis
scissi uncia 4. mastiches uncia, libani drachmæ 4.
foliorum drach 3. semis, immittito porro in den-
tem dolore affectum, ac contineto quo ad os spu-
to imbuatur, tum expuatur. Ad malas sine ta-
be et immotas custodiendas: Bryoniæ albæ, racemo-
rum succi, libra & dimidia, mori corticis radi-
cis

cis unc. 6. coque, ut ad dimidium redeat, datoq; ca-
lidum in ore cōtinendum, qui eo utetur, dolore nul-
lo affligetur dentium.

Quid de his Peni & Arabes sentiant.

Aliquādo homines fetores in naribus pa-
tiuntur horrendos, qui multipliciter esse
videntur, uel enim ex humoribus salsis et
foetidis à capite descendentibus, seu ex alijs nō sal-
sis humoribus, & uulneribus pustulis seu aposte-
matibus existentibus foetentibus generantur. Ali-
quando sanguis è naribus fluit, & aliquando est uti-
lis & aliquando nō utilis, ut in causone & phrene-
si contingit, & in menstruis, et catarrhis calidis ex
motu naturæ et sanguinis. Nō bonus est fluxus si ex
nimio est calore in corpore interiori, q̄ cū bulliat fu-
mū ascendere facit ad capitis partes superiores, et
implens uenas crepat, & eas currere facit, aliquan-
do in uenis per se crepatis fluxus fit sanguinis. Et
labia aliquando fissuras, aliquando pustulas patien-
tur seu uulnera, quod ex acutis contingit humori-
bus, & his subueniendum est cum oleo rosato uel
uiolato, & cum cæra & oleo rosato. Si pustule sint
humide, rosa sicca cum gumma temperata labia un-
ge, cum santalis rub. rosa, gumma arabica, cerusa
temperata cum aqua rosarum. Si multa sit concaui-

tas, axungia anseris, capræ, uel medullæ bouinæ labia inungat. Auicenna: Os est uas uniuersale locutionis in homine & uociferationis, in reliquis animalibus quæ uociferant ex sufflatu. Lingua autem est ex instrumentis conuersionis cibi masticati, & incisio uel sculptura uocis, & extractio literarum, & discretio gustus. Et asperitas quidem linguae sequitur siccitatem, & planities sequitur humiditatem, & opportunius quidem bibuntur appropriata lingue post cibum. Et quandoque apostematur lingua propter potum uenenorum, sicut fungorum & opij. Et quidem erat cui apostema erat in lingua, & somniauit se tenere in ore succum lactucæ & fecit & sanatus est integrè. Et quando appareret in febre acuta bohor nigre in lingua, moritur infirmus in die secundo. Et phlebotomia confert omnibus aegritudinibus oris calidis. Si autem causa fætoris oris est humor cholericus putrefactus in stomacho, aut in toto corpore, tunc non est aliquid magis conferens ei quàm chrysimola humida ieiune. Dentes autem sunt ex summa ossium, quibus inest sensus propter illud quod uenit ad eos ex neruis à cerebro procedentibus leuibus. Et accidit dentibus stupor, & est species dolorum eorum. Et accidunt species apostematum, & illud non est mirum. Omne enim
quod

quod recipit extensionem cum augmento nut: imē
ti non elongatur quin recipiat extensionem cum su
perfluitate. Porri enim uehementer nocent denti
bus & gingiue proprietate sua. Si dolor est in den
te remouetur cum eradicatione, & quando est in
neruo quādoq; remouetur cum eradicatione, et quā
doq; nō. Stridor dentium in somno est ei sicut spas
mus, & quando multiplicatur indicat apoplexiam
aut epilepsiā, aut spasmū, aut uermes in uentre, &
iste est habens uicissitudines. Congelatio est stupor
quidam accidens denti propter causam retentam,
quæ est stipitica aut pōtica proueniēs ab intus uel
ab extra, et quādoq; fit ex imaginatione æstimatoria
cum præsens est ille qui masticat acetū masticando
cum transmissione. Idem Fen. Auicēna octaua. Cum
aut gingiua non cessat superari & apostematur, et
non sanatur, tunc indiget cauterio. Duo labia crea
ta sunt ad cooperiendū et os et dētes, & ad decorē
& ad retinēdum saliuam, et in hominib. ad loquen
dū Rasis. Fluxus sanguinis nariū fit propter crisin,
& signa eius sunt, fit post aliquā febrū acutarum,
et nō oportet ut restringatur nisi superfluat, & fit
sine febre propter acuitatē sanguinis qui egreditur
ex eis, et signa eius sunt, quod aduenit paulatim, &
est uehemētis subtilitatis, et fit propter multitudi
nem

nem sanguinis in corpore, quare rumpuntur uenae
& arteriae quae sub cerebro sunt, & est difficilis for-
sitan in quo non ualet cura, & signa eius sunt quod
fit post dolorem capitis uehementē, et rubedo in fa-
cie et oculis dominās, et q̄ precipue multū utitur ui-
no, et minorat extractionē sanguinis et uenit cū im-
petu uehementi, et quādoq; cōfert in eo ut distilletur
in naso aqua niuis. Cōfectio medicaminis auferētis
dolorē nasi: Myrrha, galla, colcothar, cortices gra-
natorū, calamus aromaticus, gariophil. et terantur
& humectetur nasus cum licinio infuso in uino odo-
rifero, deinde suffletur in eum & inuoluatur liciniū
& intromittatur in nasum. Confectio medicaminis
ad fluxum sanguinis ex naribus: Aloēs, thus, balau-
stia, calx uiua, puluis molendini, gipsum, galla, terā-
tur cum alcohol. & suffletur in nasum & mittatur
in nasum licinium. Ad fætorem oris: Recip. Extre-
mitatū myrti humidæ, cinnamomi, emblici, cyperi,
spica, corticū citri, foliorū squinanti, mastiches ana.
gallia, gariophil. nucis muscatæ, cubebæ, zingib. a-
na. part. s. aggregētur cū passis enucleatis quæ sint
duplum totius, & sumatur ex eo sicut nux cū uino
odorifero, et sit post uomitum et solutionem uētris
aliquotiens, et abstineat à cibis uiscosiss, et pingui-
bus. Confectio medicaminis ad grauitatem linguæ:

sal

Sal armoniacum, pyrethrum, staphisagria, sinapis, piper, acorus ana. terantur & fricetur cum eis sub lingua, & supra ipsam in die multotiens. Cōfectio ad uulnam cadentem: Gallæ, balauſtiæ, sal armoniacum, ana. & sufflentur super ipsam & ponantur super cholearium & eleuetur cum ea. Confectio theriacæ ad dentes experta: Afse, opij, myrrhæ, castorij ana. conficiantur cum melle. Confectio faciens stare dentes ne corrodentur: impleantur corallo & mastiche. Confectio dentifricij stringentis gingiuas & dentes, conferens rubedini eorū: balauſtiæ, spodij, rosæ cōtritæ, carmesich, alumen ana, fiat ut supra gingiuam adhæreant.

Ex traditione autorum recentium.

Nasus uocatur organum olfactus quod ex quatuor componitur, scilicet ex quibusdam carunculis neruosis à prora capitis descendentes, quæ sunt similes capitibus mamillarum, & hæ caruncule principale et propriū sunt organum. Secundum est os concauum per cuius cōcavitatem ingreditur aër ferens odorem. Tertium est cartilaginee colligentes et conformantes illum aërem cum odore. Quartum est lacertus per quem attrahitur & insufflatur & exufflatur aër. Cartilaginee autem appellantur nares, horum autem quatuor

tuor collectio dicitur nasus. Galenus quinto de simplici medicina dicit, quod nullum est excellentius remedium quam compositio ex aloë & thure. In corporentur enim adinuicem cum albumine oui, dicit quod excedit omne remedium ad retentionem sanguinis, non autem est timendū de aloë. & si aperiat orisitia uenarū, hoc habet solum ueritatem exhibitu per interius, per exterius habet uirtutē glutinatuā. Succus etiam basiliconis à proprietate curat attrahēdo eum per nares, uel cū licinijs appositus. Stercus etiam asininum exiccatum & in puluerem redactum, & insufflando in nares. Etiam ualet limatia cum testa assata, & in puluerē redacta, & insufflata in nares, uel incorporatus in albumine oui & intinctus ut supra. Item ualet bursa pastoris circa dolorem dentiū à materia frigida, primo soluitur cum pil. cochijs. Calefactoriū cū pānitio, chamomila, aceto, absinthio, milio, sale multū ualet. Collutio cū uino calido uel aceto bullitionis sandarachæ, aut pyrethri, calamenti, origani, piperis, sinapis, multum ualet. Liniatur dens in quo est dolor cum theriaca. Fiat etiā collutio oris cū aceto bullitionis colocynthidis, aut alliorum, aut pyrethri, aut saxifragiæ, aut corticum radicum capparis, aut ex aceto quod multū bullierit in testa colocynthidis. Ad fa-

L torem

torem nasi & humorem uel putredinem existētem
intus: Recip. Centaurij minoris. M. l. bulliat in ui-
no uel aqua tamdiu quousq; exiccetur, postea mit-
tatur in nasum, & est remedium Auenzoar. Ad fœ-
torem oris: Lauetur os cū aceto decoctionis mēte,
balaustie, uel leuistici, uel maratri & panno bene
aspero fricentur, ne quid ibi remaneat. Granū solis
ore ieiuno omni mane teneatur. Theriaca cum me-
thridato admixto succo mēte illiniatur os. Utatur
pilulis in omni fœtore oris stomachū rectificātibz,
& fœtorem palliātibz: Recip. gariophylatē, nucis
muscatē, cinnamomi, macis, ana. 3. 7. santali rub.
3. 6. cubebarū 3. 5. cardamomi 3. 4. ligni aloēs 3.
1. galliē muscatē 3. 5. fac puluerē, tempera cum suc-
co mentē forma pilulas in modum ciceris, unam te-
neat uel duas sub lingua. Item fiat puluis de aloē o-
ptimo, & distemperetur cum succo absinthij in mo-
dū Syrupi, de hoc accipiat mane tria cochlearia, q̄
bus acceptis accipiat alia tria statim de melle, quod
fiat quotidie, hoc solo multi curati sunt. Quādo fœ-
tor oris fit uitio dentium, dentes fricentur cū pulue-
re cornu cerui combusti, uel: Recip. Cancrorum flu-
uiālium, species aromaticas & camphorā. Generali-
ter omnia electuaria aromatica & calida placēt cō-
tra fœtorē oris. Cōfectio contra grauitatē linguae:
Recip.

Recip. zingib. galangæ ana. 3. i. macis, nūcis mus-
 scatæ, cardamomi, croci, xyloaloes, zedoariæ, doro-
 nici ana. 3. i. spicæ, garioph. becn albi & rub. ana.
 3. i. pinearū mundatarum 3. s. fer. o. nisi, fœniculi,
 ana. 3. 2. musci, ambre ana. gran. 3. pulueris sachar-
 i lib. 1. dissoluatur sacharum in aqua decoctionis
 acori, & fiat confectio in uase. Confectio ad idem:
 Recip. Cinnamomi 3. s. gariophil. croci, ana. 3. 2.
 macis, cardamomi ana. 3. s. nūcis muscatæ 3. i. fisti-
 corum 3. passulæ um, pinearum mundatarum, ana.
 3. 6. sachari albi lib. 1. fiat confectio, aromatizetur
 cum ambre bonæ. gran. 3. Pilulæ quas quandoq; su-
 mat in hebdomada: Recip. Azari, salis gemmæ, fo-
 liorū sene ana. 3. i. myrrhæ, macis ana. 3. 6. aloës
 succocitrini 3. 5. fiant pilulæ cum succo
 fœniculi.

Finis libri secundi.

L 2

S I Mæ

SIMPHO-

RIANI CHAMPERII,

Liber II.

De Synanche, quam nostri corrupto
uocabulo squinantiam uocant.

Cap. I.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Σ Υῶϣϣ Græcè, Latine angina dicitur,
 quæ uulgo perperam squinantia dicitur,
 quod nec Latinum nec Græcum puto. Verum Synā
 tia locus est ubi duæ ualles conueniunt. Est igitur
 angina apostema gutturis, quod angat & strangu
 let fauces, à multis etiam Tonsillæ dicuntur. Plini
 us autem differentiam facere uidetur. Synanche au
 tē dicitur, à σὺρ & ὄϣϣ quod nos angō dicimus,
 hoc etiā morbo sues infestantur. Galenus ait: Qua
 liscunq; morbus in gula uenerit et inflatione sua spi
 ritum tenuerit, synantia, id est, suffocatio uocanda
 erit. Cause multæ, inquit Aretæus, sunt angine, præ
 cipua est refrigeratio ex multo æstu, & plagæ &
 ossa piscium cum faucibus inhæserint, potusq; frigi
 di. Archigenes inquit: Occultæ causa angine est, in
 tenti nerui delati ad stomachum, malum hoc sustinē
 tes

tes membris inferioribus, pulmone inquam & corde respirandi principio aestuantibus, perturbatis autem arterijs, alijs adiacentibus immittunt partibus, neq; ea grauantur quod in his languoris causa distemperantia sit non angustiae. Boni igitur, inquit Archigenes, in his sunt uomitus, qui ex elacterio & squama aris cum melle illitæ. Ego autem, inquit, hos occulte ab angina ex sinapi gargarisando leuavi, exhaustiq; subito in balneum perducens, atq; ita à periculo liberaui, cum pars ea dolens tanquam lapis esset. Aretæus autem inquit: Principium sit infra umbilicum decurrendo ad latera, & scapulas continue transferendo à loco in locum deducendo ex superius in inferna cucurbitulam, quod si suffocatio admodum properauerit, cū aqua tere sinapi, quod leuigatum pone linteo, & pectori imposito, ex his commixtionem sinapi, nitrum, hyssopum, scyllam tostam, sulphur extinctum, cuncta cum melle sint, datoq; cochlearium lingendū. Archigenes aut inquit: humanum stercus, sani hominis capito, & arefacito, & linteo ligato, & exurito, et dissoluito cū mellicrato datoq; potandum, hoc præsentaneum remediū est eis, qui suffocantur. Antonius Musa Cæsaris Augusti medicus, caninum stercus sumit & arefacit, disijcit, et colat et utitur in anginis

ginis illiniendo cum melle penitissima, ut deglutiat æger. Hoc ualidius esse nō putat remediū: Sume, inquit Marcian. æris exusti. 3. 2. calchātū 3. 12. myrrhæ 3. 1. clacterij, aphronitri singulorū 3. 1. fellis tauri 3. 4. assumendo cū melle illinito pēna q̄ possis penitissime. Medicamē Aesculapij ad tonsillas ita fiat: Cici dū omphaciōrū 3. 4. diphrygis 3. 1. myrrhæ 3. 3. croci 3. 3. s mellis quantum sufficiat sine hulcere tōsillas corripit. Cunctis enim hominibus exigue sunt carnes à natura productæ ab utraq; faucium parte, ipsæ conseruatæ intra suam mensuram naturalem molesti nihil ingerunt. Cum uero morbi proprietate auctæ fuerint, supraq; naturalem suum modum excreuerint, tum potum difficilem q; anbelitum faciunt. ἀντριάδες à Græcis, à nostris tonsillæ nominatæ, ut plurimum citra ardorem sunt, & parum augentur, est etiam cum inflammatur.

Secundum Pœnos & Arabes.



Quinantia passio aliquando est ex humoribus à capite ad guttur descendantibus. Aliquando eadem die mortificans uel secunda, uel tertia, quia enim est peracuta & mortifera, ideo hominem subito mortificat & suffocat. Inde squinantia est uocata, quia angustat flatum, ut infirmus neq; cibum possit, neq; potum recipere, uel

fi

si recipiat paruiſſimū eſt, humores aut̃ deſcenden-
tes ſanguinolenti ſunt uel cholerici, uel phlegmati-
ci, uel ſaſi, uel uiſcoſi. Ex melancholia enim nunq̃
hoc apoſtema fit, quia hic morbus cito præualet cū
fit peracutiſſimus. Sed melācholia per longū tēpus
operatur, unde impoſſibile eſt eſſe de nigra chole-
ra. Flatus ſquinanticorum propriē eſt longus, cauſa
ſuę longitudinis eſt ſtrictura gutturis, quod cum
quantū ſibi ſufficiat aērē in impetu trahere ſibi non
ualeat, lōgo ſpatio neceſſe eſt ut expleat, anhelitus
ergo breuis laudabile ſignum eſt ſquinanticis. Vn-
de Galen. Peſimū eſt genus ſquinantię quod infir-
mū ad orthopnoęā inſequitur, neq; nimīū dolorem
uel anguſtiā feciſſe uiditur exterius. In gula ſiue in
collo ſi tumor non apparet neque rubor, minor in
peſimitate eſt. Si cū tumore & rubore in gula &
collo facit dolorē nimīū, minor eſt in gradu tertio,
cuius nō minus dolor neq; flatus anguſtioſus, hic er-
go nō in gutture, ſed in collo, uel in gula, uel in utro-
que eſt. Auicenna: Ex præfocationibus quędam
phlegmatica eſt magis incolumis, & eius ſanatio
eſt uelocior & facilior, & quandoq; prolongatur
40. diebus. Et omne apoſtema præfocatiuum aut
interficat, aut mutatur materia eius, aut collectionē
facit & ſuppuratur. Et omnis ſquinanticus qui

L 4

moritur,

moritur, spasmat in primis. Oportet ut euacuetur in principio uniuscūq; illorum materia, faciens illud cum phlebotomia & solutione uentris, ut atrahatur materia ad partē diuersam saltē cum uentosis super loca longinqua opposita ei, & ligatione extremitatū dolorosa. Et nō postponatur phlebotomia uenæ quæ est sub lingua, imò oportet ut aperiat in eadē die, saltē in dispositione separationis prædictæ, scilicet phlebotomiæ, intellige hūc canonem, ut nō sit repletio in toto, sed sit superfluitas tantū in parte gutturis. Et ex eis quæ sunt uehementis iuuaminis, est inceptio administrationis clysteriorum fortium, nisi febris prohibeat, tunc enim sit contentus clysteribus lenibus. Et cum deglutitio sit difficilis, ponantur uentosæ super collum apud spondilem secundam, & dilatetur meatus, & deglutiat illud quod sorbet ex cibis, cumq; illud compleuerit remoueantur uentosæ. Et quandoq; intro mittitur in gutture cannula facta de auro & argento, & similibus adiuuando ad inspirandū. Mesue: Synanchia terminatur secundū unum trium modorum, aut enim resoluitur, aut suppuratur, aut permutatur. Sed cum ad maturationē peruentū fuerit, tunc ad apostematis apertionē studendū est cū medicamentis propriè aggregantib. intentiones duas aper-

apertionis scilicet & lenificationis, uerbi gratia sicut ex medicamentis acutis, sicut balaustia, aut ster-
cus hyrundinum misceat cum aliquo eorū, quod est
sicut succus herbe albedusar, quoniā est sublimis.
Rerum autem aperientium apostemationem huius-
modi sunt: sal armoniacū propriē, & baurach, myr-
rha, assa foetida, sterco canis albi qui diu pastus est
ossibus, sterco hyrundinis. Et si adhuc non aperia-
tur ex istis, currendum ad apertionem eius cum fer-
ro. Et sunt scindentes huiusmodi apostemata cum
unguibus postquam immiserint digitos in guttur,
cum autem manare coeperit sanies, locetur super fa-
ciem suam & liniatur guttur ipsius, & palatum fri-
cando ipsum digitis cum melle uel sale pauco, &
frequententur gargarizationes ex eis & mundifi-
cetur locus.

Ex traditione autorum recentium.

Guttur spaciū dicitur superius cānæ pul-
monis, quæ est uia anhelitus, supra quam
dependet uuula. In radice enim lingue
duo sunt foramina, unum est uia cibi, & dicitur me-
ri siue œsophagus, & aliud quod est uia anhelitus,
& dicitur ἐπιγλωττωρ siue guttur. In hoc ergo lo-
co quandoq; ingreditur uel aggregatur cibus, unde
sequitur strāgulatio, quādoq; infigitur spina, uel ari-

L 5 sta,

sta, uel os, uel aliquid consimile, uel sanguisuga, & aliquando ibi apostema generatur, uel compressio, uel coarctatio, unde impeditur uox, uel destruitur, uel patiens suffocatur. Hec omnia communia sunt gutturi et œsophago, quia guttur deseruit membris spiritualibus, sicut œsophagus uel meri membris nutritiuis. In hac passiõe prohibetur aër intrare ad pulmonē, quæ aliquādo accidit propter medicinas uenenosas pulmonē comprimentes, aliquando propter nimiam frigiditatem constringentem, & aliquando propter apostema quod est in gutture uel œsophago, uel propter nimiam siccitatem lacertorū patitur, unde uia aëris oppilatur, uel propter dissociationē spondiliū colli, unde uia aëris et cibi coarctatur. Oppatio uero gutturis potest impediri propter apostema, q̄ oppilat meatus gutturis, aliquādo propter cōpressionē et dislocationē spondiliū colli, aliquādo ppter malā cōplexionē siccā et humidā, unde debilitatur uirtus motiua lacertorū. Hoc apostema scilicet squinanticū quadripartitū est, aut enim est in lacertis exteriorib. gutturis, et longe ab orifitio superiori cānæ, unde apparet rub. magna uersus petus, aut est in lacertis superiorib. gutturis uersus orificiū supius, unde apparet rubor et tumor ī ore, aut est in lacertis intrinsecis meri quib. cibis deglutitur,

titur, unde coarctat uia aëris ppter uicinatē, uel in illa distātia quæ est inter illa duo foramina, et hoc est in omnib. magis piculosa, quoniā oppilat utrāq; uiam, hæc duo ultima sensui nō apparēt. Synanchia autem in qua os tenetur apertum, & lingua manet extensa, magis est periculosa, & interficit quādoq; in prima die & raro durat usq; ad quartum, & dicitur canina, & non recipit curam. Omnes autem synanchiæ frequentius accidūt in Vere, et maxime si principiū Veris sit frigidū. Omnis synāchia in feb. e acuta est magis periculosa, quia impeditur euē tatio, quandoq; magis est necessaria. Item synāchia superueniēs in die cretica, est periculosa. Synāchia quæ nō apparet interius in ore, nec exterius in collo, cognoscitur per constrictionem anhelitus, uel quando bibitur aqua redundat ad nares, & per tumorem & ruborem oculorum, & per rigitudinem linguae, & per difficultatē motus eius, & quia uox exit per nares, & est gracilis uox similis uoci catulorum, et collum rigidum est. Si per os spuma exeat mortalis est, uel si anguli oculorū fiant nigri uel uirides, si pulsus occultetur, & frigeant extrema eadē die moritur, uel si sub ascellis frigidus sudor sentiatur. Et quando est à phlegmate inter omnes minorem dolorem infert. Principalis intentio in qua maior

maior pars curæ consistit ad prohibendum augmētum apostematis, est diuersio, & hæc cōpletur per phlebotomiam. Auicenna primo laudat eam usq; ad syncopim, postea timet syncopim dicendo, quod est timendum uirtute existente de illi, quia nō possunt cibum accipere. Maxima existente repletionē, debet fieri de saphena, postea de basilica uel nigra, deinde de cephalica, & nō primo à cephalica, quia plus de materia traheretur ad superiora quàm euacueretur, potest etiam fieri magis uel minus copiosa secundum diuersitatē corporū, & relinquitur discretioni medici. Auicēna timet solutiua fortia, quia agitant humores, qui postea fluunt ad locū apostematis & maxime in principio, debilia uero possumus exhibere ut: Recipe Prunorum, thamarindorum ana. ℥. i. s. coquantur cum ℥. 8. aquæ ad consumptionē tertiæ partis, decoctiōi admisceatur mānæ electæ ℥. i. s. & fiat potio. Diuertimus cum clysterijs, quæ non sunt acuta, nec multū fortia. Diuertimus etiam cū applicatione uentosarū in spatulis, in adiutorijs brachiorū, sed primo applicandæ sunt in partib. inferiorib. quia magis diuertūt. Diuertimus etiam cum fricationib. extremitatū in aqua calida. Est ingeniū etiā uulgare cum fricatione cōpressua facta in parte syluestri brachiorum, propè iun

aturam

Eturam manus, ubi inueniuntur quædam parua, ad modum nerui, quæ tandiu fricentur quousq; uideantur deleta, quod fieri non potest absq; dolore, et sic cum dolore diuertunt. Item ligetur modicum spongiæ cum fortissimo filo & in melle intingatur, deinde præcipiatur trās glutiri, trās glutitum fortiter extrahatur, hoc enim rumpit apostema & materiā à loco remouet. Idem facit frustum carnis aliquantulum pinguis fortiter ligatum & extractum. Inuoluatur locus cum lana succida infusa in decoctione hyssopi, appposito oleo oliuarū uel camomæleon. Item in causa frigid. bulliatur in uino fortiter agrippa, marciaton, dialthæa, postea stupæ ibidem intinctæ circa collum inuoluantur, istud resoluit & diaphoresim operatur & sedat dolorem. Item locus inungatur cum melle in quo decocti sunt anacardi. Gargarismus fiat in fine augmenti & in statu cum dissolutiuis, ut est oximel, sinapi, castoriū et costum.

De tussi. Cap. II.

Iuxta traditionem Græcorum & Latinorum.

Iussis ferè propter faucium exulcerationē molesta est quæ multis modis contrahitur, itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere, & uix cum uetus facta est eliditur, ac modo arida est, modo

do pituitā citat. Tussis Græcè ab altitudine uocatur, quod à profundo pectoris ueniat. Tussis uariæ sunt causæ. Nam humor à capite in asperā defluens arteriam, tussim efficit, & asperitas sola tunicæ subter il-
linientis intus asperā arteriam, tussim irritat. Quæ autem inter bibendum, uel comedendum incidunt, tussim mouent. Vermes quoq; in stomacho tumultū facientes, exiguas irritant tussiculas, succus quoque acutus stomachum perturbans, & quandam irritā-
tem qualitatem gutturi immittendo tussis facit ima-
ginem, uelut ex eis quæ stomachū lancinant & spu-
ta faciunt, nulla perturbatione asperam arteriā oc-
cupante, distemperantia quoq; frigida respirantiū
instrumentorum tussis causa est. Hi autem tussunt
mediocriter, & sine uiolentiā, eo modo ut nō solum
tenere possint & impedire tussim spiritū retinēdo,
sed etiam mederi ei sæpe numero, respirationis re-
tentione refrigeratas calefaciendo partes. Auxilia
nunc subiiciamus insistendo simplicibus medicami-
nibus. Indefinita igitur à ueterib; tradita remedia
sunt huiusmodi: Styrax potus, nucis ponticæ magni-
tudine tusses pacat, & distillationes, iuuatq; rauci-
tates. Ficus aridæ pingues madefactæ uino dulci cū
fuerint, uinum mixtum sorbendum dato, hoc nanq;
attenuat, & educit scindendo & colando. in spara-
ge

ge dulcedinem ut farinam, & dato ad sorbendum, facitq; ad $\alpha\iota\mu\alpha\tau\iota\sigma\tau\omicron\kappa\omicron\upsilon\varsigma$, id est, excreantes sanguinem. Aliud ad turbantes per noctem tusses. Menthe ramulus teratur et immittatur acetum cochleari quantitate, dato inde in cubili sorbendum, est autem facile concoquibile & bonū stomacho, & crassitudinem dissolvit. Ad tuſsim uetustam: Cumini, piperis, seminis urticæ ana. ʒ. mellis dispumati acetabulum, facito ut sint leuigatissima, sume inde & bulliant aliquantulum, inde reponere, ac utitor prebendo cochlearium. Aliud ad tuſsim probatum: Nucleorū pineorum frictorum, amyli, glycyrrhizæ, seminis urticæ ana. ʒ. 2. iris, piperis, hyssopi, seminis cartami, amygdalarum amararum ana ʒ. mellis egregie dispumati sume quantum satis, datoq; cochlearij quantitatem tuſsienti. Aliud probatū & facit ad catharos ingentes: Styracis, castorij, piperis, cardamomi ana ʒ. 3. opij, ziziphi, hyoscyami alb. sem. ana. ʒ. 4. sume dulce aliquod uinū et coquatur & facta ei ceris magnitudine dato dormito euntibus.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.



Cias quod tuſsis non accidit plurimū nisi ex humiditate quæ currit, & hæc quidē humiditas aut est desursum, aut uenit de ino

de inferioribus. Quæ autem est desursum, à cere-
bro est. Quæ ab inferioribus, est ex membris quæ
nutriunt aut ex membris respirantibus. Et accidit
quandoq; tuſſis absq; humiditate currente ad pe-
ctus, imò qui fit in gibbositate epatis, quoniam ipsa
impellit & opprimit uelamen. Et quando coarctatur
uelamen, coarctatur & pectus, & constringitur.
Et quando ambo coarctantur simul, accidit tuſ-
ſis, & fortasse accidit tuſſis absq; his duab. rebus,
ſcilicet quãdo ſentit canna pulmonis mordicationẽ
& aſperitatẽ, ſicut acetũ facit accidere tuſſim absq;
medio. Veruntamen quando aduenit canne pulmo-
nis ex eo aſperitas, accidit tuſſis, quoniã quando of-
fenderit uirtus in humiditatẽ, accidit ex eo tuſſis. Et
accidit tuſſis etiam ex malitia complexionis non re-
ctæ, & hæc eſt frigida, ſcilicet quando facit accide-
re tuſſim, quod eſt quoniã plurimũ non accidit niſi
ex humiditate. Cum ergo dixi quod tuſſis accidit ex
malitia cõplexionis non rectæ, non ſignificaui quod
hoc fit in mēbris pectoris, imò plurimũ fit in lacer-
tis qui ſunt in medio coſtarũ quatuor expansarum.
Et ex eis declaratur q̃ eſt uelocioris ſanationis. Et
quãdo ſentis anhelitũ, tunc poſſibilis eſt tibi ſignifi-
catio ſuper unamquãq; ſpecierũ tuſſis ſecũdum hãc
modum, quod eſt quia ſi accidit cauſa malitiæ cõple-
xionis

tionis, & si est ex caliditate, tunc qui habet eam
sentit inflammationem uehementem in instrumentis
anhelitus. Et accidit in facie rubedo, quam sequi-
tur uehemens sitis, & desiderant extinctionem, &
uiuatur uento uel attractione aeris frigidi, et quod
spuitur est decliue ad choleram in colore suo, &
suo sapore. Et si est ex frigiditate, tunc facies est
plumbea, & non sentitur illic caliditas, neq; sitis,
& non nocent eis res frigidae & conferunt calidae,
ita cognoscitur malicia complexionum simplicium.
Compositarum uero ex compositione harum sim-
plicium. Et compositio quæ cognoscitur cum mate-
ria simplici, cognoscitur ex multitudine eius quod
egreditur cum tussi, & ex eo quod sentitur ex gra-
uedine. Si autem calida aut frigida, tunc ex signifi-
cationibus quas diximus. Materiam autem quæ de-
scendit à capite cognoscimus per sonitum, & mor-
dicationem quæ accidit in uuula, & pulmonis cæ-
na. Isaac: Tussis est motus animatæ uirtutis &
naturalis iunctus secundum cursum naturæ circa in-
strumenta spiritus operantis ad expellendum super-
flua sibi nocentia, uirtus enim naturalis causa sui no-
cumenti instrumenta spiritus mouere incipit. Quod
cum per se expellere non possit, à uirtute animata
adiuari expetit, quia cartilagine pulmonis, &
M canales;

cānales, & lacerti pectoris inobedientes sunt uirtuti naturali. Si à uirtute animata moti lacerti pulmonis constricti ui, aërem expellendo à pulmone, coguntur expellere quæ naturali uirtute uidebantur nocere et obuiare. Nascitur tussis ex omni passione pectoris, uniuersaliter tamen ex mala complexionem calidam & frigidam, quæ instrumentis spiritus dominatur, uel ex materia mala quæ est intus uel extra. Auicenna: Tussis est ex motibus quibus expellit natura nocuentum a membro aliquo. Et tussis quidem pectori est sicut sternutatio cerebro. Et scias quod quandoque egreditur cum tussi res petrosa, similis ciceri aut gradini. Et tussis frequens plerumque perducit ad sputum sanguinis. Et scias quod res calidæ subtiliant materiam, & non expuitur. Et res frigidae sicut syrupus de papauere, & pulles, aggregant materiam ad spuendum, & cum superfluant congelant. Et syrupus hyssopi non est conueniens nisi cum queritur abstersio congregati grossi, ipse namque est abstersor bonus. Et rauedo cum accidit, accidit ab humiditate pauca & cum multiplicatur, parumper tremit, & si multiplicatur plurimum destruitur. Et ille qui sentit initium abscissionis uocis, oportet ut incipiat ad curandum antequam fortis fit. Rasis: Quando fit ex re descendente ex capite & commouente

commouente pulmonē, signum est, tussis sicca sine
sputo, & fit fortis propriē in nocte post somnum.
Cura eius est, ut detur in potu syrupus papaueris,
& gargarizet ante somnū, aquā decoctionis folio-
rum rosarū siccarū, et balaustiarū, et teneat in ore
suo has pilulas: Recip. Amyli, tragachanti, amygdala-
larū dul. excorticatarū, & fabarū excorticatarū,
sem. papaueris, & corticē eius, gūmi arabici, et bo-
li armenici. ana, cōficiantur cum muscilagine psy-
lij, et granorū citoniorū, et fiat ex eis quæ sint sicut
lupini, teneant in ore. Si non sufficit: Recip. Thuris,
mastiches partē 1. myrrhæ, opij, croci ana tertiam
partis 1. succi liqritiæ partē 1. fiāt pilulæ 6. pro 3.
et sumat ex eis in nocte à trib. pilul. ad 4. Cōfectio
pilularū de styrace ad tussim quæ inquietat in nocte
absq; calid. Rec. Myrrhæ, styracis, liqritiæ, opij ana
fiant pilulæ sicut cicer, & sumātur 3. in hora dor-
miēdi. Cōfectio pilul. quæ tenētur in ore: Succu liq-
ritiæ, piperis, sacchari ana formētur pilulæ. Cōfe-
ctio pilul. ad tussim quæ est cū febre: Succu liqritiæ,
uiol. ana 3. agarici, quarta 3. 1. fiant pilulæ. Cōfe-
ctio alia ad tussim siccā infestantē, & prohibet ca-
tarrhū calid. Opij, amyli, gūmi arab. succu liqritiæ,
papaueris ana, fiāt pilulæ sicut cicer, dosis ana 3.
3. ad 4. & sunt cōuenientes pueris quomunt ex ue-
hemētia tussis.

M 2 Ex

Extraditione autorum re-
centium.

Digerendo materiam facientem tussim,
siue fuerit calida siue frigida, diuersi-
modè procedimus. Aliquando ingrossa-
mus, aliquando subtiliamus, aliquando incidimus,
et aliquando abstergimus, et hoc secundum uarie-
tatem materie, uidelicet, si est calida et subtilis in-
grossabimus cum infrigidantibus, si grossa eam sub-
tiliamus, si uiscosa incidimus. Facilitatiuū sputi, tuf-
sis et anhelitus: Recip. Sacchari, uiolarum ℥. 1. se-
min. quatuor cōmunium maiorum frigidorum ana
℥. 1. sem. maluæ ℥. 1. s. passularum nigrarum par-
uarum transmarinarum, seminis coti ana ℥. 3. bu-
tyri ℥. 2. sebesten, pulparum ℥. 8. capillorum Ve-
neris ℥. 2. sem. lini ℥. 1. s. sem. fisticorum, granorū
pinarum ana ℥. 2. farine orobi, prassij ana ℥. 1. s.
diatraganti frigidi ℥. 5. croci grana 3. syrupi de li-
quiritia quod sufficit ad omnia simul debite incor-
porandum pro electuario. Pistanda pistentur et
puluerizentur puluerizāda omnia seorsum et dif-
formiter, ut decet secundum canonem, deinde ex o-
mnibus simul mixtis totum redigatur in formā ele-
ctuarij. Tussim mitigans, sputum adiuuans, et
catarrhum sistens: Recip. Diatraganti descriptione
Nicol.

Nicol. 3. 2. boli armeni 3. 1. diatragantum pistetur, bolus armenus puluerizetur, deinde ex omnibus simul mixtis cum syrupo de myrto fiat cōfectio mediocriter solida in mortario sine igne. istius teneat in ore ad quātitatem auellane tota nocte ter in hebdomada. Capupurgium catarrhum diuertens, ipsum per nares euacuans: Recip. Aquæ maioranæ 3. 2. hordei excorticati 3. 2. succi foliorum bliti 3. 1. sacchari candi puluerizati 3. 2. istius liquoris tepidi attrahat per nares cochlearia 3. successiue stomacho ieiuno per horam ante prādium, semel, aut bis in hebdomada. Aliud efficacius: Recip. Caputpurgium immediate superscriptum, mellis electi 3. 2. Si uult medicamen efficacius utatur ut supra. Aliud efficacius: Recip. Caputpurgium immediate superscriptum, mānæ electæ unc. 1. misce, fiat ut supra. Pilulæ Ioan. Damasceni: Recip. Citoniorum, cucumeris, amygdalarum dulcium, fabarū, sem. maluæ ana 3. 8. gūmi tragachati arabici ana 3. 3. fac puluerem tempera cum musci lagine psyllij, fac pilulas in modū fabæ. Et si ex uigilijs tußim patitur, adde semen lactuæ & papaueris 3. 4. uel 5. Syrupus de iuiubis ualens: Recip. iuiubas centum, liquiritiæ 3. 20. capillorū ueneris, uiolar. sem. maluæ ana 3. 10. sem. citoniorū, M 3 papaueris,

papaueris, lactucæ, tragachanti, hordei mundi ana
 drach. 6. penidiarum, & sacchari ana lib. 2. fiat
 syrupus. Syrupus de hyssopo ad tuſſim cholericam
 & dolorem laterum: Recip. Radicum foeniculi, li
 quiritiæ ana drachmas decem, hyssopi, capillorum
 Veneris, seminis citoniorum, tragachanti, maluæ
 ana drachmas 4. hordei mundati drach. 5. iuuba-
 rum 25. uuæ passæ mundæ unc. 1. ficus 6. & fac
 syrupum. Vngatur pectus cum cera alba, oleo ui-
 lato, butyro, uel ex succis herbarum frigidarum,
 & ungulæ caballinæ, albumine oui, lacte in oleo ui-
 lato, butyro & cera. Confectio diacimini Ale-
 xandri contra frigidam tuſſim: Recip. zingiberis
 drach 4. cimini drach. 2. cinnamomi scrup. 2. ga-
 riophylorum, nucis moschatæ, macis, folij, spicæ,
 galangæ, piperis longi, cardamomi ana scrup. 2.
 s. musci scrup. 1. mellis lib. 1. Confectio diacimi-
 ni preciosi: Recip. Cinnamomi 3. 2. gariophylorū,
 ligni aloës, macis, nucis moschatæ, galangæ ana
 drach. 1. s. cimini scrup. 2. ambre scrupulum u-
 num, musci grana decem, sacchari lib. 4. fiat syru-
 pus ex aqua rosarum, & eo cōficiatur,
 admoto cimino & di-
 ambra.

Dephthisi

De phthisi & peripneumonia.

Cap. III.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Phtisis exulceratio pulmonis appellatur, cum tabe et extenuatione totius corporis, ac sanguinis excreatione, et est tabescere consumi, et phthysis sputū dicitur. Pneumonia siue peripneumonia seu corrupto uocabulo peripleumonia, est inflammatio pulmonis ex uarijs causis, uel ex destillatione uehementi, uel suspirio, uel pleuritide proueniens, & dicuntur ἀπὸ τοῦ πνεύμονος, id est, à pulmone, πνεύμων enim latine pulmo dicitur. inde πνευμονικοί & περιπνευμονικοί qui latine pulmonarij dici possunt, & ut Firmicus dicit in tertio Matheseos: Si Saturnus in domo Lunæ fuerit inuentus, si fuerit nocturna genitura, & minuta fuerit Luna luminibus & dominū decreuerit, facit peripleumonicos, hydro, picos, podagricos, caducos, spasmaticos, &c. Tu autem corrigens non pleumonicos, sed pneumonicos legito. Plinius: Mellis quidem natura talis est, ut putrescere corpora non sinat, faucibus, tonsillis, anginae, cibusque oris desiderijs utilissimum, arescentique in febribus linguae, iam uero peripneumonicis, pleureticisque decoctū.

M 4 Et à

Et à Colamella in rebus rusticis. Ovis pulmonaria
dicitur, cuius pulmo afficitur, illi apostema dicunt,
nos abscessum corporis, Græci φθίσις, nos tabem,
illi σπασμὸς, nos nervorum rigorem, illi τέτα-
νος, nos nervorum distentionem. Peripneumonia
igitur est difficultas spirandi quādo à pulmone pro-
cedit. Eius morbi hæc est conditio: Pulmo totus affi-
citur, nunc casum eius subsequitur tussis, bilem uel
pus trahens præcordiorum, totiusq; pectoris graui-
tas, spiritus difficultas, magnæ febres, continua uia-
gilia, cibi fastidiū, tabes. In cura peripneumoniæ u-
tere ecligmatis, quæ memorantur in pleureticis om-
nisq; uiculus peripneumonicorū sit qui pleuretico-
rum & purulentiorū. Thorax ipsorum tegatur la-
na cum oleo, & nitro, & cerato, tegito thoraca et
latera rutaceo, uel cyperino oleo, quæ habeat irim-
aridam inspersam, & ex cera & terebinthina, &
medulla ceruina, & hyssopo humido, butyro &
irino, dissolutissima epithema adhibeatur, sintq;
æqualium omnia partium. Cibus autem sit tenuans
ptisanam coquendo, uel origanum, hyssopum pau-
cum immittendo, potum uero paucum quantitate,
malum enim pulmoni humor, sub lingua uero da-
to mel cōtinendum immisso in ipsum hyssopo inter-
coquendum & calamitate dissolutissima. Phthisis
(ut dictum

(ut dictum iam est) propriè exulceratio est pulmo-
nis, sanguinis consequens corruptiones cum reten-
ta sanguinis eruptione, etiam in purulentis, & per-
ripneumonicis. Estq; aliquando morborum pleu-
reticorum difficilimum remedium, scilicet, cum
in pulmone sunt hulcerata, neq; enim curari pos-
sunt nisi absit tussis, quia tuſſiendo ulcera disrum-
puntur malaq; redeunt, sparsis nanq; à tuſſi arden-
tibus, secundo rursus consequendus est ardor, rur-
susq; periculose pus repurgatur ex tuſſi, proinde
ex cunctis cõparatur curatu non facile, neq; possũt
medicamina hulceri aduenire, priusquàm in uen-
tre fuerint alterata, quodq; pulmo respiratu per-
petuo mouetur, & tuſſi diuellitur. Ecligma phthi-
sicos cõgruit huiusmodi: Mellis optimi libra, uuarũ
pinguium demptis uinaceis unc. 2. croci, iris, hyo-
scyami seminis, tragachate ana 3. 3. styracis flami
uncia, nucleorum pineorum 3. 6. amyli 3. cochlea-
rium dato ieiuno. Aliud probatum: Succum fœ-
niculi cum melle æquali diu coquendo immitte in
acetabulum unum, croci 3. rheupontici 3. 2. aliquã
do etiam hypocistidis 3. quod si fuerit circa gut-
tur asperitas, immitte etiam glycyrrizæ 3. 2. dato
cochlearium post cibum. Ad phthysicos purulentos
inueteratasq; tuſſes, purgat & obducit cicatricem:

M S Amygdala-

amygdalarū amararum, dempto cortice, ℥. 2. ovi
 bi 3. 4. hyssopi ℥. 3. s. iris ℥. 3. amyli ℥. 2. papa-
 ueris, panacis radicis, croci ana 3. 6. omphacij suc-
 ci aridi 3. 4. nucleorum pineorum frictorum ℥. 2.
 mellis despumati lb. aceti ℥. orobinum aspergatur
 aceto die 1. & coquatur, dato cochleariū 1. ieiuno.

Quid de hoc Pœni & Arabes
 sentiant.

Phthisis est cōsumptio humectationis cor-
 poris, & mutatio augmentationis in di-
 minutionē. Nascitur enim multis modis,
 uel ex cōsumptione pulmōis, & hæc est certa phthi-
 sis, quæ fit tribus modis, uel ex humoribus choleri-
 cis à capite descendētibz, siue phlegmaticis & ni-
 trosis, & salis in substantia pulmonis existentibus,
 uulnerantibus eum & putrefacientibus. Secundus
 modus est ex quibusdam passionibus in substantia
 pulmonis nascentibus, hoc genus antecedit sangui-
 nis screatus, ex uenis aliquorum instrumentorum
 ruptis in pulmone, in qua fissura nascuntur uulne-
 ra, fit & phthisis postea. Tertius modus est
 ex humoribus ad pulmonem aliunde quàm à capi-
 te currentibus, quod duobus modis contingit, uel
 ex mutatione uicinarum locorum, sicut in pleuresi,
 squinantia, uel ex alijs locis nō uicinis, sicut epate,
 corde,

corde, & similibus. Humores hi si calidi & acuti sint, patitur infirmus ruborem in maxillis, stricturam faciens sitim, febris quiescit in trahendo aërem frigidiorē. Si apostema peripleumonice sit de phlegmate salso, strictus & angustus est anhelitus cum gravitate, neque dolorem sentit, pulmo enim non habet nervum, unde perfectum habeat sensum, sed tamen tuſim cum parvitate anhelitus, ſcreant in tuſi cum apostema eruperit, et tunc tandem apostema certificatur, & febris adest & etiam corpus minuitur, unguis inclinatur, maxillæ rubent. Quæ omnia pulmonis uulnera designant, unde phthisis est. Discordant medici in uulneribus pulmonis. Alij incurabilia fatentur. Galenus tamen sic testatur: Si quis peripneumonicis uult succurrere, succurrat antequam apostema marcescat & putrescat, & sanabitur apostema. Si quis tandiu negligat quo ad saniem putridam uulnera colligant, sunt incurabilia, omne enim uulnus difficulter curatur nisi mundetur, mundari non potest nisi per tuſim, tuſis inimica est solidando uulneri, dilatat enim & aperit, unde magis putredines colligit, cum enim partim purgat, & partim colligat, insanabile reddit apostema, dum ita circumeat. Serapio: Complexiones quæ

que hanc uelociter recipiunt ægritudinem, scilicet, phthisin secundum quod antiqui dixerunt, sunt complexiones eorum quorum pectora sunt stricta, quibus non est cōcavitas ita quod sint spatulæ illorum strictæ, denudatæ à carne, et eminentes retro sicut alæ, quapropter nominantur alati. Et similiter illis corporibus, quorum capita implentur uaporibus, et perducunt eos ad instrumenta anhelitus, et paratur phthisis, quod si aggregantur in ea due proprietates, scilicet, malicia complexionis pectoris, et debilitas capitis, est illud plus præparatum ad dispositionem phthisis. Et suscipiunt etiam phthisim corpora illa quorum colla sunt longa, et quorum gulæ sunt eminentes, et quorum pectora sunt stricta. Et non accidit huiusmodi ægritudo illis, quorum spatulæ sunt conformes pectoribus eorum, non annexæ cum eis, et sunt carnes eorum et ossa ipsorum grossa, et non sunt gulæ ipsorum eminentes nisi raro, ita quod non accidit eis sputum sanguinis, nisi per accidens necessarium. Auicenna: De lactibus magis conueniens est lac mulieris suctum ex mamilla, deinde lac asinarum et lac caprarum, et lac equinum, sed non est ei conglutinatio secundum quod existimo, in lacte autem ouino et uaccino est grossitudo. Oportet ex asinabus ut eligantur illæ
quæ

que à partu elōgate sunt quatuor aut quinque men-
sibus. in lacte autem caprino melius est ut misceatur
cum recenti mulso aliquid aquae, & igniantur
lapides et projiciantur in ipsum multotiens donec
coquatur, & auferatur eius aquositas, & est meli-
or decoctio quàm decoctio super ignem. Et melius
est, ut comedant carnes auium assatas, ut sint uehe-
mentioris exiccationis & incarnationis. Et si non
timerem dici mendax, narrarem mirabilia, & re-
ferrem summam sacchari rosati, qua usa est mulier
phthisica: Nam dum ad ipsam qui perueniret ad
mortem & uocaretur, prepararent ea quae morti
necessaria sunt, quidā frater eius curauit eam hac
cura & reuixit, & curata est & impinguata, &
non est possibile ut dicam summam eius quod co-
medit de saccharo rosato. Rasis: Phthisis fit aut
post pleuresin, aut post sputum sanguinis, aut post
corizam & catarrhum plurimū ex capite, aut post
tussim longam. Peripneumonia est phlegmatica se-
cundum plurimum, & quandoq; est sanguinea, &
etiam cholericā, sed raro, & accidit ab apostema-
te, quod est in pulmone. Serapio: Cura, sedatur
caliditas paulatim, & confert sorbitio facta cum
aqua hordei, & est hordeum sine cortice cum mel-
le et amygdalis amaris. Et quando incipit sputum,
confert

confert iterum decoctio hyssopi, in qua decoquantur radices lilij coelestis, et ad ultimū res quæ cōueniunt huic ægritudini. Non est enim nisi phlegmon pulmonis. Phlegmon autem non est nisi apostema calidum, & secundum plurimum non est nisi successione catarrhorum antiquorum, aut squinantiarum pleuresis, aut ægritudinis alterius quæ sit sicut istæ. Et fortasse colligitur hæc materia in pulmone ipso absq; his ægritudinibus prædictis.

Neoterícorum de hoc morbo sententia.



Vandoq; fit phthisis ex calore substantiam pulmonis dissolvente, unde sequitur fissura, ut uidemus in æstate in terra arefacta. Item fit etiam aliquando ex frigiditate uel siccitate pulmonis, uel totius corporis, nimia enim cōstrictio per accidens rumpit partes & discontinuat. Item aliquādo ulceratur pulmo ex reumaticis falsis uel amaris, uel acutis, quæ à capite ad ipsum descēdunt, uel etiam ex stillicidio, & ex diuturna percussione, ut uidemus exterius in lapide, quod gutta cauat lapidem non bis, sed sæpe cadendo. Item aliquando fit ex retentione menstruorum uel hæmorrhoidarum, unde malus sanguis corrosiuus

siuus uel putrefactus ad pulmonem manatur, unde pulmo ulceratur, nunquam enim est uera phthisis nisi pulmo ulceretur, hoc idem etiam fit ex apostemate pulmonis uel lateris, uel alterius male discurfionis, uel etiam à squinantia malè sanata. Sanies enim in his generata, si ad pulmonem mandetur, & longam moram ibi faciat, sui acumine pulmonem ulcerat. Ex causis etiam primitiuis exterioribus phthisis aliquando causatur, ut est percussio, casus, malus aer, fumus, uel puluis acutus cum aère attractus, ut contingit quod metallorum fusores, & liquefactores uel fossiores argenti phthisim incurrunt et pallidū colorem. Quia ergo phthisis est consumptio quæ ex ulcere pulmonis causatur, idcirco de eius cura est primo uidendum, hoc prænotato quod in ulcere pulmonis medicando medici dissentunt. Quidam enim dixerunt quod ulcera pulmonis impossibile est curari, quia in curatione indigent consolidatione, consolidatio quiete, quies autem impossibilis est in pulmone. Galenus uero distinxit dicēs: Quod si in pulmone nulla sit discontinuitas, absque corrosione uel substantie deperditione, & quod pars pulmonis mūdicata cōuersa sit insaniē, tūc possibile est curari. Sed si ulcus sit saniosum, nō est possibile ut sanetur.

Vlcera

Vlcera tamen pectoris uel pulmonis in partibus
carnosis bene possunt sanari, licet facta fuerit sa-
niosa. In hulcere pulmonis non sanioso, possibi-
lis est cura. Signa autem phthisis sunt paulatina
corporis extenuatio, & febris lenta inseparabilis
cum proiectione saniei foetentis, & unguium gib-
bositas, & color plumbeus, & cum citrinitate frō-
tis & genarum, & cum pustulis in tibijs, & saliuā
salsa & amara, casus capillorum, & rugitus uen-
tris, & tussis. Et dicit Auicenna: Quod si apparet
pustula super spatulas eius ad modum fabae, mori-
tur post 40. dies. Solutium materierum cōmu-
nium ab intestinis & lenitiuū eorum: Recip. Olei
communis unc. 10. uitellos ouorum numero 2. sa-
lis 3. 1. misce detur per inferius. Solutium fa-
cilimum: Recip. Mannae unc. 2. brodij pulli macri
quod sufficit ad eius dissolutionem. Digestiuum:
Recip. Iulep uiolarum unc. 1. s. aquae decoctiōis ex
corticatae liquiritiae unc. 2. Hoc assumat in aurora
diebus 6. continuis post solutium. Solutium fa-
cilimum: Recip. Solutium ex māna superscriptū,
hoc sumat. modis dictis post completam sumpti-
onem digestiui superscripti, die tertia. Vtas-
tur diatragachāto descriptione Nicolai. Item fiant
fricationes in brachijs a cubito infra, & cruribus
à genit

à genu infra mane cum surgit, prius tamen habito
uentris beneficio. Confectio pulmonis lenitiua: Re-
cip. Diamyli ℥. 6. seminum cōmunium maiorū fri-
gidorum ℥. s. misce & fiat confectio sine igne me-
diocriter solida in mortario de ℥. 3. pro quolibet as-
sumet unum morsellum mane, deinde stet ieiunus
tribus horis. Digestiuū aliud efficacius primo: Re-
cip. Syrupi de liquiritia ℥. 1. iulep uiol. ℥. s. aquarū,
hordei excorticati, ungulæ caballinæ ana. ℥. s. istud
digestiuum assumat calidum in aurora. Solutiuum
facile efficacius priori: Recip. Pil. de hiera simplici
℥. 2. agarici ℥. 1. salis gemmæ granum. 1. uiol. pul-
uerizatarum ℥. 1. misce & cum iulep uiol. fiant pi-
lul. 5. pro ℥. 3. sumat in aurora ℥. 1. Electuarium pe-
ctoris confortatium: Recip. Pul. specierum diarho-
don ℥. 1. seminum quatuor frigidorum maiorum ℥.
1. sachari dissoluti in aqua, ungulæ caballinæ quod
sufficit, fiat electuarium assumat ℥. s. mane, & po-
stea ieiunet horis tribus. Confectio pectoris leniti-
ua: Recip. Diatragachati ℥. 1. papaueris albi ℥. s. mi-
sce, & cū syrupo de liquiritia fiat confectio in mor-
tario cum pistello sine igne, & teneat frustum isti-
us confectionis in ore inter genam & maxillam in
nocte. Mundificatio ulceris & consolidatio fit cum
usu istius syrupi: Recip. Liquiritiæ mundæ ℥. 3. pas-
sula

N

sula

sularū, hordei mundi, capillorum ueneris ana. unc.
 1. s. papaueris albi unc. s. arnoglossæ. M. 1. sachari
 lib. 1. fiat syrupus dosis unc. 1. s. Ad eandem inten-
 tionem fiat istud: Recip. Căcroŭ fluuiialium lotorū
 secundum artem unc. 2. iuiubarum 20. numero, pas-
 sularum, liquiritiæ ana. unc. 1. capillorum ueneris,
 lingue canis, arnoglossæ, uirgæ pastoris ana. unc. 1.
 bulliāt in aqua sufficiēti usq; ad consumptionē dua-
 rum partiū, & ex decoctione accipiantur unc. 8. ad-
 datur sachari, syrupi de papauere ana. unc. 3. redu-
 catur usq; ad spissitudinem mellis, deinde addatur
 sem. cucurbitæ, gummi arabici, tragachanti ana. 3.
 6. sem. portulacæ, amygdalarum dulcium, sem. cito-
 niorum, sem. papaueris albi ana. unc. s. incorporen-
 tur omnia simul bona mixtiōe, dosis sit cochlear us-
 num paruum sero quando uadit dormitum sumat
 lambendo. Diuersio catarrhi fiat cum appositione
 huius pulueris ad caput: Recip. Calamenti, cortici
 citri, ana. 3. 2. gariophyllorum. 3. 1. fiat puluis sub-
 tilis in sacculo paruo, & ex panno raro, & calefi-
 at super tegulam aspersam uino incensam taliter
 quod sacculus non madesiat, ponatur super caput
 & teneatur quotidie, nisi affe- rat tedium, & illud
 est diuersium leue catarrhi à quo incipimus. Pro-
 hibitium impressiōis eius in pulmone: Recip. pul-
 monis

monis uulpis, aquæ rosarum in qua bullierit parū,
 granorum myrtillorum, uidelicet lib. i. aquæ rosa-
 rum unc. s. post myrtillorum lauationem diuidatur
 in frusta parua, & exiccetur in loco calido, & non
 sub sole, post exiccationem puluerizetur, & con-
 gregetur cum æquali parte sachari albi, & sumat
 de hoc cochlear unū paruum de quarto in quartū,
 & mane tempestiue bibat cum eo parum aquæ sa-
 chari, uel parum uini limphati secundum quod ap-
 paret ex desiderio eius & abominatione eius, &
 eo mane quo sumit, non sumat syrupum. Electuariū
 restauratiuum: Recip. Liquiritiæ rasæ mundæ, rosa-
 rum ana. 3. 2. tragachanti, gūmi arabici ana. unc.
 i. santalorum alborum & rub. ana. 3. 6. sem. papa-
 ueris albi unc. s. berberorum unc. i. passularū unc.
 s. succi liquiritiæ, amygdalarum dulcium mundata-
 rum, sem. lactucæ, scariolæ ana. unc. i. gariophyl. 3.
 1. pœnidiarum unc. 2. cinnamomi unc. s. storacis 3.
 2. croci 3. 1. sem. citrulli, melonis, cucu- bitæ, cucu-
 meris mundatorum ana. unc. 2. sem. maluæ unc. i.
 uiolarum unc. s. pulpæ unius testudinis, & cum suf-
 ficienti quantitate sachari fiat electuarium. Cura
 peripneumoniz est quasi eadem cum cura pleure-
 sis, sed quæ sit differentia uide Auicennam & Ra-
 sim & Serapionem.

De sputo sanguinis, hæmoptoica passione & empyemate. Cap. IIII.

Iuxta traditionem Græcorum & Latinorum.



A ἡμὸν τῦσις, id est, sanguinis spuitio, inde αἱμὸν τῦσικὸι sanguinē spuentes, quos aliqui αἱμὸν τοῖνουσ appellat. Ex thorace enim & pulmone uel aspera arteria sanguinem expuimus, omnino cum tussi respuitur. Si uerò ex eis locis quæ circa fauces, uel gurgulionem, feratur sanguis, excreando exernitur. Sin uerò, ex aliquo oris loco, uel omnino ex gingiuis. Est etiā quando ex capite, uel partibus, quæ circa gurgulionem, defertur sanguis & gutturi intercudit, tuſsimq; cit, uideturq; ex thorace eijci. Si quis igitur excreat & emungit sanguinem pluribus consequentibus diebus, neque ullus sit capitis dolor, uel grauitas, uel præsens uel præterita, neq; percussione ibidem facta, considerare conuenit eius meatum sanguinis totum pensiculatè, locumq; illum oris, unde è palato in narem descenditur. Quæ uero medicamina composita ueteres medici tradiderunt peculiaria, hæc serè. Potio sanguinem eijcientibus: Coralli lapidis, terræ asteris, electri, mastiches ana. drachm. 6. amyli, thuris, gūmi, ana. drachmas 4. da cochlearium aridum cum oxycrato. Aliud multum probatum

tum testimonio multo: Libani, hoc est thuris, terræ
 asteris ana. drachmas 8. croci drachma, amyli dra-
 chma, arnoglossi succi aridi drachma, & scindena-
 do, & colando da cochlearium cum oxycrato. Ali-
 ud Andromachi: Coralli fricti drachma, libani obo-
 li. 4. acatiæ drachma, balauftiarum oboli. 5. gummi
 oboli. 2. ouorum duorum albumina, horum partem
 quartam dato cum aqua cyathum & dimidium. A-
 liud probatum experientia: Coralli drachmæ 8. li-
 bani drachmæ 7. dato cochlearium cum uino myr-
 teto mixto, facitq; ad fluxum muliebrem. Pastil-
 lus Dosithei admodum probatus: Ruborum ramu-
 lorum uncia. 2. symphiti radices, achates Aegyptiæ
 fructus, hypocystidis succi, lycij, opij, thuris, rheupō-
 tici, terræ asteris ana uncia. 2. rhu magirici uncia. 3.
 rosarum aridarum drachmæ 4. sume cum succo ar-
 noglossi myrtorū uncias 5. croci, lenæ sigillatæ, ma-
 ceris corticis sume, uel uinū scybeliotæ, facitoq; pa-
 stillos, datoq; cū decoctione symphiti, uel polygoni.
 Cū uero institerit sanguis illinito pectus, uel fluitan-
 tes partes aceto omphacio dissoluto & tepesacto.
Ex traditione Pœnorum & Arabum.



Anguis qui ascendit ad os, alius est cui-
 ius ascensio fit ex partibus uentris & sto-
 machi, & alius ex instrumētis anhelitus,

Et alius qui descendit à capite Et palato. Et discernitur inter istas species per sensum dolorum Et locum eius Et dispositionem ascensionis sanguinis ipsius. Quod est quia sanguis qui ascendit à stomacho Et partibus uentris, non fit ascensio, nisi causa uomitus cum dolore ipsius loci. Et qui ascendit ex instrumentis anhelitus, non ascendit nisi cum tussi Et dolore instrumentorum anhelitus. Et ille qui descendit ex palato, cum rascatione. Et ille qui ascendit ex membris anhelitus, aut ex pulmone, aut ex pectore, uerumtamen ille qui ascendit ex pectore, est niger congelatus, Et ille qui ascendit ex pulmone, si est ex ulcere in carne pulmonis, scilicet ex sanie calida quæ ulcerauit carnem pulmonis, Et non fit adhuc sanies, est sanguis spumofus decliuis ad albedinem, quæ propter eius malitia est magna, quoniam sequitur eum sputum saniei et phthisis. Et si eius ascensio est propter lationem uenarum quæ sunt in pulmone ipso, est clarus, subtilis, calidus. Venarum autem egritudines sunt eruptio, corrosio, et apertio. Auicenna: In sputo sanguinis quod est ex pectore, non est tantum timoris quantum est in eo quod est ex pulmone, illud enim quod est ex pectore sanatur uelociter, Et si non sanatur, non habet malitiã
ulce

ulcerum pulmonis. Sputum sanguinis multiplicatur in illis qui rixantur ab omni re. Et caseus antiquus est nocius eis, recens uero confert. Et quandoq; est eis conueniens ut in potu sumant acetum mixtum cum aqua. Gummi enim prohibet sanguinis cursum, & mundificat partes pectoris & pulmonis ex sanguine si retinetur in ipso, quare non congelatur. Et ex rebus expertis in abscindendo iterationem sputi sanguinis, est masticatio portulacæ & deglutitio aquæ ipsius. *saac*: Medicando sanguinem scrcanti, oportet quietem iniungi, neque multum flatum emittat. Quod si sit uirtuosus, & temperatū sit tempus, ætas conueniens, basilica erit incidenda, & bis uel ter erit minuendus sanguis quoad totam superfluitatem exisse comperiamus, & in latere illo, nisi erit dolor, de uena quæ inter auricularem & medicū est minuatur, & de eiusdē lateris basilica. Extractio aut sanguinis sit quantū sufficiat. *Rasis*: Et in curatione quidem eius qui egreditur cum rascatione & sonitu sibi simili facili, & paruo si est parue quantitatis, sufficit gargarismus ex reb. stipticis, sicut qui sit ex aqua rosarū in qua infusum est sumach aut rob agreste, aut aqua citoniorū et similib. Si est plurimæ quātitatis, tūc oportet ut phlebotometur cephalica, deinde gargarizetur cū

N 4

istis

istis rebus. Si autem in loco oris fuerit ulcus recēs,
immiscentur super ipsum thus & sanguis draco-
nis, & teneat in ore aquam rosaceam, in qua bullie-
rint cupulæ glandium, aut semen tamarisci. Et si fu-
erit ulcus malum putridum, curet curatione chole-
ræ putridæ, & consideretur sanguis qui egreditur
in uomitu, & si fuerit plurimus, aut assiduet pluri-
bus diebus, phlebotometur basilica, deinde come-
dat res stipticas, & glutinationes facientes paula-
tim una uice post aliam, & proprie si æger inuene-
rit dolorem inter utraq; scapulas, tunc oportet ut
traijciat aquam citoniorum acetosorum in qua dis-
solutum sit aliquid thuris uicibus pluribus, & co-
medat ex glandibus & passis cum suis interiori-
bus, & agresta & sumach, & bibat de hoc medica-
mine: Recip. Boli armeni, gūmi arabici, balaustiarū,
sang. draconis, thuris ana. detur in potu cū aqua ci-
toniorū, aut cum aqua malorum, & deuitet omne
calidum & acutum. Et sit quidem egressio sangui-
nis ex pectore & pulmone cum tussi, & ille qui
est ex pulmone, est multotiens cum tussi parua. Et
ille qui est ex pectore, est parum cum tussi plurima.
Sit ergo plurimum studij tui in hac tussi, est enim ti-
morosa perducens in pluribus dispositionibus ad
phthisim. incipe ergo à phlebotomia, deinde da in
potu

potu hoc medicamē. Recip. Thuris, sang. draconis
ana partem. i. endiuia, charabæ ana. partem. s. he-
matitis, terræ sigillatæ ana. partē. i. s. aluminis, ba-
laustiarū duas tertias partis. i. dentur ex eo in po-
tu drach. 3. cū pondere cherat unius opij & cherat
sem. hyoscyami, cinnamomi tertia drach. i. aut spi-
cæ, aut costi, aut myrrhæ, & gargarizet cum aceto,
& aqua rosarum in matutinis & uesperis, & si in
ueneris in pectore dolorem cum sputo sanguinis,
tunc line locum doloris hoc medicamine cuius nar-
ratio præcessit, & da ei ex ipso in potu postquam
confeceris ipsum cum uino.

Ex traditione autorum recentium.

Aquoniam loquor est electio sanguinis per os, &
fit per sputū uel sreatum: Per sputum,
cum tussi educitur, & à pectore: per sreatū
aut à capite & stomacho educitur. Electio spu-
ti sanguinei uel est à pectore, uel eius adiacentibus
membris. A pectore, ut ex uulneribus pulmonis, uel
diaphragmatis, uel ex apertione uenarum pectoris
uel membrorum sui. Apertio tripliciter fit, uel ex
multitudine, quia est plenitudo in uasis, quoniā ne-
queunt continere unde crepant, & finduntur in
exitu, & fluit sanguis multus & subito. Vnde est
plenitudo corporis et rubor et uenarum grossities,

N S &

Et uocatur ῥίγξις. Aut ex acumine humoris corrode-
 tis Et soluentis continuationem ut est cholerae, Et
 phlegmatis falsi Et similia, Et paulatim fluit, Et
 color portendit admixtionem materie quae coniungi-
 tur sanguini, Et uocatur δ'ία βροχίς. Aut est ex de-
 bilitate sanguinis poros uenarum aperiētis, quare
 resudat extra ad modum roris Et paulatinē. Et sig-
 num ipsius est rubedo Et claritas in colore, Et uoca-
 tur ἀντρασεμία. Item apertio uenarum est aut
 ex fortitudine expulsiuae, aut defectione cōtētiuae,
 ut oris uenarū. Expulsio confortatur in humoribus
 acutis et pungentib. Et falsis. Defectio contentiuae
 est ex mollitie oris uenarum Et rarefactione earū.
 Electio sanguinis per sreatū, aut ex cerebro ut in
 catarrho et uua, aut stomacho et epate, uel splene,
 uel chily uena, uel matrice, uel hemorrhoidē, uel re-
 dūdat ad superiora, sed talis raro accidit nisi ex cri-
 si, Et tunc non debet medicari nisi cū superfluit. Et
 quādo est ex uenis cerebri, totū corpus est graue, et
 omnes sensus debiliores maximē in horis nocturnis
 Et frigido tēpore, Et uenit cum rascatione et rubo-
 re faciei. Et quādo exit à stomacho, dolorē facit cir-
 ca precordia Et os stomachi, Et adest fastidium et
 indigestio. Et quādo est ab epate, est dolor dextrae
 partis. Si à splene, sinistrae. Si à chily uena, dolor spi-
 nae.

ne. A mēstruis, inferius. Si est à pulmone, cum tuſſi educitur & est ſpumofum. Igitur à pectore, in alijs locis ſi nō est ſpumofum. Si est à diaphragmate, cum tuſſi laborioſa educitur, & est aliquantulum ſpumofum. Ruptura uena um aliquando est interior aliquando exterior. Exterior ſit uel ex uulneribus, uel ex diſtentionibus, aut ex percuſſionibus & caſibus. Diſtentionibus uel ex ſaltu, uel ex nimijs clamoribus, uel compreſſionibus. Quando autem est ex cauſa interiore & erit ſepe et multum, prior est ceteris. Volenti ergo medicari, ab eiectione ſanguinis incipiat. Oportet ut caueat ab ira, coitu, uigijs, ieiunio, acetosis, ſaliſis, acutis, & præcipue ciminio, calefactione nimia, ſomno, & maxime proſundo, balneis & exercitijs corporis, & ſolitudinib. & curis, è quibus caleſcit ſpiritus & prorumpit ad exteriora. Fiat iſte ſyrupus de quo ſumat omni mane ʒ. i. ſ. cum aqua extinctionis ferri. Recip. Virgæ paſtoris, arnogloſſæ ana. M. i. conſolidæ maioris. M. s. roſarum rub. ſeminis papaueris albi, liquiritiæ, paſſularum parum torrefactarum ana. ʒ. i. fiſticorum, ſeminis portulacæ, ana. ʒ. 7. ſachari albi ʒ. 8. fiat ſyrupus. Sero quando uadit dormitum ſumat ʒ. i. huius mixtionis: Recip. Aquæ roſarum, aquæ diſtillationis arnogloſſæ ana. lib. s. miſceantur, ſi uis

si uidetur quod febriat febre lenta, & quod procedat in extenuatione, uidetur mihi quod utatur hac mixtione: Recip. Diatragachati frigidi, diapienidiō, diapiapaueris, sachari rosati ana. ℥. s. corallorum rub. margaritarum ana. 3. 3. misceantur. Teneat in ore pilulas Auenzoar factas ex tragachanto, gummi arabico, & seminis citoniorum, rosarum, & terra sigillata, conficiatur cum syrupo liquiritiæ. Ponatur supra commissuram capitis sacculus de panano raro, in quo iste puluis sit: Recip. Gariophylorū, macis, corticum citri, calamenthi ana. 3. 2. Et si hoc non imprimit, fiat aliquod ruptorium leue. Si sanies intiperet apparere, oportet alia remedia facere, si poteris eam defendere à malignitate ulceris pulmonis, tunc poterit melius spūto sanguinis subueniri. Syrupus ex descriptione Isaac contra spūentem sanguinem: Recip. Succu arnoglossæ, succu cucurbitæ, cucumeris, citrullorū, aquæ rosarum ana. lib. 2. succu myrtillorum lib. 1. succu pirorum, citoniorum ana. lib. 1. coque donec fiat quasi sapa, deinde quidam addunt sachari quantum sufficit & syrupizāt. Alius contra fluxum sanguinis: Recip. Balaustiarū, rosarum, uirgæ pastoris, caudæ æquinæ, endiuie, plantaginis ana. M. 1. liquiritiæ rasæ ℥. s. seminum communium frigidorum, seminis portulacæ, seminis

nis papaueris albi ana. ʒ. 1. santalorum rub. spo=
dij ana. ʒ. 2. passularum ʒ. 1. epatis adib. ʒ. s. ex his
omnibus fiat decoctio, deinde accipe de prædicta
decoctione lib. 3. succi plantaginis unc. 4. uel aquæ
cuius unc. 6. fiat syrupus cum sacharo albo, & in fi=
ne decoctionis addatur puluis iste: Recip. Sanguis=
nis draconis, boli armeni, gūmi arabici, tragachanti
ana. ʒ. 2. misceantur cum eis. Syrupus alius contra
sputum sanguinis ex pectore: Recip. Epaticæ, lupu=
lorum, endiuie, arnoglossæ, capil. uen. ana. M. 1. li=
quiritiæ unc. 2. passularum, hordei mūdi, mellis a=
na. ʒ. 1. santalorum rub. berberorum, seminis pa=
paueris albi ana. unc. s. succi liquiritiæ, tragachanti
ana ʒ. 3. iuiubarū numero. 8. aquæ arnoglossæ unc.
3. sachari albi unc. 6. penidiarum unc. 4. fiat syru=
pus. Solutium facilimum: Recip. Casiæ fistulæ unc.
1. s. aquarum uiolarū, plantaginis ana. unc. 1. s. fiat
potio assumat in aurora, postea stet ieiunus horis.
4. Constrictium sanguinis, uenæ consolidatium,
& pectoris & pulmonis confortatium: Recip. Se=
minis althææ, boli armeni, corallorum rub. coriādro
rū præparatarū, succi plātaginis quod sufficit ad in
corporandū, puluerizanda puluerizētur formētur
pil. 7. pro. 3. assumat à tribus ad quinq; ad libitum
in aurora bis in hebdomada, mastice succum folio
runa

rum portulacæ crudæ. Aliud sanguinē sistēs: Recipi
Trochiscorū de terra sigillata, de charabe ana 3.
s. aquarū plātaginis, portulacæ ana 3. i. s. penidia-
rum 3. i. misce. Assumat in aurora frigidū præterq̃
tēpore hyemali, quo tēpore assumat calidū, stet po-
stca ieiunus horis 4. Præter sputum sanguinis, de
quo dictum est, aliquādo expuitur ab inferiori par-
te phlegma grossum, uiscosum, coagulatum, aliquā-
do sanies, quod utrūq; potest contingere propter
catarrhos ad inferiora descendentes, aut propter
malam in pectore materiam contentam, siue à mē-
bris alijs inferioribus ad spiritalia mandatam. In-
ter grossum phlegma & saniē per sputum educā
differentia est, quia sanies est foetida et uirulenta,
posita super aquā descendit ad fundum, & posita
in igne fortiter foetet. Phlegma uero natans super
aquam non foetet, siue in igne siue extra ignē, neq;
cum corporis consumptione est, sicut sanies. Sanies
uero sine infectione pulmonis & lēione & corro-
sione eius, aliquando est propter ulcera pectoris et
diaphragmatis, et aliorum panniculorū uel lacerto-
rum, uel pleuresin, uel peripneumoniā quæ in saniē
sunt cōuersa. Si aut propter ulcera sit pectoris, mi-
nus malū est, quia sunt in partib. carnosiss. et cito cō-
solidantur. In panniculosis uero partibus molestio-

ra

ra sunt. In pulmone uero ulcera, ualde mala sunt. Vbicunq; sit sanies in membris spiritualibus si pauca sit, cito cum sputo educitur, & præcipue si uirtus sit fortis. Si autem multa sit sanies & maximè cum uirtute debili, aliquando declinat ad stomachũ, & euomitur & euacuatur per inferiora. Aliquando declinat ad epar per uenam profundam, & si uersus gibbum, exit per urinam, & aliquando per alia membra, aliquando figitur in pectore & ibidẽ moratur, & conuersa ad pulmonem, ipsum corrodit & putrefacit, & phthisim inducit cum febre acuta uel ethica, uel minuta, quando in infirmo non est uirtus ad expellendum. Signum autem quia ad pulmonem corrodendũ sanies se conuertit, est tremor qui accidit in tuſſiendo cum rubedine maxillarum propter uapores calidos sursum eleuatos, & calefactio digitorũ cum lenta febre, & pustulis pedũ qui semper cõtینگūt. Minoratiuũ: Recip. Pil. de hiera simplici ʒ. 2. agarici ʒ. 1. salis gẽmæ gran. 1. misce et cũ syrupo de liqritia formẽtur pilulæ 7. p. 3. Digestiuũ: Recip. Syrupi de hyssopo ʒ. s. syrupi de liqritia aquarũ ameos ana. ʒ. 1. hordei excorticati ʒ. 2. misce. Eradicatiuũ: Recip. Casiæ fist. ʒ. 1. agarici albi ʒ. 2. salis gẽmæ gran. 1. aquarũ capil. ueneris ʒ. 1. hordei excorticati ʒ. 2. agaricus minutim incisus

incisus infundatur in dictis aquis per horas . 12. ad
 minus, deinde exprimatur & coletur, & colaturæ
 reliqua omnia addantur, et fiat potio, substantia a-
 garici prius abiecta. Electuarium digestium pecto-
 ris mundificatiuum: Recip. Electuarij diarrhodō ab-
 batis unc. 2. sem. cōmunium frigidorū maiorū unc.
 1. pulueris yreos, hyssopi siccae ana. ʒ. s. tragachan-
 ti ʒ. 1. mellis passularum ad Corinthios quod suffi-
 cit pro electuario misce. Confectio ad idem: Recip.
 Loch sani et expti, diaprassij, diatragachāti ana. ʒ.
 1. diaysopi ʒ. 3. misce & cum aqua capillorum ue-
 neris fiat confectio. Confectio screare faciens &
 prohibens uenæ pectoris, pulmonis & asperæ arte-
 riæ, aperturam: Recip: Boli armenici drach. 1. s. dia-
 tragachāti unc. 1. misce & cū syrupo de myrto fiat
 confectio solida in morsellis trium drach. Pilulæ ad
 idem: Recip. Gūmi arabici, tragachanti ana. drach.
 5. corallorum rubeorum, boli armeni ana. ʒ. 1. tro-
 chischorū de terra sigillata, sachari albi ana ʒ. 1. iu-
 lep uiol. quod sufficit, tragachantum, & gummi ara-
 bicum infundantur in dicto iulep donec sufficiēter
 molle fiant, deinde misce omnia et fiant pilulæ leni-
 ter pressæ. Confectio restaurans ad idē: Recip. Dia-
 myli unc. 6. corallorum rubeorum, boli armenici
 ana drach. 2. misce cum pistello & fiat confectio cū
 syru=

Syrupo citoniorum. Si apparet uestigium sanguinis & timor sit de apertura uenæ, aut esset aperta, tunc phlebotomia primo fit de saphena pedis dextri de qua trahantur unc. 2. sanguinis, aut fiat phlebotomia utriusque saphenæ quæ sunt infra talum pedum, seu infra clauiculas, ex quarum qualibet extrahatur unc. 1. sanguinis, deinde tertia die fiat phlebotomia brachij dextri de basilica hora tertiarum stomacho ieiuno, ex qua extrahatur unc. 3. aut 4. sanguinis. Cibi sint glutinatiui lenitiui. Euitet omnes res sanguinem mouentes, sicut sunt calefacientes aperitiuæ, potus uini plurimi, & propriè uinosi, saltus, clamores, rixas, anhelitus altos, locutionem plurimam, multitudinem balneationis, coitum, itinera, res rubeas, medicinas calefacientes et aperientes, sicut aloës, apium, caseum antiquum, sisymbrium.

De orthopnoëa & asthma
te. Cap. v.

Secundum doctrinam Græcorum &
Latinorum.



Asthma est cum difficultas spirandi uehementer est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit. Sed dum modica est, neq; ex toto strangulat δυσπνοια appellatur.

jur. Cum accessit id quoq; ne nisi recta ceruice spiritus trahatur ὀρθὸν νοῖα. Asthmaticum aliqui appellāt qui difficile respirat. Sicut igitur orthopnoeci, qui habēt difficultatem spirandi, ut nisi recta ceruice stent, spirare non possint. Est enim ὀρθὸν rectum, ἔν τῷ νόῳ, id est, spiro, quos Galeni interpretes, ἔ medici recentiores orthopnoicos corruptē enunciant, ἔ ipsum morbum corruptius orthomiam. Asthmatici sunt qui cum difficultate anhelitum ducunt. Ἀδμᾶ enim anhelitus anxietas dicitur, quos perperam recentiores asmaticos dicūt, ἔ asma morbum. Dyspnoeci qui spirandi difficultatem patiuntur, quos perperam recentiores dysnoicos ἔ dispnoicos uocāt, ἔ morbum dysnoiam uel dispnoiam. Dicta est autem ὀρθὸν νοῖα à δυς quæ partis cula in compositione malum seu difficultatem significat, et τῷ νόῳ uel τῷ νόῳ, id est, spiro, unde τῷ νόῳ, id est, spiritus, flatus uel anhelitus. De orthopnoea meminit Plin. lib. 27. cap. 12. Rhecoma herba sumitur epaticis, spleneticis, ischiadicis ad renum uitia, suspiria, orthopnoeas, arteriæ scabritias sanat. Videturq; Plin. suspiria generaliter alibi accipere pro omni difficultate spirandi. Inde latine generaliter suspiriosi, ἔ anhelatores accipiuntur pro illis, qui cum difficultate spirāt. Fit igitur angustia mea
tuum

tuum spiritus interna petentis, cum multitudo conferta humorum crassorum & glutinosorum impaeta fuerit pro obice spiritui, uel tumor aliquis apostematicus obstiterit, itidem uero dyspnoicis, et qui asperas habent arterias multo catarrho refertas, ex proximis locis fluxu in arterias affluente, fit morborum discrimē inter ipsos inuicem, manifesta de causa in sanos subito incidente catarrho, ut plurimum citra febrim, postq̃ comitantur propria catarrhi signa. Quod si tumor apostematicus in pulmone fuerit, fiat febris necesse est, ac non multo post mutato ardore pus cum tussi respuitur, quod si incōcoctum phyma fuerit, sicut medico euenit Antipatro in leui pulmonis arteria, hi pondus maximū non sentiunt, neq; ab orthopnoea tātum perturbantur. Qui uero propriē orthopnoici & dyspnoici sunt appellati ferē sunt sine febre, pōdusq; sentitur grauis, neq; purulentū respuūt. Si autē curandū tibi, scito cōmune quiddā esse in his affectionibus, & quiddā proprium, cōmune quidē ad consumēdam ac absumendā superfluam essentiā humiditatis morbos gignentis. Proprium glutinosorū & crassorū humorum essentiam detrahētis, tenuantibus & arefacientibus medicaminibus, quæ sanē communis est ratio ad omnia in intimo corporis apostemata,

uini autem potio ambobus cōgruit quod sit substan-
tia tenue, cunctis potus sit paucus qui lāguent apo-
stematē. Nam multus implet meatus glutinosis &
crassis humoribus. Nam abstergentia huiusmodi hu-
mores medicamina, tusses quatiant necesse est, nō
facile autem respuitur ob crassitudinem quod ab-
stersum est, maiori igitur humiditate opus est, quo
facile eiiciatur, & ob hoc plus potus dandum est
asthmaticis. Magnum, inquit Archigenes, medica-
men est purgatio iugis ex ualidioribus facta medi-
caminibus, & uomitus ex rhapsanidibus & per-
unctionibus sumpti, cataplasmata ex ficibus, & fa-
rina hordeacea, ut habeat resinā, ceram cum mel-
le. Impinguatur autem ei etiam iris, & manna, &
malagmata quaecunq; cutem exulcerant, & saniem
abstrahunt, ut est cissophontus, & diadapnidon,
diacenthryos. Ad orthopnoicos, asthmaticos, arme-
niæ boli drachma, dato potādum cum uino diluto.
Aliud egregium ex Aesculapio & Dioscoride: Ari-
stolochia rotunda cum aqua pota, asthmaticis suc-
currit, & magni centaurij radix, & exigui succi,
& stelctas dissolutissima pota cum aqua, & spon-
diliij fructus, & calaminthæ montanæ coma, &
byssopi, iris, & melanthium, & struthium album,
frige in testaceo uase super prunis, albicantes ue-
ro tere

rotere & sumito, & cum melle coquito, dato lin-
gendum ante cibum & post cibum, & proderit
plurimum.

Secundum Pœnos & Arabes:

Difficultas anhelitus fit tribus modis, uel
enim fit ex necessitate nimia anhelandi
sicut in sanis nimij exercitij, uel ex an-
gusto spacio pectoris, sicut in apostematibus & in
pectore uulneratis, uel ex angustia in capite uia-
rum spiritus, sicut patiuntur qui in lacertis guttu-
ris apostemantur, quæ utraque sunt pessima. Hanc
speciem Hippocrates ὀρθόπνοια uocauit, quia ho-
mini in sanitate sua pectoris tantum mouentur infe-
riora, patienti alterutrum horum trium, mouentur
superiora & inferiora, & usq; ad spatulas. Potest
aliter intelligi et ὀρθόπνοια uocari. Qui enim eam
patiuntur erigi et stare coguntur, cum infirmus an-
helosus totum pectus usq; ad spatulas, & à spatu-
lis usq; ad cubitos moueat, & cubiti in motu laxen-
tur, tribus ex causis intelligitur, sicut testatur Gale-
nus: Vel ex delectione uirtutis lacertos pectoris
mouentis, & in infirmitate sui, uel ex constipatio-
ne instrumentorum spiritus, uel ex calore nimio cor-
di & pulmoni dominante. Defectio uirtutis lacer-
tos pectoris mouētis, ex mala complexione calida,

O 3 uel

uel frigida solet fieri. Constipatio instrumentorum spiritus ex grossis & uiscosis humoribus est, uel ex grossa uentositate uias anhelitus oppilāte, uel ex apostemate in diaphragmate, quæ aliquādo omnia in uno loco adunantur, aliquādo duo in simul, raro euadunt, qui hæc omnia coadunata incurrunt. Auicenna: Asthma est ægritudo pulmonis cum qua patiens non inuenit excusationē ab anhelitu frequenti, sicut est anhelitus præfocatus et festinatus. Hæc ægritudo est ex ægritudinibus longis, habens cum hoc paroxysmos acutos, secundum similitudinē paroxysmorum epilepsie, et spasmi. Et ægritudo hæc cum accidit decrepitis nō forsitan sanatur, neq; maturatur, quomodo enim cum ipsa in iuuenibus etiā sit difficilis secundū plurimū, & augmētatur apud resupinationē. Et oportet ut elōgetur inter cibū et potū, & non satietur ex aqua subito, imō plurib; uicibus. Et somnus post cibū est res nocibilior eis. Vitet potare post cibū, siue sit aqua siue uinū. Et scias quod crocus est ex summa medicinarū maliciæ anhelitus & difficultati ipsius, quæ cōfortat instrumentum anhelitus, & facile ipsum efficit. Et catarrhus qui fit ex debilitate substantiæ cerebri, curationē nō habet. Serapio: illi qui habent asma absq; febre as simulantur illis qui incedunt cum uelocitate & uehementia,

hemētia, deriuatur ergo nomen asmatis ex actione illorū. Et accidit ei hæc ægritudo ex humore uiscofo, qui adheret canā pulmonis, & præparatio anhelitus est huius generis, scilicet, quod oppilat metus aëris, & est una specierum anhelitus, scilicet, quia est diuersa ab anhelitu asmatis, & ab anhelitu sanorū. Et fit etiam quādo implētur uenæ grossæ quæ sunt in pulmone humore grosso & phlegmati co, donec putrescit & igitur. Et oportet ut scias quod cāna pulmonis quādo descendit ad pectus, diuiditur in uenas grossas quæ sunt calidiores natura eius. Cum ergo inuoluitur cum eis caro rara, cōpletur cum eis pulmo, et istæ sunt thesauri uēti, quæ propter etiā quādo occupat locū uēti substantia alia, cōstringitur anhelitus, & accidit pectori, & collo toto præparatio recta. Quod est, quia patientes hanc ægritudinē timēt, quod cadāt quædā partes corporis super quasdā quare præfocātur, quoniā ipsi iā sciunt experimēto quod accadat in hoc ex corruptiōe. Rectificāt ergo pectora sua & colla sua, donec præparatur eis anhelitus, ppter id ergo nominatur hæc ægritudo directio anhelitus, ex hoc nō præparatur ei quod habet ægritudinē anhelitus, nisi quādo est directus sedēs. Rasis Pœnus: Asthma plurimū fit ex phleg. grosso implēte cānā pulmōis & sunt cū ea oregmō

O 4 magnus

magnus in pectore & constrictio anhelitus, & id quod faciunt canes in anhelitu quando currunt & propriè apud motum. Et cura eius est id quod educit illos humores grossos ex pectore, & iam diximus id in tussi humida. Et fit quandoq; ex siccitate pulmonis, et signa eius, sunt sitis et subtilitas uocis. Et cura eius est sumere lac in potu. Confectio Rasis ad asthma, educēs humores grossos, & saniem ex pectore: Recip. Succi liquiritiæ, hyssopi sicca ana 3. 10. capillorum Veneris 3. 7. sem. urticæ, yreos, cordumeni, piperis, aristolochiæ rotundæ, baurach, nastureij, carui campestris, amygdalarum amararum ana, 3. 5. conficiantur cum melle quantum ipsa sunt, & detur in potu cum decoctione hyssopi maiori. Confectio pilularum quibus soluntur habentes dysniam frigidam: Recip. Pulpæ colocynthidis 3. 1. tertiā, agarici 3. s. baurach, tertiā 3. 1. succi liquiritiæ 3. 1. sem. urticæ, yreos ana 3. 5, & fiant pilule, & est dosis 1.

Ex traditione autorum recentium.



Mnes dispositiones anhelitus cōtra naturam quodammodo ad ἀδυναμίαν & ad δύσπνοιαν reducuntur. Ideo de asthma primo uideamus, cuius tres species distinguuntur, scilicet, Sanfugium, Orthomia, Anhelosus. No-

mine

mine ergo speciali dicitur sansugium difficultas ex-
pirandi, quod est, quia cānales pulmonis interius
sunt ualde repleti, unde nō possunt constringi. An-
helosus uero dicitur quando pulmo exterius est cō-
pressus, unde est difficultas inspirandi, id est, intus
spirandi uel aëra attrahendi, quia pulmo non po-
test dilatari. Ὁρθόπνοια uero quia interius & ex-
terius pulmo est compressus, unde non potest dila-
tari nec constringi, & ideo pariter impeditur in-
spiratio & expiratio, cum contingit raritatem pul-
monis totaliter imbibi & repleri. Hæc autē passio
in senibus non curatur, quæ in minoribus & forti-
bus uix curatur. Hæc autem passio generatur pro-
pter catarrhos à capite descēdentes, & quandoq;
propter malas materias in spiritualibus collectas,
& quandoq; propter nocumentum aliorum mem-
brorum, sicut stomachi, splenis, epatis, diaphrag-
matis comprimentium, uel malas materias mādān-
tium, uel propter dislocationem spondylium, uel
propter uentositatem plurimā, uel propter parui-
tatem pectoris nimiam, uel propter malas comple-
xiones spiritualium, ut est frigiditas, uel siccitas im-
moderata. Signa autem istius passionis sumuntur à
nocumento membrorum patientium, & à signis
reumatū, quæ passio si sit cum materia erit in prin-

○ 5 cipio

cipio grauitas ſpuendi. Si autē ſit ſolum nocumen-
tum in ſpiritualibus, adeſt pulſus tremuloſus, &
tremor cordis. Si autē cauſa ſit extra ſpiritualia, non
adeſt tuſſis. Si autē ſit ex apoſtematibus, ſatis ſigni-
ficatur per dolorē loci. Si ſit ex aſperitate & ſicci-
tate, adeſt ſitis, & nihil expuit. Si ſit à uētoſitate, co-
gnoſcitur per inflationē loci & eructationes. Si à
frigidityte, pulſus eſt debilis, tardus, & rarus. Re-
gimē ex nutriente: Potus ſit uinū pauciferū, nō ui-
noſum, medi coloris, dulcedine participās. Cibus:
Fercula, ptifana hordei optimē cocta in brodio pul-
li pinguis, uel gallinæ, pulres ex farina amyli deco-
ctæ comestæ non ſpiſſæ. Offæ ex micis panis lotis,
panis optimæ farine frumenti debite fermentati
cū brodio pulli uel gallinæ, amygdalæ dul. optimæ
prius bene piſtatæ, deinde coctæ in brodio pulli, ui-
telli ouorū cum eorū albumine cōquaffati optimē in
brodio pulli. Spinachie partes tres, boraginis par-
tē unā, & fœniculi pauci, omnes ſimul debite cocti
in brodio pulli, portulaca cū aliquātulo boraginis
ſimul bullita & cocta in brodio pulli. Qua ſorbilia
gallinarū cum eorū albumine in principio mēſe &
proprie in principio prādij iuuant, ſi nō timet uen-
tris ſolutionem præter naturalē. Bliti partes 3. bo-
raginis partem unam debite cocta in brodio pulli.

Cucurbita

Cucurbita prius bullita, deinde cum modico mēthæ debite cocti cum brodio pulli. in omnibus suprascriptis ferculis pinguibus & macris utatur sæpe lactis amygdalarū dulcium partibus tribus, semissem maiorum frigidorum parte una, omnibus simul mixtis cum dicto ferculo. Et hoc intellige ubi patiens non horret ista, in omnibus ferculis utatur sæpe saccharo taberzet trium coctarum. Carnes utiles sunt pulli, pullæ, plices elixæ, phasiani, turdi cocti ut supra aliquando, alaudæ parvæ. Et aliquando assentur, sed raro, ita elixæ præstantiores sunt. Vituli lactentis, Gazelli seu caprioli, pulmones elixi supra dictarum avium convenientes sunt, & pariter epata ipsarum. Pulmo vulpis elixus debite coctus. Pisces petrosi parvi, elixi non assati nec frixi. Timali, lucij parvi. Acrumina omnia euitet ut sunt allia, cepæ, porri, raphani, & similia. Res acetosas euitet. Res pariter agrestes, ut limones & arancia, uentos euitet, tam calidos quàm frigidos, radios solis & lunæ similiter. Digestivum catarri siue materiæ fluentis ad pectus: Recip. Aquæ mellis factæ secundum canones 3. 3. aquæ de coctionis hordei excorticati unc. 4. sacchari albißimi unc. s. misce, assumat calidæ duobus diebus in singula hebdomada sero dum vadit dormitum.

Anhelitum

Anhelitum facilitans, uentrem leniens, pectus mundificans: Recip. Ficus siccas albas & pingues numero 4. passularū ad corinthios unc. s. brodij puli unc. 6. sacchari albißimi cum brodio dicti mixti unc. s. ficus per unam quartam horæ ante prandium comedat, deinde immediate passulas. Vltimo immediate dictum brodium bibat. Hac comestione & potione simul taliter utatur sepe: Aqua mellis, de qua supra fit mētio, sic fit: Recip. Mellis partem 1. aquæ fluuiialis munda & clara partes octo, misce. Deinde bulliant ad ignem usq; ad consumptionem tertiæ partis coque continue despumando, ultimo per petiam lincam subtilem et albam coletur, & ipsa utatur ut supra. Digestiū scretum iuuans, tussim mitigans, & anhelitum facilitans: Recip. Syruporū de prasio cōfecti cum seminibus Mesue 3. 1. de absinthio, de calamento, iulep uiolati ana 3. 2. aquarum decoctionis hordei excorticati 3. 1. capillorum Veneris 3. 2. misce. assumat calidū in aurora tribus diebus. Solutiū usuale & facile: Recip. Pilularum alephanginarum 3. 2. agarici 3. 1. salis gemmæ, zingiberis ana gran. 1. calamenti 3. 1. absinthij gran. 4. misce, & cum syrupo de prasio quod sufficit ad corporandum formentur pilulæ 7. pro 3. Assumat in aurora à duabus usque quinq;

quinq; ad libitum, stet ieiunus horis quatuor ad minus, & iterum dormiat de super hora una. Digestium aliud anhelitum facilitans: Recip. Aquarum capillorum Veneris unc. 1. praßij unc. s. enulæ campanæ unc. 1. hyssopi unc. s. croci gran. 1. sacchari albi 3. 2. misce. Assumat calidum in aurora ter in singulo mense. Cōfortatiuum pulmonis & dilatatiuum, eductiuumq; materierum in ipso contentarum: Recip. Succu caulii, mellis clari ana lb. 1. pulmonis uulpis præparati 3. 4. bulliant simul succus & mel semper despumando usq; ad succi consumptionem, & in fine addatur pulmo uulpis, & fiat electuarium. De hoc electuario sumat 3. 3. mane & sero 3. 2. per horam ante cœnam. Aqua experta pro asthma frigido, quod durauit 12. annis in quadam muliere: Recip. Praßij, capillorum Veneris, ungule caballinæ ana M. 1. passularum, yreos, sem. urticæ, liquiritiæ, hyssopi ana unc. 1. ficum siccarum numero 10. fiat decoctio, de qua sumat omni die unc. 2. In asthma fiat syrupus ut sequitur: Recip. Praßij hortulani M. 2. capillorum Veneris, hyssopi, liquiritiæ ana unc. 1. passularum, ficuum siccarum, dactylorum ana unc. 1. s. enulæ siccæ, sem. urticæ, yreos, radices fœniculi, petroseliniana unc. s. gūmi, tragachanti arabici, seminis anisi, cinna-

cinnamomi ana 3. 2. penidiarum unc. 3. mellis unc. 8. fiat syrupus, distemperetur cum aqua prassij, cōtinuet triginta diebus. De octauo in octauum diem sumat istas pilulas: Rec. Agarici 3. 3. yreos, prassij, menthe ana 3. 1. turbith 3. 5. hieræ simplicis unc. s. colocintidis, sarcocollæ ana 3. 1. s. zingib. 3. 4. fiant pilulæ cum sapa, dosis drach. 1. Et sumet de hoc loch: Recip. Diatragachanti calidi, diapenidion, diaristolochiæ ana unc. s. pinearum mundatarum unc. 2. misceantur cum sapa. Aqua pectoralis: Recip. Violarum, capillorum Veneris, hordei mundi, liquiritiæ, passularum ana unc. 1. iuiubarū, ficuum siccarum ana numero 5. hyssopi unc. s. bulliant in aqua, clarifica cum saccharo, penidiarum ana unc. 3. Syrupus solutiuus in materia pectorali in homine antiquo tempore Aestatis: Recip. Capillorum Veneris, endiuie ana M. s. liquiritiæ, passularum, hordei mundi ana unc. 1. radicum foeniculi, petroselini ana unc. s. hyssopi drach. 2. iuiubarū numero decem, agarici albi, turbith, rheubarbari ana unc. s. seminis anisi, foeniculi, zingiberis ana drachmam unam, spicæ, salis gemmæ ana scrup. 1. sacchari lib. 1. fiat syrupus, dosis unc. s. omni die de tertio in tertium cum aqua calida.

De pleu

De pleuritide seu pleuriti.

Cap. VI.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Pleuritica membrana est panniculus sub costis firmior & peritonæo similis, singula tamen costæ membranulis suis integuntur, hinc membrana annexa est, quæ medios deducit pulmones, & pectori spinæq; annectitur, ut altera pulmonis parte læsa, altera incolumis seruetur. Pleuritis, idis, recentiores dicunt pleuresis. Et est morbus laterum satis asper, & dicitur ἀπὸ τῆς πλευρῆς, id est, à latere, hinc pleureticus, qui hunc morbum patitur. Integra pleuritis ardor est hypezocois in latere tunicae, uehemens dolor obtundens, illatus cum acutissima febre, flatus difficultas hoc comitatur, & tussis quandoq; arida, aliquando cum eductione, à principio quidem cruenta, postea uero cocto ardore purulentorum pulsus consedit asper et uelut scalpens. Quod si dolor circa māmam insedit, extenditurq; ad uertebra usq; coxendicis, detrahendus est sanguis quantum satis, sin autem infra ad hypochondriū fuerit dolor purgandum est, sin autem mediocris fuerit dolor, neq; compungens,

compungens, neq; cum tussi ac febris acuta, non magno eget auxilio. Clyster namq; in his prius admittatur, inde oportuna alui subductio aspersioq; adhibeatur languenti lateri, obducaturq; sacculus ex furfuribus, & glithone, & anetho, sitq; uictus attenuans. At in acute egrotantibus, ut dictum est, si circa mammam & clauem fuerit dolor, secare, ut dictum est, oportet in ancone uenam ardente latere, non ad axillam brachij, sed ex opposito, neq; tantum sanguinis detrahatur ut anima deficiat, nam ex hoc subest periculum peripneumoniae, refrigerato enim admodum sanguine, pulmo, qui rarus & calidus est, lateriq; uicinus, facile excipit morbum, expedit nimirum ei mediocrem detrahere aliquo etiam interueniente interuallo, & adhuc mediocre detrahere. Quod si animae defectus tenetur, si amplius detrahatur, inde clysterib. aluus erit subducenda, si par non uideatur, ut edum erit oleo rutaceo in quo colliquefacta sit terebinthina & butyrum, inde lateri oleum admouendum est calidum, in quo ruta, anethum, cyperi flores incocti sint, et lana apponatur cum eo liquore, ac sulphurata, uel ipsum sulphur dissolutum oleo calido & thymo dissolutissimo imposito, ligatoq; leniter & continue id, hacq; aspersione ad tertium usque diem utitor, haec enim sunt
quae

quæ ab Archigene narrata sunt. Epithema præstans pleureticis secundum eundem: Opopanacis uncia, rutæ foliorum uncia 2. cyprini libra, ceræ unc. 6. terebinthinæ unc. 7. galbanes uncia & dimidia opopanacis, cyprino dissoluatur. Galbanæ uero et rutæ folijs colluatur, quæ liquefacta misceatur dissolutis. Aliud epithema multæ experientie: Rutæ 3. 2. sulphuris extincti 3. 1. nitri 3. s. adipis porcine 3. 4. ceræ 3. 6. terebinthinæ unc. 1. pota autem iuuant pleureticos à principio quidem mellicratum in quo cocta sit ruta, postea hyssopus, uel calamintha, uel origanum, uel iris, uel radix aristolochiæ. Aliud: Butyrum recens cum equali parte mellis coquito, daq; cochleariū. Inueteratis autem pleureticis da balsami fructus drachmā cum mellicrato, uel gentianæ 3. 2. centaurij maioris radicis 3. 2. cum uino, uel symphyti radicis cum mellicrato. Si autē humida & incocta reijciat, hoc cōgruet: Zingiberis, troglytidis 3. 2. croci 3. piperis gran. 15. mellis despumati lb. dato cochlearij dimidium.

Ex traditione Pœnorū & Arabū.

Scias quod pleuresis est phlegmon uel a minis ligantis uiscera quod cooperit costas de intus. Et oportet ut scias quod pectus est compositum ex 24. costis, & inter istas

P costas

costas sunt lacerti quidam positi ad constringendum pectus & dilatandum ipsum. Cum ergo apostematur uelamen ligās quoad cooperit costas has & lacertos qui sunt inter eas, nominatur hæc ægritudo Caluritus, et est pleuresis, quādo uero apostema est in lacertis, tunc quidam nominant Caluritis non uerum. Sed distinguitur inter uerum & nō uerum per istas significationes, quod est quia si est cum dolore pungitiuo ordinato, tunc pleuresis est uera, quoniam uelamē est neruosum in natura sua sentiens ex quo est pūctio & dolor, & dolor pungit in hac ægitudine uelamen. Est ergo ille qui extenditur ex centro secundum rotunditatem ad terminum, & centrum eius est fluxum locatum. Et significationes quæ sunt propriæ ei sunt ex tussi, & dolore cum punctura & febre acuta, & cōstrictione anhelitus, & dolore clamoso. Et secundum plurimum non accidit pleuresis nisi ex sanguine chole rico, scilicet, ex materia calida. Et oportet ut admistretur phlebotomia quando dolor iam ascenderit ad duas furculas, et post illud damus infirmo decoctionem de iuiubis & sebesten, passulis, papaue-re albo, tragachanto cum uiolis conditis, cum saccharo & oleo de amygdalis dulcib. sed die uno, & post illud aquā hordei. Et dñ materia in principio per-

permanet currens, trahamus ipsam ad locū cōtrariū ei ex dorso ad lōgitudinem. Si aut̄ ægri-
tudo iam confirmata est, & abscissum est quod currebat, tūc
necesse est ut phlebotomemus ex latere doloroso.
Halyabbas: Si apostema operimēto costas subinuol-
uenti accidit, pleuresis uocatur, & cum in pectoris
lacertis, dolor dicitur lateris. Et huic adherentia
passioni accidētia qbus significatur, febris est inde
ficiens, quæ ab ipsius in principio non separatur,
ac tuſis quæ nihil in principijs emittit, anhelitus an-
gustatio, pūgens dolor, & cū passio difficilis est do-
lor à costas incipit, & ad furcularū ascēdit partes,
eo in latere in quo apostema est, nonnunq̄ autē ad
inferiora descēdit in partes quæ subsunt hypochondrijs.
Sāguis augmētatus, & cū interiori calore cor-
poris feruidus, capiti ascēdentem fumū mittit, qui
cum inueniat clausuram capitis et poros oppilatos
non pmittitur exire, deinde calefit morās in capite
tum cerebri calore dissolutus redit ad inferiora
corporis, sicut uidemus in humectatione fumi bal-
nei, qui fumus cum tectā penetrare nequeat, redit
ad inferiora. Si aqua à capite destillat ad dia-
phragma, calidum apostema generat, & inde
fit pleuresis uera. Si in lacertos ueniat uel carnes
quæ sunt inter costas, pleuresis non uera dicitur.

P 2 sepe

Sæpe pleuritis inuadit homines calidæ & humidæ
cōplexionis in Vere naturaliter, in Hyeme acciden-
taliter. Et plurima pleuritis ex puritate nascitur
sanguinis. Aliquando ex sanguine calido & chole-
rico, aliquando grosso & melancholico, aliquando
humido & phlegmatico, aliquando ex omnibus, ali-
quando ex quibusdam humoribus. Si uideamus quod
apostema diaphragmatis sit sanguineū, si sequan-
tur tempus, ætas, consuetudo & uirtus infirmi, fe-
stinemus, ut de basilica uena minuamus, de latere
ubi infirmus patitur antequā augmētetur, maximè
si dolor ascendat usque ad furculas, quod in *πρότερον*
ὀφθαλμῶν præcipit Hippocrates. Si uirtus sit for-
tis, non est cura alia adhibenda, quā quæ phlebot-
omia præcepimus obseruanda, sed phlebotomādus
est maximè si sit sanguinea morbi species. Vnde si
uirtus defecerit nō oportet phlebotomari, sed quā-
to magis possumus uirtutem custodiri, phleboto-
mia enim est molestissima, cum defectione uirtutis.
Oportet ergo epithemata queri, & cataplasmata
acumen sanguinis mitigantia & dissoluentia, sicut
sunt maluæ, uiolæ, radices eorum, hordeum mūdum
in aqua coctum & colatum cum oleo uiolato mix-
tum, deinde pannilinei subtiles infundantur, &
loco dolenti superponantur frigida tempore cali-
do, te-

dō, tepida tempore frigido. Isaac: Pleuritis uera, est calidum apostema nascēs in diaphragmate: propter humores à cerebro ad pectus fluentes. Aliquādo hæc materia descendit ad lacertos costas uelantes, & aliquando in pulmonem, & nonnunquam in diaphragma. Si fuerit in pulmone erit dolor leuior, quia pulmo est insensibilis propter neruos ab eo ablatos. Spiritus tamen est angustior, quia pulmo est maius instrumentum spiritus. Quod si materia uenit ad diaphragma, fit spiritus leuior, & dolor fortior propter multitudinem neruorum in eo existentem & colligantiam, quam ipsum cum cerebro habet. Proinde si uulnera patitur, dura sunt ad sanandum, maxime si fuerint in neruosa parte diaphragmatis carnem non habētis, uulnera enim in loco non carnosio, incurabilia sunt, quæ si fuerint in carnosio, sunt dura ad sanandum propter nimietatem sui motus, & non solum uulnera diaphragmatis sunt difficilia ad curandum, sed etiam ea quæ sunt sub omnibus locis diaphragmatis existētibz, sicut circundātis uentris & intestinorum, quia corruptio omnium humorum ad hæc loca uenit, quia sunt uicina locis foecund. propter hoc oportet me dico ut desiccet uulnera quæ sunt in his locis, quantum uirtus tolerare poterit. Auicenna: Pleuritis

P 3 uera

uera est apostema calidum in partibus pectoris,
aut in lacertis intrinsecis, & in uelamine cooperi-
ente pectus, & in uelamine distinguente, & est il-
lud quod est purum. Non uera fit in lacerto extrin-
seco apparente, aut in uelamine extrinseco cum cō-
munitate cutis & absque communitate, & tunc est
non uera. Et maius istis & terribilius est illud
quod est in ipso uelamine distinguente, & est pra-
uius eis. Et omne apostema aut resoluitur, aut in-
durat, aut collectionem facit. Et oportet ut uirtus
confortetur in hac hora, ut fortis fiat ad tuſsim spu-
ti. Hæc namq; operatio duobus completur uirtuti-
bus, quarum una est naturalis maturatiua & ex-
pulsua, & altera est uoluntaria expulsua, & nisi
confortentur possibile est ut deficiant ad mundi-
ficandum. Et quandoq; accidit ex uehementia fe-
bris, frequentia anhelitus, & uiscositas sputi, &
ex uiscositate sputi uehementia laboris, & additio
in inflammatione, & sic non cessant adiuuare se su-
per maliciam. Veritas tamen est quod propinqua
parti sinistrae est deterior, sed est conuenientior
ad hoc ut maturetur & recipiat solutionem. Et
pleuresis minoratur in decrepitis, & si forte acci-
dit interficit propter debilitatem uirtutum earum
in ſpuendo & mundificando. Et sunt quinque signa
uere

vera pleuresis, scilicet, febris inseparabilis, dolor
 pūgitivus sub costis, cōstrictio anhelitus, pulsus ser-
 rinus, et tussis. Et apparitio fluxus sanguinis nariū,
 est ex signis bonis ultimis in pleuresi. Et omnis pleu-
 resis cuius dolor nō q̄escit p̄ sputū, neq; minutionē,
 neq; per alia, tūc spera ex ea saniositatē, aut mortē
 ante ipsam secundū reliquas significatiōes. Et omne
 sputū cum quo non quiescit nocumētum, non est bo-
 nū. Et laudabilius sputū est, quod est facilius & ue-
 locius, & plurimū et magis maturū & albū planū
 æquale in quo nō est uiscositas, imō æqualitas sub-
 stātiæ. Rasis. Fit ex sanguine, cuius signa sunt rube-
 do coloris, repletio, pulsus et uehemētia cōstrictiōis
 anhelitus post multā repletionē uini, et si sputū iam
 incēpit, erit rubedo in eo plus. Cura eius est phle-
 botomia basilicæ ex latere opposito, deinde iteratio
 phlebotomiæ ex latere doloris in die tertia. Et fit
 pleuresis ex cholera, & signa sunt eius punctura
 & dolor in latere, & caliditas fortior q̄ eius quæ
 fit ex sanguine, et pulsus minor et durior & febris
 acutior. Et cura eius est phlebotomia, sed ex latere
 doloris de basilica. Et fit ex sanguine adusto nigro,
 & signa eius sunt uehementia puncturæ cum sicci-
 tate oris, et fortitudine febris, et asperitas linguæ,
 & postpositio sputi, et tarditas eius, & difficultas

P 4 ipsius

ipsius & nigredo coloris ipsius, & plurimum est mortale. Et cura eius est phlebotomia. Et fit pleuritis ex sanguine in quo dominatur phlegma, & est magis quiesca et leuior, & febris non habet magnū dominium, & non est punctura in latere, & est sputum in hac egritudine albius, & in ipso est rubedo parua. Et cura eius est phlebotomia etiam, de inde decoctio hyssopi, & uiol. & reliqua quæ diximus, ueruntamen extinctio & humectatio oportet ut sint minores.

Ex traditione autorum recentium.



Era pleuritis à nō uera differt cum proprijs eius significationibus, quæ sunt duricia febris, angustia spiritus, tussis in initio morbi sicca, punctio in latere, quæ accidentia sequitur extēsiō pulsus. Hæc duricia est similis dentibus serræ, cumq; apostema fuerit maturatum rūpitur, neq; uulnus ab omni mundificatur sanie, uelociter mouetur materia & mutatur ab interiori diaphragmate ad exteriora, & iuncta cum pulmone generat peripneumoniam, qua de causa dolor quiescit, quia pulmo est insensibilis. Et aliquādo incidunt in peripneumoniam priusquā apostema rum patur. Non uera autē pleuritis habet significationes has:

nes has : scilicet, gravitatem lateris absq; tussi & sputo, quia morbus est extra spiritus instrumenta, proinde pulsus eorum est mollis, & posita exterius manu super locum passionis mox sentiunt dolorem, & aliquando tumor apostematis apparet extrinsecus, quod in futuro cum chirurgia curatur. Apostema epatis quandoq; uidetur esse pleureticum cum non sit. Calidum itaq; epatis apostema cognoscitur per citrinitatem uultus patientis, quia e par est fundamentum sanguinis, quod cum deficit in mundificatione sanguinis immundus sanguis permanēs, & corpus nutriens mutat illud in citrinitatem, et siccè tussunt, quia materia extra spiritus instrumentum est, pulsus eorum est durior pleuretico pulsu. Species pleuritis differunt inter se in colore sputi, qualitate infirmi, q̃a si materia sit sanguinea, sputum erit rubeum, tussis humida, corpus plenū, tactus mollis & suavis, sitis parua, pulsus magnus & largus, urina uermiculosa & tēperata in liquore, aut aliquātulum grossa. Quod si materia fuerit cholerica, sputū erit citrinū, tussis sicca, corpus macilentum, calor pungitius & acutus, sitis magna, pulsus uelox & acutus, urina subtilis & lucida. Si autē materia sit phlegmatica, sputū erit albū, tussis humida, corpus pingue, effigies mollis & parū colorata,

P 5

lorata, febris debilis, sitis parua, pulsus latus et tardus, urina uitellina, aut citrina, liquor grossus, & aliquando subtilis et albus, quod est malum. Materia melancholica sputum habet liuidū uel nigrum, corpus macidum & siccū, pulsum subtilem & tardum, urinā columbinā, aut aliquantulum pertinentem ad uiriditatē. Quod si materia de omnibus, aut de pluribus fuerit humoribus cōposita, sit sputi color cōmixtus multū siue parū secūdum humorum cōmixtionem. Similiter ceterae patientis qualitates erūt mixte. Sed bonū est si ante materiae digestionē sputū egrediatur albū, & aliquātulum mixtum cum rubore, quia materiā significat esse leuē & nō obediētē, quod si appareat sanguinolētum, significat quod morbus est sanguineus. Dolore aut ad furculas ascendēte, ante omnia phlebotomabis, deinde occurre cū cathaplasmatibus acūmē sanguinis extinguentibus et dissolutiuis, sicut est succus maluae, bismaluae, uiol. hordeū mundū, omnibus coctis et colatis addito oleo uiol. pannus in eis infusus, super patientē ponatur frigidus tēpore calido, calidus tēpore frig. quod si calor febris non est fortis addimus cathaplasma cum oleo chamæmil. Et si uirtus patientis sit fortis, etas, cōplexio, tēpus, regio, cōsuetudo sintq; cōuenientia, festināda est sang. detractione,

Etio, priusq̃ morbus augmētari incipiat, et febris augmētetur. Malum enim est (ut uult Isaac) si postea minuatur, ppter naturæ debilitatē. Materiā etiā si certissimē noueris esse sang. & uirtus infirmi sit fortis, phlebotomia cōueniens erit, et si cætera incōueniētia sint, caue tamē ne sang. temere minuatur cum uirtus debilis est, q̃a molestū est, quod si minuat, cōuenit ut sit de basilica uena & de latere infirmo. Sūt nōnulli tam ex Italis q̃ ex nostris in sang. mittendo audaciores, quos medici sapientes admodū detestātur. Nam sang. est atræ bilis tēperamentum, spiritus fomes, uitæ thesaurus. Dieta in pleure si sit talis: Da mane ptisanā colatū cū amyg. & saccharo, aut syrup. uiol. si uēter fuerit cōstipatus, uespere micā panis lotā cum amyg. & sacch. tritam. Succū etiā malorū granorū ualde dul. sorbeāt, quod si cōsuetudo infirmi fuerit multū comedēdi, & fuerit Germanus, aut Scotus: & ptisanā & amyg. non suffecerit, da spinachiā, maluā, cucurbitā, omnia cocta cū amyg. & pariter hordeaceū cū amyg. et micā panis. Sed in die nūciatiua decet dietā subtiliare, et solū ptisanā aut hord. clarū dare, q̃ si sputum in 4. die fuerit album, lene, multū facile, quæ cum una aut duabus egrediatur tussib. nūciat crism esse acturā in 7. die. Si aut in 7. rubeū fuerit et aliquod
signum

signū cōcoctionis apparuerit, & sputū fuerit lene,
iunctum, uiscosum & mixtum cum aliquanto albe-
dinis & leuiter exeat, indicat bonā crīsim esse uētū-
rā in 11. uel 14. maximē si apparuerint cum eo si-
gna salutis, quæ sunt uirtutis bonitas, leuitas, somni
leuitas, appetitus bonitas, maximē in hora qua erāt
soliti illum habere in sanitate, & signū cōcoctionis
in urina, eadem hora sanitatis. Si sputum in quarta
die roseum apparuerit, nunciat crīsim in 14. aut
21. secundum quod materia morbi leuis aut grauis
apparuerit. Quod si citrinū in quarta apparuerit,
longitudinem significat morbi, sed tamen nondum
timorem aut salutem demonstrat. Sed tamen si in 7.
mutetur in ruborem, etia alia bona signa appareāt
in longo tempore, salutem nunciat esse uenturam.
Si autem usq; in 7. appareat citrinum, & illaudabi-
les appareant significationes, timorem demonstrat
uicinum. Si autem significationes sint mediocres,
fit tarditas timoris secundum commixtiones signifi-
cationum. Cauendum est autem ne multum solua-
tur uenter, quia postea uix constipatur. Si pleure-
ticus fiat sine sputo & sic cum dolore hypochondri-
orum, per urinam purgabitur potius quā per e-
gestionem. In pleuriti semper est punctura unius
lateris, uel utriusq; sed tamen urina incēditur cum
est in

est in dextro. In peripneumonia uero nulla est lateris pūctura, sed grauedo sinistrae spatulae cum genarum rubore, & docent in his facere phlebotomiam, primo per ἀντίσπασιν, & post per μετὰ θέσιν. Pleureticus si non purgetur in 14. diebus in empyema trāsit, & uix euadit. Quidam autem arbitrātur in pleuresi empyemate et peripneumonia curam non esse uariandam, quibusdam contrarium uidetur secūdum diuersitāe humorum in causa existētium curas esse uariandas, ut Constātinus, Isaac & Rasis. In his tamen passionibus non sunt apponenda reperiussua, nec actualiter frigida, si cut nec in apostematibus aliquibus interiorum membrorum, sed diaphoreticis magis & mollitiuis insi stēdum, ut si materia est calida, minus calida apponantur. Si frigida, magis frigida apponātur. Et pariter nihil actualiter frigidum debet exhiberi per os, et nihil acetosum, uel salsum. Nec appropinquet se pulueri uel fumo, uel uento, uel splendori, & loquatur submissa uoce, & sit in loco obscuro tuto & frigore & calore, unde carbones igniti sine fumo ante lectum debent apponi. Nihil actualiter frigidum eum extra tangat. Aliqui quærent an conueniat phlebotomia in pleuresi et peripneumonia, in principio quando fuerit cum fluxu uētris. Et in hoc casu

casu dicit Alexan. quod primo intercipiatur fluxus;
 & post fiat phlebotomia. Alij dicūt quod siue fiat
 ui naturæ, siue ui symptomatis à principio particu-
 larib. cōuenientib. forti existente natura faciendā
 est phlebotomia. Multi autē in distinctione signo-
 rū pleuritis & apostemate epatis decipiuntur, sed
 discernūtur. Epatis autē apostema à principio est
 ad modū lunæ nouellæ cornib. depressis inferius.
 Itē empyici statim extenuantur et discolorātur. Itē
 in empyicis magis tingitur urina q̄ in pleuresi. Itē
 empyici sanguinolētas habēt egestionē, et urinam
 sanguinolentā. Item empyici sentiunt dolorē inferi-
 us magis q̄ pleuretici. In pleuresi dolor est pūgiti-
 uus, in empyemate magis aggrauatiuus. In pleure-
 si tussis est humida, in empyemate sicca. Differt autē
 pleuresis à peripneumonia, quia in peripneumonia
 maior est cōstrictio anhelitus, & dolor aggraua-
 tiuus, in dextro latere nulla adest pūctio, q̄a pulmo
 nō est mēbrum sensibile. Itē in peripneumonia dō-
 lor sentitur in dorso et inter duas spatulas, in pleu-
 resi non. Item adest rubedo uel citrinitas in maxil-
 lis in peripneumonia, in pleuresi non. Item in peri-
 pneumonia leuius iacet super dextrū latus ubi est
 apostema, in pleuresi ecōuerso. In peripneumonia
 lingua rubescit multum in principio, sed postea ni-
 grescit, item pleuresis frequēter mutatur in peripneumo-
 pneumonia

pneumoniā, sed non ecōuerso aut raro. Item pleure-
sis sinistrae partis est deterior q̄ dextrae. Item pleu-
resis sinistrae partis multōtiens in pipneumoniā mu-
tatur, ecōuerso raro. Itē pleuresis accidit in Vere,
et ppter potū aquae frigidae, et propter multā re-
pletionē humorū. in pleuresi post phlebotomiā et
clysteria fiat unguentū ad pectus: Recip. Muscila-
ginis sem. citon. sem. alteae ana ℥. s. muscilag. hor-
dei bene cocti ℥. i. succi rad. lilij, succi yreos ana
℥. s. olei uiol. et amygd. dulciū ana ℥. 2. ceræ q. s. fiat
unguentum. Emplastrū ad pectus post unguentū: Re-
cip. Farinae hordei ℥. 4. sem. lini, sem. alteae ana ℥.
i. florū chamæmil. foenugræci ana ℥. i. buillant in
aqua et fiat emplastrū. Syrupus ualēs pleureticis:
Recip. Liquiritiae rase ℥. i. s. hordei mūdi, passul.
ana ℥. i. iuiubarū 5. capil. Ven. uiolarū an. ℥. s. sac-
chari lb. s. fiat iulep. Quādo pleuresis est de mate-
ria mixta, sed magis phleg. facta phlebotomia: Re-
cip. Syrup. iuiubarū ℥. i. s. sumat 2. uicib. postea ca-
piat istū syrup. R̄. Hordei mūdi, liqritiae ana ℥. i. s.
passularū, uiol. ana ℥. s. iuiubarū 10. capil. uen. M.
s. dactylorum numero 2. sacchari lb. s. fiat syrupus
aromatizatus cum puluere diatragachanti frigidi
℥. s. Sumat de ista mixtione: Recip. Sacchari uiol.
buglos. boragin. diapenidion ana ℥. i. misceātur et
cooperiantur folijs auri. Vnguentum ad pectus:
Recip.

Recip. Muscilaginis seminis alteæ, muscilaginis
 semin. lini ana ℥. i. olei chamomilæ, uiolati, olei a-
 mygdalarum dulcium ana ℥. i. ceræ quātum suffi-
 cit, fiat unguētum pro pectore. Sumat de istis aquis
 quandoq; in die: Recip. Aquæ mellissæ, aquæ bu-
 glossæ, aquæ scabiosæ ana lb. s. prassij ℥. 4. ponan-
 tur in infusione liquiritiæ ℥. 2. cum sacchari lb. s.
 clarificetur. Fiat postea talis syrupus: Recip. Passu-
 larum, liquiritiæ ana ℥. 2. iuiubarum, sebesten ana
 numero 10. capillorum Veneris, prassij hortulani
 ana M. i. hyssopi, corticum fœniculi, petroselini a-
 na ℥. s. endiuie M. i. sacchari ℥. 8. fiat syrupus.

De cardiaca passione & syntexi.

Cap. VII.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Cor cuius gratia omnia constant, in me-
 dio corpore collocatur. Natura enim
 rem nobiliorem locis nobilioribus con-
 stituere solet, uerum potius superius quàm inferi-
 us, ac in parte priore quàm posteriore, potiusq; ad
 leuam quàm ad dextram, non sine ratione collo-
 catum est, uiscerum principale membrum, quod
 in omnibus animalibus conspicitur. Nam cor
 caloris officina est & uitæ mentisque origo, san-
 guinis spiritusque principium. Omnium enim
 partium

partium primum sanguinolentum conspicitur, ut in ouis triduo incubatis puncti magnitudine apparet. Formato corpore, protinus quasi alterū intus animal palpitare sentitur thoraci. Cor sanguinis fons est & principium calidæ humidæq; naturæ, ut Auerroi placet, uel temperatæ, si Aristoteli creditur. In corde uitalis calor, nutrimentiq; principium habetur, irascentiæq; sedes, pulmo ad custodiam id ambit ut stragulum, tanta est uisceris principalis reuerentia, quod inter omnia membra solum uitæ non maceratur, nec uitæ supplicia trahit grauiora. Cordi, ut inquit Aristot. nulla bilis appropinquare potest, quoniam illud affectum nullū patitur uiolentum, mortem ilico trahit læsum. Cor ipsum natura carnosum, ac musculosum in summo pingue sine osse, præterquàm nonnullis animalibus inuenitur, ut in ceruorum cordibus. A corde omnes uenæ maiores tanquàm ex stipite oriri cernuntur, quia in eo nullæ uenæ sunt, reliqua membra sanguinem non habent nisi in uenis, tanquàm in conceptaculis. Et sanguis ex corde ad uenas inde ad membra deriuat, in fibris autem iecoris aquosa potius sanies apparet, nec sanguinis naturam habent nisi prius in corde acceperit. Arteriæq; ad iecur non perueniunt, quoniam cordi peculiares sunt. Cardiacus morbus

Q. appellatur

appellatur, qui ad tabem hominem perducit, quod Galenus in simia sua dissecta perspexit. Et dicitur ἀπὸ τῆς καρδίας, id est, à corde uel ab ore stomachi, quod καρδία etiam Græci uocāt. Seneca: Bibere et sudare uita cardiaca est. σύντηξις est defectio animi, quæ Latine defectio dicitur, inde σύντηκτικοί defecti. λεπθυμικοί et λεπτοψύχοι dicuntur isto morbo laborantes, animaq; et spiritus deficientes. Cordis tremor et concussio multis sanis adolescentibus et pubescentibus perspectus aduenisse, dolet his caput absq; alia & exteriori causa, & hi omnes detractio sanguine subleuati sunt, et perfecte quidam ab eo casu liberati sunt, attenu ante uictu post sanguinis detractionem utentes, itidem medicaminibus. Noui, inquit Galenus, quendam Veris tempore languentem tremore cordis, triennioq; usum sanguinis detractione, et adiutum, præuenisse autem in sanguinis detractione quarto anno, antequàm in eum laberetur casus, atq; deinceps pluribus fecisse annis, usum etiam uictu congruo, ueruntamen ipsum antequàm senesceret à uita decessisse, sicut et alij omnes. Quidam in febribus acutis statim in syncopen deuoluti itidem moriuntur, aliqui uel citra syncopen apoplexiæ ritu, statim uitam cum morte commutarunt, plures qui
ita

ita languent etatem agentes minorem quinquagin-
ta annorum, plurimum certe quam quadraginta eta-
tem alij non uident. Nomen quidem animæ defe-
ctus, quæ Ἀδυσμία nuncupatur, unum est, cau-
sæ uero multæ, curæq; in qualibet specie. Nunc de
his tantum dicemus, quantum quispiam satis nosse
possit, ubi confestim in paroxysmis inciderint. Dif-
fert autem lipothymia à syncope, quod lipothymia
quidem subito incidit sine sensu & immobilem effi-
cit hominem, ac non omnino sudatur. At syncope
& uigilantibus & delatis in somnum accidit, &
prorsus sudoribus ex consuetudine dictis synco-
pen inuehit. Quibus autem à flaua bile os uentris
oblesum est, labentibus in syncopen potus frigidus
est dandus, uinum quidem natura calidum citrinū
tenue ac uetustum. Sunt etiam causæ aliæ ex quibus
syncope fiunt: dolor ingens, uigilia, immoderata
euacuatio, in delinquentibus quoq; id est inuenire
& principium distemperatiæ, celerrima extinctio,
abolitioq; est languente cerebro.

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.



Remor cordis ex humiditate est coadu-
nata in circumstātibus cor pelliculis, hic
morb. fit sanis, & infirmis dubito, cū hæc

Q 2

humidi-

humiditas influit cordi. Si humiditas sanguinea uel cholerică sit, fit cum tremore cordis, & calor, & sitis, & altus anhelitus inest. Si ex grosso sanguine & melancholico, fit timor & tristitia & pigritia sine siti, aliquando fit cardiacus morbus cum necessaria cordi minuantur, sicut sanguis subtilis & clarus ab epate egrediens, quod intelligimus in epate, uel in locis uicinis infirmantibus sicut in stomacho. Aliquando humores coadunantur in stomacho acuti pungentes fortiter, unde morbus cardiacus nascitur. Syncopis uero est absolute defectio cordis & coadunatio totius sue uirtutis in se, atq; ablatio fumi sui expellendi. Impossibile enim est esse syncopin sine passione cordis. Fit ergo diuersis modis, scilicet ex plenitudine nimia, uel multa inanitione, uel subita caloris mutatione in frigidum, uel frigidi in nimia caloris mutatione. Plenitudo enim fit ui, ex humoribus totius corporis, uel solius stomachi uel intestinorum uel matricis. Serapio: In speciebus syncopis, quæ accidit cum dolore quorundam membrorum, oportet ut sit studium nostrum de membro quod est causa ægritudinis, & rectificatione eius cum rebus quæ conueniunt ei præter quod tardemus in confortatione cordis etiam. Auicenna: Et tremor quidem cordis quando superfluit, permutatur

tur ad mortem. Et tremor cordis qui sanguineus est, adiuuatur coitu, & in frigidatio est econuerso. Et ad ultimum omnis medicina odorifera est cordi alis. Syncopi est destructio maioris partis plurimū uirtutum, scilicet motiue & sensibilis. Causa syncopis quandoq; est applicatio uirtutis contrariæ substantialiter complexioni cordis & spiritus, sicut olfactus foetoris, & pestilentia aëris ex cadaueribus, & penetratione uirtutum uenenorum ad cor, & quandoq; propter arterias. Et etiam quandoq; accidit syncopi causa uermium, qui ascendunt ad os stomachi. Dolor autem facit cōtingere syncopin, quia superflue resoluit spiritum, & in fine propter uehementiam in frigidationis cordis. Et debilitas oris stomachi, aut effusio rei ad ipsum, est causa syncopis illius qui phlebotomatur. Et causa quare aliquis patitur in prima phlebotomia sui est, quia subitum est quod non consueuit. Rasis: Aegritudines cordis quas curari possibile est, sunt alteratio complexionis antequam confirmetur, & tremor cordis, & syncopis, & dolor qui non confirmatur, & debilitas. Apostema uero disruptio aut corruptio cōplexionis confirmatæ, non sunt faciles ad curādum. Et tremor cordis secundum plurimum fit cum calore. Et cura eius est phlebotomia cephalæ ex latere sinistro,

Q 3 nistro,

nistro, & dare in potu lac acetosum, & trochiscos
 de camphora secundū quod diximus. Et fit tremor
 cordis, raro tamē ex multitudine melācholie in san-
 guine, & hæc species tremoris cordis est nobilior
 specierū tremoris cordis, & signa eius sunt corru-
 ptio cogitationis, & timor, & rusticitas, & dispo-
 sitio proxima melācholie quæ est ex dominio cho-
 lerae nigrae in sanguine. Et cura eius est id quod dixi-
 mus in melācholia, quæ est ex dominio cholerae ni-
 grae in sanguinem. Confectio trochiscorum ad pul-
 sam cordis: Recip. Thuris 3. 5. enulae ficcae 3. 3. suc-
 ci calamēthi, foliorum rutæ ana. 3. 2. sisymbrij 3. 3.
 origani 3. 1. s. ameos tantūdem, detur in potu ex eo
 aureū unū cū decoctione cimini. Sunt enim boni ad
 inflationē uentris, & puncturā uenenosam. Confe-
 ctio trochiscorum de musco ad pulsum cordis, syn-
 copin, hydropisim, & extenuationem: Recip. Masti-
 ches, xyloaloēs crudi, cinnamomi, gariophylorū,
 galliæ, spicæ, nucis muscatæ, cubebarū, cardamomi,
 olei de citro. ana. aureum unum, musci, ambræ ana.
 sextā 3. unius. fiāt trochisci cū kesmes. Cōfectio me-
 dicaminis de musco ad pulsum cordis et syncopin:
 Recip. Mastiches, cinnamomi, xyloaloēs crudi, ga-
 riophyl. galliæ, spicæ, nucis muscatæ, cubebarū, car-
 damomi, ciperi, squinati, foliorū citri, sansuci, sisym-
 brij,

brij, zingiberis, macropiperis, margaritarū, coral-
li, charabæ, setæ crudæ, folij Indi, been, ana. 3. 10.
musci 3. 1. tertiam puri, aggregentur omnia cū mel-
le myrobalanorū, chebulorū conditorum. Cōfectio
de xyloaloës ad syncopin & uomitum et cholerica
passionē: Recip. Thuris 3. 3. ros. 3. 11. xyloaloës, gal-
liæ, gariophyl. spicæ, cretæ quæ comeditur decora-
sceni, spodij, ana. 3. 1. cubebarū 3. 1. fiant trochisci.

Secundum recentium autorum
traditionem.

Humiditas frigida, uel grossa uentositas
quandoq; colliguntur circa cor, quorum
collectio ad cordis cōstrictionē sua frigi-
ditate operatur, cor uero sua caliditate apertionē
intēdit & dilatationē. Ex his cōtrarijs ergo causis
fuit contrarij motus et tremor, unde si apponatur
manus supra regionem cordis, sentitur tremor cor-
dis cū saltu, et propter hoc appellatur cardiaca tre-
mens. Et aliquando colligitur circa cor humiditas
cholericā, uel fumus acutus, unde resoluitur humidi-
tas circūquaq; et fit sudor cōtinuus in furcula & in
pectore, et circa collum, et hoc appellatur cardiaca
diaphoretica. Ex hac nō seqtur defectio patiētis &
nimia extenuatio, sic ergo fit quædā passio cardiaca
de frigida causa, quædā de calida, utrūq; tamē istorū

Q 4 habet

habet fieri à causis primitiuis antecedentibus, ut à causis remotis. Cause primitiue, sunt accidentia animæ, dolores, potus uenenosus, morsus serpentis. Antecedentes sunt morbus consimilis cum materia uel sine materia, uel officialis uel cōmunis quæ sunt in solo corde, uel in stomacho, epate, splene, uel matrice. Morbus ergo similis cordis & aliorum membrorum consimilium sine materia, aut erit caliditas, aut frigiditas & sic de alijs. Cum materia uero aut erit sanguinea, aut cholericæ, aut phlegmaticæ, aut melancholicæ, aut ex his omnibus mixtis: hæc autem passio frequenter in febribus pestilentialibus accidit. Syncopis uero est defectio uirtutis motiue et sensibilis secundum maiorem sui partem. Huius autem passionis causa propinqua & immediata cordis est debilitatio, uel propter causam priuatā in corde existentem, uel propter causam aliunde ueruentem. Ex hoc patet quod syncopis aliquando est à causa antecedente uel primitiua. & causa primitiua, sicut à fortibus animæ accidētibus, ut à gaudio superfluo, tristitia, dolore, & ab horribili scetore, sicut à cadaueribus mortuorum, & lacunis, uel à loco & pestilentia aëris & similibus. Cause antecedentes sunt oppilatio, & uermes ad stomachū ascendentes, & subita mutatio de loco ad locū materię,

teria, ut in synanche, pleuresi, & peripneumonia,
quando materie transferuntur circa cor. Item pro
pter repletionem ciborum uel potuum, uel propter
superfluam euacuationem, uel propter puncturam
& morsum uenenosorum animalium. Sed talia ma
gis ad causam primitiuam, sicut timor in phleboto
mia, uel aspectus rei terribilis. Quibus autem facili
us accidit syncopis, sunt infantes & decrepiti &
conualescentes. Syncopis autem confirmata curari
non potest, quod significat uiriditas faciei & con
uersio, & distortio, quanto autem diutius perseue
rat syncopis, tanto deterior est & magis pernitio
sa, imò talis syncopis perpetua. Tremor autem cor
dis & syncopis in crisi, frequenter accidunt pro
pter resolutionem humorum & maxime dispersio
nem, unde si uirtus naturalis sit fortis, non est timē
dum, alioquin non est sine periculo. Signa autē tre
moris & syncopis eadem sunt in genere. in synco
pi multo tamen sunt fortiora, quia tremor cum for
tificatur syncopin facit. Syncopis autem diuturna
mortem infert. Syncopis cum nausea & abomina
tione & punctione in ore stomachi, ex stomacho ge
neratur. Quantum ad curam tremoris cordis, pri
mo euacuentur materie communes superfluentes
in uis ductuum, ut cum enematibus & potionibus.

Q 5 &

Et primo cum enematis. mollitiuis ipsarū materie
 rum Et uiarū ductuū incisuiis, subtiliatiuis, absterfi
 uis, lenitiuis, lauatiuis, Eteductiuis ut infra: Recipe
 Foliorū bliti, maluarū ana. M. i. mercurialis M. i.
 s. hordei excorticati ℥. i. florum chamomilæ, radicū
 alteæ ana. M. s. epithymi, arthemisiæ ana. quartam
 partem, foenugræci, cartami ana. ℥. s. ficuum sic-
 carum albarum numero. 3. uitellum oui numero. 1.
 casie fistulæ mūdæ ℥. i. benedictæ ℥. 3. sacchari ℥. i.
 olei liliorū alborum ℥. 4. salis ℥. i. Et fiat enema ut
 decet secundū artē. Istud enema sumat semel ante
 omnē medicinam. Lenitiuū per superius: Recip. Ca-
 sie fistulæ ℥. i. thamarindorū, succi uiol. succi rosa-
 rū ana. ℥. s. aquæ fumiterræ ℥. i. seri caprini quod
 sufficit pro portione misce. Istud assumat calidum in
 aurora, dormiat p̄ mediā horā post. Alia potio leni-
 tiua ut supra: Recip. Mānæ ℥. s. prunorū damasce-
 norū ℥. s. syrupi uiolati ℥. i. succi rosarū ℥. s. aquæ
 fumiterræ ℥. i. seri caprini quod sufficit pro portio-
 ne, capiat ut supra. Potio minoratiua: Recip. Casie
 fistulæ, rheubarbari, electuarij Indi maioris descri-
 ptione Mesue, amoto scamonio, syrupi de bizātijs,
 aquæ decoctionis iuniperi, seri caprini quod sufficit
 pro portione, rheubarbarū infundatur in sero horis.
 12. et dictæ expressioni reliqua addātur, Et fiat po-
 tio

tio ut decet. Istud assumat in aurora dieb. octo post
lenitiuū suprascriptū. Aliud minoratiuū: Recip. Pil.
de hiera simplici, Indarū, foetidarum amoto scamo
nio ana. ℥. i. agarici ℥. s. salis gemmæ gran. i. mi
sce et cū electuarij Indi sine scamonio quod sufficit
fiant pilulæ. 7. pro. 3. Scamonium non ingrediatur in
passionibus cordis, quia multum inimicatur cordi.
Istud assumat, ubi præcedens non debite solueret.
Diuersiuū: Recip. Florum chamomilæ, anethi, abro
tani ana. M. i. seminis iuniperi ℥. 2. roris marini. M.
i. s. fumiterræ. M. i. contūdantur omnia grosso mo
do, deinde misce & bulliantur in sufficienti quanti
tate aquæ usq; ad consumptionem tertiæ partis a
quæ, deinde usui reserua. Ista lotionē calida post
materiæ euacuationem lauentur crura, qua utatur
bis in hebdomada, et ea die qua non utitur lotionē,
utatur fricationibus à genu infra, stomacho ieiuno
cum panno suauiter calido, ita ut non inducant uio
lentiam. Digerantur dictæ antecedentes causæ, &
materiæ phlegmaticæ uentosabiles & genitæ ex in
digestione, & proprie stomacho & matrice. Syru
pus: Recipe Syrupi de bizantijs, de absinthio, o
xymellis simplicis ana. unciam. s. aquarum capil
lorum ueneris, apij, fumiterræ ana. ℥. i. Assumat
istum syrupum calidum in aurora diebus cōtinuis,

&

Et hoc per sex dies post assumptionē solutiui, post
 hunc syrupum assumat sexto die syrupum eradica-
 tiuum superscriptum. Efficacius à matrice prouocē-
 tur menstrua phlebotomijs, uentosis, cum scarifica-
 tionibus subtilianibus, aperientibus, prouocantibus
 menstrua efficaciter, suppositorijs, suffumigijs
 exhibitis. Confortetur stomachus, matrix, splen &
 epar. Ad syncopim prouenientem ex quibusdam
 uaporibus eleuatis à partib. uesicæ: Recip. Calamē
 thi, rutæ, sem. agni. casti, aristolochiæ rotundæ, dicta
 mni, cimini, anisi, spicæ celticæ ana. ʒ. 2. et ponātur
 super sumen. Ad pulsum cordis expertum: Recip.
 Melissæ, buglossæ, ana. M. 1. s. corticum citri, croci
 ana. ʒ. 1. gariophylorū ʒ. s. sachari albi lib. s. fiat
 syrupus. Confectio cordialis ualde nobilis in debili-
 tate cordis ex febre maligna: Recip. Margaritarū.
 ʒ. 1. s. hiacynthi ʒ. s. cinnamomi, gariophylorū, ma-
 cis ana. ʒ. 1. limaturæ auri & argenti ana. ʒ. 1. sac-
 chari albi lib. 1. distemperentur in aqua rosarum ʒ.
 8. fiat confectio in tabulis, cooperientur folijs auri.
 Confectio imperialis cuius proprietas est conforta-
 re cor, clarificare spiritum & sanguinem, hominē
 reddit hilarem, confortat omnia nutritiua mēbra,
 & cerebrum & neruos, & subuenit casibus synco-
 pis, & potest dari in omni etate & omni tempore,
 quia

quia parum excedit in qualitatibus: Recip, Rosarū,
liquiritiæ, cinnamomi, sem. cucumeris, melonū, cu-
curbitæ, citrulli ana. ℥. s. pinearū mundatarū, infu-
sarum in aqua calida, passularum ana. ℥. i. fistico-
rum ℥. s. candi. ℥. i. nuci muscatæ, gariophylorū,
ligni aloës, blattæ bisantiæ, mastiches, serici crudi,
rheubarbari electi ana. ℥. 2. folij, been albi &
rub. sem. ocimi, zedoariæ, daronici, zingiberis, ga-
langæ, calamenthi, cardamomi ana. ℥. i. santalorū
alborum et rubeorum ana. ℥. s. fiat electuariū, quod
possit sumi cum spatula cum sacharo lib. 3. eliqua-
tur sacharum in succo boraginis & buglossæ et ma-
ximè in æstate, & in hyeme potest dissolui in uino
optimo, & aromatizetur cum musci, ambre ana.
gran. 2. sed in æstate sufficit gran. 1. dosi eius est
cochlear unum paruum siue mane ante cibum, siue
uesperi. Et istam confectionem scribit Genti-

lis in tractatu de corde.

Finis libri tertij.

S I. Me

4
SIMPHO

RIANI CHAMPERII,

Liber III.

De ægritudinibus stomachi.

Cap. I.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



STOMACHVS intestinorum principium, est nervosus. A quo fit stomacho uerbum, quod & fastidio, & cum stomacho aliquid dicere uel facere dicimus, hoc est cum indignatione siue fastidio, & stomachosus quod facile indignatur ac cuncta fastidit, & stomachose, id est, fastidiose. Concoquit enim stomachus & immutat, paterfamilias uocitatus est, quia totum animal solus gubernat. Nam si ægrescat, uita in ancipiti est. Inter lienem & iecoris fibras ab utroq; latere comprehenditur, supra infraq; inter diaphragma & intestina medius situm habet. Hunc in anteriori parte omentum, à posteriori uenæ grandes fouent. A superiori parte in sinistram uergit, ab inferiori in dextram declinat, ita orificiorum suorum ratio exposcere

scere uidetur, ob id atram bilem in superiorem sui partem decurrentem, certo meatu à liene assumit. In imam uero à folliculo fellis, flauam bilem porro delatam accipit. Venterculus in medio tumet ac pendet, qui membranis tenuibus septo connectitur lieni, iecori, cordi, cerebroq; uenis, arterijs, neruis, unde in ictu capitis sæpe stomachi subuersio euenit. Exterior stomachi tunica carnosæ, stamineam uenam in latitudinem protendit, qua materia ciborum subigitur, & à digestionem superflua, dum sese astringit, secernere dicitur. Huic potentia *ἀποκριτική* nomen est. Interior rursus tunica tactus sensum habet, unde cibi apparentia prouenit, exterior uero cibum potionemq; mutat ac confundit, ea uis à Græcis *ἀλλοιωτική* uocatur, cui reliquæ obsequuntur uirtutes. Stomachus intus denticulatus est callo, in modum rubi ad conficiundos cibos decrecentibus crenis uersus orificia, nouissima asperitas ut scobina fabri, ab ijs fibræ, quæ ob similitudinē mesentericæ dicuntur, oriuntur, quæ inter uenam & neruū naturā habent, à quibus humor attrahitur, inde per maiores uenas ad iecur transmittitur, sed dum concoquit stomachus nec sui ignarus est, quoniā in fame ac siti protinus humorē attrahit, ac primus recreatur. Stomachi infirmitate animo
ruentes

ruentes deficientesq; subleuamus cataplasmatibus utendo, quæ stomachum confirmet, diaphœnicon et uino & farina, & croco, & aloë, & mastiche, aspersioibusq; ex absinthio & melino, & mastichino oleo, & nardino, & uino. At si stomachum exurant, miscenda sunt quæ refrigerent, ut colocynthis succus, uel lactuca, uel portulacæ, uel strychni, uel seris uel oxylapathi, uel omphacij, qui non solum refrigerat, uerum etiam obstruit, multumq; eos iuuat extremarum partium confrictio, quod si his melius habeant confluentes in lauacrum statim agendi sunt eis, qui frigus sentiat aliquantulum diatrion pipereon dandum est, aut ipsum piper album. Cum autem multa & frigida pituita in stomacho congesta fuerit & consequatur exolutio, stomachum hunc asperginus multum oleo calido, in quo fuerit decoctum absinthium, inde dandum mellicratum & hyssopus, uel aliquid simile in ipsum inuergendo oxymelle, & pipere, & diatrion pipereon aut diaspolicum medicamen, cunctaq; in uictu, quæ uim secandi habeant. Si stomachus fuerit infirmus, sunt superimponenda quæ possint ipsum confirmare, qualia sunt dactyli & uinum & farina, & crocus, et mastiches, et aloës, inuergendumq; ex absinthio, et melino, et mastichino et nardo et uino, et ammiscantur

tur

tur refrigerantia ut colocynthidis succus & lactuca,
 & portulacæ, & strychni, & intybi & ompha
 cij. Quod si inflammatum aliquid circa præcordia
 appareat ammiscendum etiam inuergendo, quod
 sedet, ut ex oleo chamæmelino & cyprino, adipe
 gallinæ, uel anseris & bdellio uel amoniaco, & id
 genus alijs in cataplasmatibus, & apij semine & telis
 et althææ & chamæmelæ flores, quæ composita uim
 habeant parandi tenuitate sua & amaritudine &
 contractione. Medicamen faciens ad inflationem
 & languorem, & communiter omnem stomachi
 dolorem: Succus papaueris albi ℥. 2. piperis, castorij
 ana. ℥. 1. petroselinij ℥. 4. nardi syriaci ℥. 1. terito in
 puluerem potum prebe in cubili, & ad cubile quæ
 bene ualent plus dato, doloris expers est, & facit
 concoctionem in primis cœliacis mulieribus, necnō
 uiros cœliacos, inflationes & cruditates, & febriū,
 & hypochondriorum dolores, & incruditatum,
 febres & tusses, laterum dolores, & spasmata, &
 ubi opus sit citare urinam. Alia antidotus optima:
 Nardi, spicæ, piperis ana. unc. 1. Casiæ fistulæ, costi
 ana. ℥. 2. da ex aqua noctu, cōfertq; nō solū stomati
 cis, sed etiam epaticis, & nephreticis & audacter
 utere. Aliud præsentaneū remedium pluris experi
 etiæ māsūm: Heleni unc. 4. marathri sem. unc. 3. pi
 peris

R

peris

peris unc. 2. petroselini sem. unc. 1. mellis attici cru-
 di optimi lib. 2. quod si non habeatur, alterius dispu-
 mati. Ego autem adieci erucæ semen ad unc. 2. &
 omnino successit egregie. Aliud ad stomachum: Pe-
 troselini macedonici, sem. cumini ana. unc. 4. capi-
 tur à ieiuno, & in uespera cum pauco uino diluto.
 Hæc Alexan. Item stomacho frigido iuniperi sem.
 piperis ana. unc. 2. zingiberis 3. 4. petroselini 3. 1.
 mellis quantū satis sit utere, p melle sacharū adieci.

Secundum Pœnos & Arabes.

Stomachus in duas diuiditur sectiones, sci-
 licet os stomachi & concauum eius, &
 inter utranq; est differentia in substātia
 & actione, quoniam os stomachi est plures habens
 numeros & plures sensus. In actione quidem, quo-
 niam quamuis ambæ diuisiones simul has duas effi-
 ciant actiones, scilicet appetitiuam & digestiuam.
 Nam magis proprium interiori parti stomachi est
 digestio, & magis proprium ori eius est appetitus,
 & interiori eius est etiam appetitus, ueruntamen
 est minor appetitus ori stomachi, & os stomachi di-
 gerit, ueruntamen minus quā interior pars. Hoc
 autem membrum infirmatur egritudinibus multis
 communiter & proprie. Cōmunes autem sunt sicut
 reliquorū mēbrorum similiū partiū & officialiū &
 solutio

Solutio imparis. Et accidūt in eo caliditates, quādo infirmatur p malitiā cōplexionis. Quod aut accidit in eo ex ægreditudinib. officialib. est sicut phlegmon, aut apostema phlegmaticū quod dicitur molle, aut apostema melancholicū, aut almesira, aut solutio cōtinuitatis sicut incisio aut foramē. Et istæ ægreditudines quidē cōmunicant stomacho & alijs membris. Quæ uero stomacho et ori eius, sunt propriē destructio digestionis, & eius diminutio et malitia, & destructio appetitus, & appetitus caninus & singultus et nausea, uomitus, et quibusdā aduenit syncopis proportionata ad stomachū propter læsionem oris stomachi, et cōsequitur eos spasmus, et subeth, & epilepsia, et inquietudo. Et nos quidē iā uidimus quosdā febriētes, quos cōsecutus est spasmus subito, præter quod appareat in eis aliqua significationū quibus significaretur illud, postq̄ ergo euomuerūt cholera, euaserūt statim, uerūtamen omnes istæ ægreditudines nō accidūt nisi quādo alia læduntur membra, & læditur stomachus læsione eorū & appetitus cōmedendi lutū & carbones & quæ sunt illis similia plurimū accidit cū læsione membri. Et fortasse putrefit aliquid in stomacho, & facit accidere paucitatem delectationis & nauseā, & fortasse adheret in stomacho humor in pāniculo intrinseco eius similis

R 2

glutino,

glutino, & facit accidere syncopin, & fortasse nas-
tat & attrahit uomitum. Cōstantinus: Incipiamus
à meri quod ab ore cibum ad stomachū ducit. Istud
meri magnum iuuamentum est corporis, cum por-
tet cibum ad stomachum & potum, & patitur tri-
bus modis, uel ex mutatione cōplexionis, uel ex apo-
stematē, uel ex uulnere, unde eius actio mutatur &
transglutiendi usus aufertur. Desiderium cibi &
potus esse intelligimus sensum stomachi exinaniti,
in uenis recepta fugientibus. Corruptio desiderij
fit tribus modis: Ex humoribus crudis uel choleri-
cis ori stomachi dominantibus, uel ex ablatione uir-
tutis desiderabilis & sensibilis mortificatione sui,
uel ex corruptione mentis appetitum nullius cibi
necessarium intelligentis. Appetitio canina tribus
modis fit: Vel ex frigida cōplexione oris stomachi
dominante, uel ex acidis humoribus ibidem coadu-
nantib. uel ex ultimitate exinaniendi, quam patitur
uis corporis ex frigida complexione, de aliquo aci-
do humore, nimiam sequi solutionem est uidere, un-
de corpus debilitatur, & plusquàm digerat, man-
ducat, omnis enim digestio ex calore fit temperato
uel nimio. Cum ergo aliquis hac laborat infirmita-
te, quia caret calore plusquàm digerat, potest man-
ducare. Cum enim ex defectione contingit uirtutis

con-

tingit uirtutis contentiue quod manducatur in stomacho non digeritur, sed ferè sicut intrat crudū & indigestum, itidem emittitur per secessum. Et alia quando quidam homines appetūt irrationabiliter, sicut cretam, lateres, carbones, & similia corpus non adiuuantia, & hæc sæpe fiunt in mulieribus frigide nature, & prægnatibus maxime, quod fit ex malis & putridis humoribus stomachum inuiscantibus, uel ex alijs membris ad ipsum confluentibus, sicut menstrua in mulieribus, quæ dum concipiunt ipsarum menstrua ad stomachum ueniunt. Diuersitas huius appetitus, secundum qualitates humorum in stomacho se coadunantium consideratur. Et alia quando rursus bibendi aufertur appetitus, quod similiter tribus modis efficitur, uel ex nimijs & humidis humoribus stomacho dominantibus, uel ex defectione uirtutis sensibilis, uel ex corruptiōe mentis. Aliquando sitis augmentatur ex complexione calidorum humorum membrorum pectoris dominantia, uel epatis, siue ex apostematibus calidis in eis. Et aliquando fit eructuatio extra temperamentum nature, cuius causa uentositas inflatiua est, quam per os expellit natura, uentositas hæc est ex stomachi defectione, & stomachi defectio ex mala complexione, uel quorundam humorum dominatione.

R 3 Si

Si humores sint calidi, fumose ructuabitur, si frigidi, acide. Acida ructuatio quatuor ex causis est, ex frigidityte stomachi, uel ex adunatione cibi, & multitudine sui, uel ex natura frigidissima. Vniuersaliter causa ructuandi est ex defectiōe caloris in stomacho, ne cibo dominetur & digestioni, sicut uidemus in paruo foco si multa ligna et uiridia apponamus. Aliquādo aut fit singultus, qui malus est motus uirtutis desiderantis expellere rem nociuā, qui multis modis fit; De repletionē, & de inanitione, de corruptione cibi infra stomachū, & sui permutatione in pūgitiuas qualitates, de frigidityte oris stomachi, de uentositate inflatiua stomachi ex repletionē, uel ex multis humorib. humidis, uel ex multitudine potus & cibi. Et quicūq; continuā uult custodire sanitatē stomachū custodiat, ne sibi necessariū cibū prohibeat, neq; plus det q̄ digere ualeat. Antiqui parū comedere praeceperunt, ut calor naturalis dominetur suae digestioni. Si enim comedamus hēc, quia calor naturalis nequeat digerere, fastidiū generatur. Fastidiū magnū est nocumentū ad sanguinē corrūpendū, & morbū generandū, quod si sit ex malis cibis grossis generantib. chimos grossos, morbi duri et diuturni generātur. Et cū homo ante q̄ cibū accipiat abominationem patiat, mali chimi in stomacho

cho esse intelliguntur, quæ si sint in spaciositate stomachi, facile cū uomitu possunt expelli. Si cōclusi in suis pelliculis, abominatio fit inde, neq; uomitum facit, quia humores illi inclusi sunt et inuiscati ori stomachi, si sint calidi generāt sitim, et fumose faciunt ructuari, si sint frigidi appetitus nimius fit sine siti. Et bonum est corpori si uomitus nō necessarius sibi sit, et si necesse habeat ut secūdū crīsim fiat. Est aut uomitus cū os stomachi moueatur in expellēdis eū grauantib. uel pungētibus cibis, siue humoribus, alī quando fit uomitus ex stomachi defectionibus, cum retinere cibos uel humores non ualeat quos natura sursum eleuat, cū pars stomachi inferior ore sit fortior, uel inferius natura deprimat, cum os stomachi sit fortius parte inferiori. Et in stomacho aliquando est inflatio, quæ est aēr non coctus, frigidus & grossus, nascens proprie in stomacho de inordinata diæta. Aliquando in capite fit uentositas, quia uēti motio naturaliter petit superiora, nascitur & tunc in toto corpore, maxime in hydropicis. Est autem inflatio uel de humoribus crudis, uel melancholicis, sed differunt adinuicem, quia de crudis humoribus mollis & humida, de melancholicis sicca & dura. Auicenna: Stomachus nutritur tribus modis, unus est quo fouetur cibo adhuc in

eo existente. Et secundus est eius quod ad ipsum uenit de nutrimento in uenis. Et tertius est eius quod ad ipsum effunditur tempore famis uehementis ab epate, ex sanguine rubeo puro, & nutrit ipsum. Et usus medicinarum & ut assuescat stomachus uti adiutorio medicine in operationibus suis, ex causis est ægritudinum stomachi. Et stomachus quidem uehementis sensus paratus est ladi & impediri à qualibet causa generatiua humorum, & non est aliquid ita uaporosum ut fructus. Et scias quod ægritudines stomachi quando prolongantur, perducunt ad raritatem texturæ uillorum eius, & fit difficile succurrere et medicari. Cumq; autem bonitas adest gustus, et est sanus, non eligit saporem supra dulcem. Et plurimæ ægritudines stomachi sunt frigidæ, & color stomatichorum est plumbeus. Maliciam complexionis calidæ stomachi significat sitis, nisi superfluat & deiciat uirtutem. Et malicia complexionis frigidæ stomachi, quandoq; perducit ad hydropism & iliacam. Et cura malitiæ complexionis in qualitatibus actiuis facilima est, quia facillime inuenimus medicinas contrarias eis uehementis uirtutis. In passiuis uero est difficilima et proprie complexionis sicca. Et cum materia ægritudinis stomachi est ambigua, tunc non est quod magis conferat quàm

quàm hierapicra, sed cum eius malitia est sine materia, tunc ipsa nocet calido & sicco. Et quandoq; positio uentosarum super stomachum in doloribus frigidis, maximum affert iuuamētum. Et aloë quidem est conueniens in euacuationibus stomachi. Et scamoniū est nociuū stomacho & inimicū ei, non igitur audeas dare ipsum nisi cum necessitas adest. Et aqua ferri mineralis, aut in qua extinguitur ferrū ignitum multotiens est adunatiua stomachi humidi hominis. Et scias quod debilitas stomachi fortasse est causa omnium ægritudinum corporis. Et deterē or debilitas stomachi est illa, quæ contingit in rarificatione texturæ uillorum eius. Et frigus quidē uehementius pertinet ad appetitum. Et omnia olea et unctiosa, & proprie butyrum prosternunt appetitum. Et fames secundum plurimum est à superfluitate caloris in corpore toto, & extremitatibus eius. Quandoq; fit fames propter uermes & serpentes magnos, cum cito incipiunt uenire ad comesta, & appropinquant eis, & dimittunt corpus & stomachum, famelica. Et multotiens caninus appetitus perducit ad bolismum & subeth & mortem. Et est bolismus fames uaccina, & est fames membrorum cum satietate stomachi, sunt igitur mēbra famelica ualde indigentia nutrimento, & stomachus

R 5

chus

chus respuens ipsum. Et scias quod digestio est fundi stomachi, & appetitus oris eius. Et quotiens festinat digestio, festinat descensus, & si tardat, tardat. Et cum medicaueris apostemata calida stomachi, tunc caue ne in potu sumas solutiuum sorte, aut quod uomere facit, nam administratio uomitus error est. Et ille qui uomit saniem ex stomacho suo, est ad desperationem propinquior quam ad spem. Et subuersio stomachi est motus expulsores, cui non associatur motus expulsi. Vomitus uero est ut associetur motui, facto ab expulsores motus expellendi ad exteriora. Et nausea est dispositio stomachi quae quasi suscipit hos motus, & est quasi declinatio ad hos motus. Et uomitus quidem sanguinis cum egreditur à necessitate, portendit mortem. Et uomitus quidem purus est malus, cholericus quidem significat superfluitatem caliditatis, & phlegmaticus superfluitatem frigoris simplicis puri. Et uomitus diuersorum colorum, deterior est nigro. Et sanior quidem uomitus est permixtus, medijs in grossitate & subtilitate. Singultus est motus diuersus compositus, sicut spasmus constrictiuus cum tentione dilatatiua in ore stomachi, aut in toto corpore eius, aut meri, & est motus debilior motu uomitus, & quasi motus ad uomitum debilis. Et
si hoc

si homo habuerit singultum ex materia, & accidit ei in seipso sitis, eius singultus resoluitur. Rasis: Aegritudines stomachi sunt debilitas digestionis, & malitia istimbrē, paruitas appetitus, et superfluitas eius & dolor qui comouetur post comestione, et uomitus eius quod comeditur, et apostema & ulcera.

Quid Neoterici de hoc sentiant.

Stomachus diuisus est in duas partes: prima dicitur os stomachi, id est meri siue ἐσθλας. Secunda uero inferior eius est concauitas. Hæ autem partes differunt inter se, scilicet in substantia & actione. In substantia, quoniā os stomachi, id est substantia meri magis est lacertosum & neruosum. Concauitas uero stomachi est magis carnosā & minus neruosa. Et hoc sic intellige, quia in meri minus est de carne & plus de neruo et ligamento ex quibus est lacertus. In concauitate uero stomachi minus est de ligamentis & neruis, & plus de carne, & quanto plus descendit tanto plus caro augmentatur propter digestionem. In actione uero differunt, quia quamuis utraque pars digestionem efficiat, & appetitum, pars uero superior plus habet de appetitu, & minus de digestionem. Concauitas econuerso. Et quoniā lacerti, qui mouēt meri

meri ad attrahendum, ortum habent à primis spondilibus colli, & dicuntur longitudinales, quia per eos fit attractio, & actio transglutiendi, quæ est naturalis actio ipsius stomachi. Vomitus autem nō est actio naturalis, imò fit per quosdam lacertos, quæ non sunt intra substantiam meri, sed sunt in quadā pellicula exterius ipsum inuolvente, & dicuntur latitudinales, per illos enim fit expulsio superflui illuc decurrentis. Passiones autem meri siue oris stomachi multæ sunt & diuersæ, ut est defectio transglutiendi, corruptio appetitus uel desiderij, caninus appetitus, bolismus, ablatio appetitus uel irrationalis, dolor præcordiorum, sitis, singultus, uomitus, eructuatio, natatio cibi in ore stomachi. Passiones uero partis inferioris stomachi sunt, eructuatio, singultus, fastidium, abominatio, uomitus, inflatio stomachi. Cum ergo utraq; pars stomachi diuersas passiones incurrat, primo dicemus de aliquibus passionibus meri. Nam de omnibus dicere mare esset magnum. Incurrit ergo meri morbos consimiles & officiales & communes, sicut omnia genera apostematum & oppilationes, quando coarctatur à spondilibus colli dissociatis, aut propter apostema membri circumstantis, aut propter superfluum fluxum sanguinis, hæc enim omnia impediunt officium

cium transglutiendi, & insuper nocumentum acci-
dit in lacertis latitudinalibus, quæ etiā adiuuant il-
lam eandem operationem, ex eo quod longitudina-
les attrahunt superius, latitudinales uero inferius
comprimunt. Harum passionum causæ per sua sig-
na inuestigantur. Signa autem morborum consimie-
lium per se patent propter accidentia malarū com-
plexionum. Apostemata uero tactu uel uisu cogno-
scuntur, uel per sua signa. Coarctatio autem pro-
pter dissociationē spondiliū, per dolorē colli mani-
festatur. Destructio seu ablatio appetitus eiusq; di-
minutio, seu famis, quæ est secundum Galenum cibi
indigentia, seu desiderium calidi & sicci, sicut si-
tis est indigentia potus, & desiderium frigidi et hu-
midi, cuius organum os stomachi natura instituit,
sunt enim species nocumenti appetitiuæ actio-
nis. Electuarium cum aqua citoniorum, quod facit
appetere cibum: Recip. Aquæ citoniorū lib. 3. mel-
lis lib. 2. aceti fortis lib. 1. s. decoquātur super pru-
nas & accipe spumam eius, deinde sumantur zin-
giberis 3. 4. trium piperū ana. 3. 2. s. terantur cū
prædictis, & decoquatur donec fiat sicut substantia
mellis, & detur ex eo cochlear unum, detur ieiuno
ante prandium per duas horas. Trifera mundifi-
cans stomachum à cholera et phlegmate, & soluit

Rene

uentrem cum facilitate, & facit appetere cibū: Re-
 cip. Myrobalanorū citrinorū, chebulorū, emblicorū
 & belliricorū ana. 3. 10. liquiritiæ rasæ 3. 5. tur-
 bith albi mundati 3. 6. zingiberis 3. 4. cinnamomi,
 beil ana. 3. 2. terantur & cribellentur, & liniātur
 cum oleo de amygdalis dulcibus, & confice cū mel-
 le, & detur ea potio integra 3. 3. aut. 4. cum aqua
 calida. Medicamen expellens appetitum boli/mi:
 Recip. Cardamomi maioris, cubebarū ana. partem.
 1. sachari albi partes. 3. dosis sit aureus. 1. Pilulæ e-
 ducentes phlegma acetosum de stomacho, conue-
 nientes appetitui canino ex frigiditate cum humo-
 ris uitio acetosi: Recip. Turbith albi & mundi, aga-
 rici ana. 3. 1. spicæ 3. 1. confice cum oximelle scyl-
 litico, & dentur, deinde detur diatrionpipereon,
 diaciminum quod digerit & consumit humorem
 acetosum, & alterat discrasiam stomachi frigidā.
 Cum uero adest fluxus, quod est plurimum, tunc cō-
 ueniens est confectio electuarij alephanginæ, quod
 fit in tempore æstatis. Cibus autem expertus est ex
 raphano, uitellis ouorum & unctuosus & pinguedi-
 nibus multis, consumit humores, aufert discrasiam
 frigidam, & sensum obtundit seu appetitum. Ele-
 ctuarium curans caninum appetitum, & corruptū
 desiderium: Recip. Passularum enucleatarum 3. 6.
 cupu=

cupularū glandium 3. 2. s. anisi 3. 3. mirrhæ, myro
balanorū nigrorū, emblicorū et belliricorū ana. 3.
7. scorie ferri infusæ in aceto exiccatae et torrefa-
ctæ 3. 8. cardamomi maioris, cubæbarū ana. 3. 2. sa-
chari taberzet quod sufficit, dosis est 3. 1. cū aqua
anthos stomacho ieiuno. Pilulæ præseruātes stoma-
chū ab omni læsione intrinseca, nec permittūt putre-
fieri humores in eo, imò abstergūt et mundificāt ru-
gas et parietes, et qui assiduat usum earū dieb. singu-
lis, permanebit illesus à doloribus stomachi, nec à
doloribus capitis uexabitur unq̃, et nihil est oculis
salubrius, et est medicina matricis uitiosæ: Recipe
mastiches 3. s. aloës electi 3. 10. agarici boni 3. 3.
conficiantur cum succo altiliæ uel cum succo betho-
nicæ, dosis est. 2. pilulæ uel. 3. quando itur dormitū,
et possunt recipi secundū modū uoluntariū usq; ad
8. aut. 9. uel. 12. Electuariū cōfortās cor, cerebrū et
totū corpus, prouocat mēstrua, et est exptū contra
putrefactiones in stomacho, et subuenit apostemati-
bus stomachi, nec patitur aliquā putrefactionem in
eo: Recip. Triū piperū ana. 3. 1. gariophil. 3. 2. ari-
stolochiæ longæ, zedoariæ, uiol. bethonicæ ana. 3.
3. salis gēme 3. 2. myrrhæ electæ ad pondus omni-
um, confice cū syrupo de spica, dosis est à drach. s.
usq; ad 3. 1. s. Medicamē impatoris in siti uehemē-
ti: Re-

ti: Recip. Aquam frigidam et irrorare desuper acetū
album purum quantum tolerare poteris, & da bi-
bere stomacho ieiuno quātū est cupa. Itē epitheme-
tur stomachus, cor & epar ex puluere camphoræ,
santalorum cum succo rasuræ cucurbitæ, aqua ro-
sarum & pauco aceto, & cataplasmetur cum fo-
lijs salicis, uitis, in aqua rosata. Itē fiat iulep de suc-
co limonum, uel de cucurbita, & teneat in ore cry-
stallū. Syrupus extinguens sitim ex causa calida &
sicca: Recip. Cichorij, endiuie, epaticæ, lupuli, bora-
ginis, acetosellæ ana. unc. i. uiolarum, rosarum, flo-
rum nenupharis & cucurbitæ, lenticularum, aquæ
florum uuæ ana. ʒ. ʒ. hordei mundi. ʒ. i. prunorū,
sebesten, iuiubarum ana. numero. 20. seminum fri-
gidorum ana ʒ. i. psilij integri, sem. citoniorum a-
na ʒ. ʒ. sachari albi lib. i. succi granatorum muzo-
rum lib. s. camphoræ ʒ. s. croci gran. ʒ. sumat cum
aqua frigida. Electuariū nobile cōso-
tās stomachū: Recip. galægæ nucis muscatæ, cardamomi ana ʒ. 2.
anthos ʒ. s. mēthæ, albasce ana ʒ. 3. syrupi de cor-
ticib. citri quātū sufficit. Cerotū filij zachariæ con-
fortans stomachū: Recip. Cere mundæ unc. 3. tere-
bēthine unc. 2. s. olei nardini ʒ. 2. liquefac cas, et su-
pasperge puluerē: Recip. Myrrhæ, mastiches, aloës
ana. ʒ. i. ros ʒ. ʒ. peoniæ, castorei ana. ʒ. 2. anisi. ʒ.
ʒ. calas

3. calamēti 3. 7. gariophilorū, nucis moschatæ, car
damomi, calami aromatici, rheupontici ana unc. s.
Cōfice ut bene stomacho adhæreant. Pilulæ restrin
gentes uomitum: Recip. Myrrhæ, mastiches, sangui
nis draconis ana 3. 2. antheræ 3. 1. confice cum
succo menthæ, & da mane & sero. Confectio sy
rupi de berberis conueniens ad idem: Recip. Ber
beris, spodij ana unc. s. uuæ acerbæ unc. 2. cichorij
M. s. sacchari lb. 2. da ieiuno stomacho cum aqua
mastiches. Ad uomitum infantium: Recip. Succu ci
toniorum, menthæ, uini pontici ana, æquales par
tes, fac bullire, & misce in eis mastiches, corticum
thuris ana unc. s. spicæ, cinnamomi, gariophil. nu
cis moschatæ, galliæ mosch. ana 3. 2. & infusa bir
rha scarletæ bene calida applicetur. Contra debi
litem digestiue stomachi, & consequenter epas
tis, & renum caliditatem, ubi sunt hæc accidentia,
uidelicet, debilitas digestiue stomachi, frigida,
phlegmatica, dolor assiduus quasi quedam uentosi
tas in eo generata quæ sepe & minuit & augmen
tat, epatis caliditas excessiua complexionalis ma
gis quàm materialis, descensus humiditatis siue ca
tarrhi à capite, dolor in eo aggrauatiuus ex causa
frigida, inflammatio renum compositionalis ma
gis, dolor in eis ex causa eadem. In tali casu ualent

S remedia

remedia sequentia. Digestium facile: Recip. Syrupi de absinthio ℥. i. mellis rosati colati ℥. s. aquarum absinthij ℥. s. cichorij, capillorū ueneris ana ℥. i. s. misce. Assumat calidum & non tepidum in aurora decem diebus continuis, stet postea ieiunus horis tribus, dormiat de super horis duabus. Solutium facile: Recip. Pilularum alephanginarum, de rheumbarbo, agarici electi. Agaricus minutim incisus in frusta ponatur in infusione oximel. simplicis per horas 10. deinde ex ipso cum alijs fiant pilulæ 7. pro 3. Istarum pilularum accipiat usq; ad quinque, aut tres mane in aurora, & hoc in capite quinq; dierum, ita quod cum assumpserit 5. diebus de syrupo, accipiat pilulas, deinde alijs quinq; uicibus accipiat de syrupo, ut supra, & demum de pilulis. Confectio stomachi & epatis confortatiua: Recip. Specierū diarrhodō Abbatis, aromatici rosati descriptione Gabrielis ana 3. 2. s. sacchari albißimi unc. 12. fiat confectio solida in morsellis, 3. 3. pro morsello cum aqua absinthij & endiuia, accipiat omni die unum morsellum in aurora, & de sero ante coenam per horam alium, & sic continuet octo diebus iteratis illis duabus purgationibus dictis supra. Vnctio stomachi confortatiua: Recip. Oleorum mastiches uncia una, absinthij,

thij unc. 1. s. citoniorum, anethi ana unc. s. pulueris absinthij, mastiches, menthæ ana scrupulum unum, gariophilorum scrup. s. calami aromatici ꝑ. 1. galliæ moschatæ ꝑ. s. cinnamomi ꝑ. 1. corallorum rubeorum, coriandrorum præparatorum ana ꝑ. 2. & cum modico ceræ fiat unguentum pro stomacho, ungatur stomachus mane & sero ante pastum horis duabus, superponatur deinde pannus calidus, hac unctione utatur facta prima purgatione. Vnctio epatis confortatiua, & eius caliditatis remissiua: Recip. Oleorum de spica unc. 1. rosati unc. s. pulueris santalorū rubeorum drach. 1. spodij scrup. 2. & cum modico ceræ & aceto, fiat unguentum, ungatur epar ut de stomacho dictum est, & superponatur petia non calida, sed tepida. Præcedant tamen hanc unctionem purgationes dictæ.

Pilule stomachi confortatiuæ, & caliditatis epatis remissiua: Recip. Trochiscorū de spodio drach. unam, trochiscorum de rosis descriptione Mesue drach. 2. cum syrupo de absinthio fiant pilule septem pro 3. postquam completæ fuerint purgationes & confectiones dictæ, incipiat uti his pilulis diebus decem continuis quinq; in aurora, stetq; ieiunus horis tribus, & dum uadit dormitum lōge à cœna accipiat tres. Stomachi et epatis cōfortatiuū.

S 2 Recip.

Recip. Summitatum absinthij quod sufficit pro rasi-
olo, passularum ad corinthios, tantundem, pulueris
mastiches, coriandrorum preparatorum, endiuie
ana quantum libet, absinthium minutim incidatur
& non pistetur, deinde omnia simul incorporen-
tur, & fiat cum paucis pastae subtilissime rasiolus.
Assumat de hac mixtura octo diebus continuis ma-
ne, & etiam post ipsius absumptionem capiat unum
cochlear passularum ad corinthios, deinde sumat
uini mediocris caloris unc. 3. deinde stet ieiunus ho-
ris tribus, postea prandeat. Vnctio familiaris ad
renum caliditatem excessiuam: Recip. Oleorum ne-
pharis, rosati, uiolati ana unc. s. santalorum rub.
3. i. cinnammomi 3. s. aceti unc. s. & cum modico
cerae fiat unguentum. Ista unctione unguantur re-
nes sero cum uadit dormitum, superponatur pan-
nus lincus tepidus. Et eructuatio si multiplicetur,
digestionem corrumpit, & quando minoratur in-
flat stomachum, & confert ei masticatio thuris &
cimini, & quando multiplicatur, utatur uomitu an-
te cibum, & electuario diapipereon, & zingibere
condito, et balneo. Singultus aut fit propter gros-
sam uentositatem, aut propter rem mordicam os
stomachi, aut propter apostema in epate, aut pro-
pter euacuationem superfluam. Et signa eius quod
accidit

accidit à mordicatione oris stomachi sunt, quod fit post comestionem rei calidæ, aut uomitus cholerae rubæ, aut uiridis, aut nigræ. Et cura eius est trahere aquam calidam aliquotiens, deinde sumat oleum amygdalarum, aut sumat de butyro recēti paulatim, & si sedatur bene, & si non, administra uomitum dando in potu syrupum acetosum et aquam calidam, & euomat eum multotiens, deinde da ei oleum & sorbitiones lenes factas ex amylo & oleo amygdalarum, & saccharo. Et quando est ex uentositate grossa, & accidit infantibus post repletionem lactis, tūc conferunt eis ameos, zingiber, calamentum, mastiches, quorum sumatur puluis pondere 3. i. s. cum uino puro. Et eius qui fit ex apostemate, epate calido, signa sunt. febris acuta & nausea. Et cura eius est phlebotomia basilica, & sumere in potu aquam hordei, & granatorum, & emplastretur epar santalis, & aqua rosæ & aceto, & camphora, & sumere in potu aquam solani, & endiuie bullitam cum syrupo acetoso. Et fit singultus post diarrhoeā et solutionem uētris & eius debilitatem, & plurimum eius curationem nō habet, & est signum malum, & curatur secundum dispositionem sumendo in potu lac semper, & sorbitiones lenes, & uinum plurimæ commixtionis,

S 3 & aquam

Et aquam carnis. Confectio Hippocratis rectifi-
 cans malam cōplexionem stomachi frigidā, expel-
 lens uentositatem, Et liberās à singultu: Recip. Cor-
 ticum fisticorum exteriorum, costi amari, castorij,
 petroselini ana ʒ. i. balsamitæ, calamenti, anisi, ma-
 stiches, spicæ ana ʒ. 6. aristolochiæ ʒ. 3. Cōfice cū
 oximelle scyllitico, Et da ʒ. i. cum aqua sisymbrij.
 Et semen rutæ cum nitro, Et aqua mellis curat sin-
 gultum ex uentositatibus grossis, quæ sunt ex gulo-
 sitate. Et decoctio squinanti, Et corticū fisticorum
 cum qualitate liberat ab eo. Pilulæ singulares con-
 tra singultum calidum, Et humores acutos ascen-
 dentes ad stomachum ex epate, Et maliciā eius ca-
 lidam Et siccam, Et febres: Recip. Spodij, seminis
 endiuie, portulacæ, ligni aloës ana ʒ. i. s. pulpæ
 thamarindorū ʒ. s. raueseni electi ʒ. i. cōficiantur
 cum aceto. Emplastrum ad idem: Recip. Tri-
 um santalorum, spodij, farine hordei ana, partes
 equales, confice cum succo semperuiui. Empla-
 strum contra singultum ex grossis humoribus, Et
 delet dolorem eius: Recip. Galangæ, baccarum lau-
 ri, aristolochiæ rotundæ, rutæ, gentianæ ana drach-
 mas tres, myrrhæ, castorij ana drachmas duas, ga-
 riophilorum drach. 5. rosarum drach. 2. mastiches
 unc. 5. confice cum aqua mellis sampsuchi.

De

De ægritudinibus epatis.

Cap. II.

Sicut habet traditio Græcorum &
Latinorum.

IEcur à dextra parte est sub præcordijs,
& in quatuor fibras secatur. Dicitur &
iecinus. Huic membro sanguinis origi-
nem recentiores Physici attribuere, quod si uali-
dum est, aucto sanguine augeri membra uidentur,
inualidū, decrefcere non dubium esse, si extenuata
in nobis membra sunt, eo conualefciente facile im-
plentur. Plato uero noster: Iecur nobilissimū mem-
brum esse putauit, in quo diuinationis gratiam col-
locauit, quo priuato nec euident quicq̃ fit uaticini-
signum. Iecur inter exta proportionē maximū est,
sub præcordijs à dextra parte suspenditur sangui-
ne & spiritu refertū. Intrinsecus cauum, extrinse-
cus gibbosum, è regione lienis, uentriculo leniter
prominens insidet, quē fouet, in uiuēte magis pen-
det. In eo multiplex uis est, nam attrahit, retinet, cō-
coquit, digerit et expellit, succum enim omnē in sa-
niem, in bilem, ac atram bilem digerit, eæ potētiae
ex tēperato cordis calore nutritiuae uirtuti deser-
uiunt congenitæ. Iecinori uarij deputātur morbi.

S 4 Nam

Nam infirmitate, & inflāatione, erysipelatibus, (dicitur enim erysipelas à Græcis cum super inflāationē rubor ulcus ambit) et schirris & abscessibus corporis, quæ apostemata nominantur, & ulceribus, & oppilationibus capitur. De infirmitate igitur ipsius primo dicendum, quæ epaticos propriè languentes appellare consueuimus. Si itaque succos exhaurit secessus, humidiora uero in iecur redeant, aut in totum uenter uacet morbo, existimanda est iecoris uis ad trahendum infirma. Si uero simili ablutioni recentis carnis uideantur excrementa, alteratiua & sanguinis effectrix dicenda est. Verum si ob calidam distemperantiam, primū quidem putrefactiones fient humorū. Deinde carnis ipsius iecoris, & compunctiones uentris malè olentes, bilis admodum crassa & affluens calore, ut in pestilentibus febribus apparet. Contabescito autem iecore, totum contabescit corpus, & febricitant languentes, appetitumq; amittunt, & feculentum hauriunt, & bilem uomunt. Si frigida uero fuerit distemperantia, neq; perpetuæ excretionēs, neq; multæ fiunt, inueterescit morbus, diebusq; aliquot fluit confertim uenter, malè olens uelut lutum sanguinis crassi, similis atræ bili, multos uariosq; colores frigida ostēdit distemperantia. Cum
obscura

obscura subest febris constansq; facies, magis appetentes sunt cibi, quomodocunq; tales fuerint distemperantiæ ubi ariditas subest, excrementa docent, sitis adest si paucitas sumitur, cum humiditas, humidiora & plura minusq; sitiunt. Inflammato autem iecore, communiter quidem omnibus dolor oritur in dextris præcordijs sursum penetrās ad iugulum usq; humerumq; partis eiusdem. Deorsum uero ad latus usq; quod nothum uocant, & acuta febris, & tussis arida, & sitis, & appetitus amissio, spirandiq; difficultas, & lingua primo quidem rubra uidetur, post uero atra, uomuntq; bilem, & uenter astringitur, signa ferè sunt quæ pleureticis. Cum autem erysipelas constiterit in iecore, inflammationes intenduntur, & exæstuant exiccatioq; & marasmus insurgit. Qui simā iecoris partem inflāmatam habent, nauseant, & uomunt, appetitumq; amittunt, & inflammationes intenduntur, & consternantur anima interclusa frequēter refrigerantur, ut hinc inter cutem morbus sumat initiū. Cum uero iecoris connexa inflammantur, præterea quæ dicta manifesto turgent uisutactuq; si tenuior obscuriorq; fuerit, iubebimus quā maximè respirare, quod si in dextris præcordijs dolor appareat, iecoris mediocris existimanda est inflammatio, sin

S S iuxta

iuxta positum subiectorum musculorum, spaciosus inflammationis tumor uideatur, nihilq; iam dictorum affuerit, illos ipsos inflāmari intelligimus, grauitas in tenore doloreq; sentitur in dextris præcordijs citra tumorem ac febres, oppilationem indicat uenarum, qua in parte æstuant, inflammatione uero uersa in apostema, dolor ipsis cū tenore augetur, inexpectatiq; fiunt rigores, neq; in sinistrum latus potest lāguens inclinari impensius dolente iecore. Confracto autem apostemate, aut per urinam, aut per uentrem excremētum euadit suppurationibus refertum. Si uero in affectionem secabilem tumor deciderit, dolores cōminuuntur, tumor certē euidēs cum duricie, at corpora circumattenuantur, procedente porrò tempore cognoscere difficile est quod aqua intercus fieri incipiat, uniuersaq; præcordia sub humore conteguntur. Ad calidam iecinoris distemperantiam utendum refrigerantibus, & confirmantibus mediocriter intestinum. Si frigida sit distemperantia, per contraria eundum est.

Ex traditione Poenorum &
Arabum.



Debilitas fit in epate propter aliquid malicie cōplexionis quæ uincit, aut in substantia eius, aut in instrumentis, aut in mate-

materijs retentis in instrumentis suis. Et epati quidem sunt quatuor uirtutes, scilicet, illa quæ attrahit succositatem ciborum postquam digeruntur in stomacho & intestinis, & illa quæ ponit eam fecem & alteratam ad sanguinem, & illa quæ abstergit superfluitates generatas in eo. Dico ergo quod necesse est, ut sint nobis duæ intentiones in curatione maliciæ complexionum quæ sunt in epate, scilicet, contrarietas speciei ex qua uincit maliciam complexionis, & confortatio epatis ipsius. Et prima quidem completur cum eis quæ sunt contraria causæ inuentæ. Et secunda cum medicinis bonorum odorum, quæ miscentur in rebus quæ administrantur interius & exterius, quod est quia non oportet ut sit studium nostrum in destruendo causam quæ facit corruptionem tantum, sed etiam ad conseruandam substantialitatem ipsius membri læsi, & propriè quādo læditur aliquod membrum principale, aut illud cui est operatio communis, sicut epar, in communitatibus autem oportet ut consideretur ad huiusmodi accidentia. In proprijs uero tūc si est læsio epatis propter maliciam complexionis calidæ, tunc administramus res infrigidantes, extinguentes caliditatem ipsam exterius & interius. Et si uincit super epar malicia com-
plexio-

plexionis frigida, tunc oportet ut detur panis infusus in uino, & detur ex carnibus quod est uelocis digestionis, sicut parua aues. Maliciae autem complexionis siccae aut humidae quae sunt in epate, oportet ut medicentur cum regiminibus cōferentibus, & eligantur ex eis res de proprietate quarum est ut humectēt & exiccent, prāter quod apparet calefactio earum & infrigidatio & hoc in inceptione. Nam ipsae cum magnificātur, faciunt cadere in hydropisim carnosam. Auicenna: Epar quidem hominis maius est epate omnis animalis appropinquantis ei in quantitate. Et est membrum quod generat sanguinem, quamuis meseraicae conuertant chilum ad sanguinem conuersione aliqua propter illud quod est in eis de uirtute epatis. Et caro quidem epatis sensum non habet, sed illud quod de ea sequitur pāniculum sentit. Et dicitur quod omne animal plus comedens & debilioris cordis, est habens maius epar. Et non oportet ut ad summū perueniatur in infrigidatione epatis quantum possibile est, & perducatur ad hydropisim, neq; in calefactione & perducatur ad arefactionem. Et epar adipis, id est, lupi, iuuatiuum est cum proprietate sua, & carnes limaciarum similiter. Et medicus quidem expertus cognoscit epaticum & stomaticum omnem

minem per colorem suum, non agens cum eo signifi-
catione alia, & non est ad illud nomen significans
illud proportionale proprium. Et scias quod quan-
doq; fit omnis debilitas ex omni malicia complexi-
onis, & quandoq; est necessitas ut infrigidetur, ita
ut digerat, & ita ut attrahat, igitur considera ma-
liciam complexionis dominantis antequam consi-
deres debilitatem. Et plurimum oppilationum non
fit nisi in latere concauo, quandoque etiam fiunt in
gibbo. Oppilationes quidem sunt ex materiebus æ-
gritudinum epatis. Et oppilationem quidem habes
est pauci sanguinis, et corrupti caloris. Et quãdoq;
antiquatur oppilatio indigens phlebotomia basili-
cæ & solutione. Et habens oppilationem elõget in-
ter comestionem & potum, & propriè potum ui-
ni, ipsum enim uinum intromittit cibum indigestum
ad epar. Et scias quod cum apostemate epatis asso-
ciatur uentris solutio, est mortale. Et quãdoq; per-
ducunt omnes species apostematum calidorum &
frigidorum ad hydropisim. Et si uirtus est fortis at-
trahere quod necessarium est de sanguine in uice
una, & si non, partire & segrega in uices pluri-
mas, non euadit aliquis ex apostemate duro quies-
cente confirmato, & illi qui sanantur ex eo sunt
qui curantur in initio sui. Cachexia est dispositio in-
primis

primis antecedens hydropisim, & appropriatur nomine corruptionis complexionis. Et cum accidit ulcus ei, fit difficilis eius consolidatio propter corruptionem complexionis. Et quandoq; accidit cachexia propter aggregationem aquæ in pulmone, & fit forma cam patientis similis formæ hydropisim. Constantinus: Epar duobus modis pati dicitur, scilicet ex suæ essentiae proprietate, uel ex aliorum membrorum uicinitate. Ex sui proprietate, tribus morborum generibus, sicut & omnia membra corporis patiuntur. Mutatione complexionis, sicut si refrigescat, uel calefiat, humectetur, uel desiccetur, simpliciter seu composite. Secundum genus uero morbi officiales uocantur, sicut oppilationes uel apostemata. Tertium dissolutio imparitatis, id est, separatio iuncturæ appellatur, sicut sunt uulnera, excoriationes, incisiones, & similia. Hæ autem passionēs generant hydropisim. Si uero epati diuersarum complexionum una dominetur, qua uirtus sua naturalis superetur, duricies & tumores in ipso conficiuntur, hæc mala complexio, uel est sine materia, uel cum materia. Cum uero epar unum sit de illis membris quibus animalia uiuunt, cum corrumpitur complexio sua, uidendum est unde corruptio fiat, si ex calore sit, oportet
basilic am

basilicam phlebotomari, si tempus, ætas, consuetudo nos adiuent. Quod si non, refrigeremus cum spodio, saccharo, psyllo, syrupo albo oxysacchara. Demus serum cum oxysacchara, succum herbarum endiuie, scariolæ, solani bene coctum & colatum. Epar uero oppilatur multis modis, uel ex grosso sanguine ab epate ad membra currente, cum non debet currere, uel ex humoribus grossis & uiscosis in uenarum extremitatibus inuiscatis, quæ de maiori uena egrediuntur, & ibi generatur oppilatio. Item epar oppilatur de quorundam membrorum incisione, similiter oppilatio in muliere nascitur, cum menstrua sua ante tempus auferantur. Apostema nascitur in epate duobus locis, scilicet, in superiori parte, uel in inferiori. Si sit in superiori cum tactu sentitur, maxime si sit magnum. Si in inferiori, intelligitur ex suis accidentibus. Apostema in epate nascencia duobus modis sunt, uel de causa exteriori, sicut percussione, uel collisione, uel de interiori, sicut si in epate quidam humores includantur, & ipsis putrefactis generantur apostemata.

Rasis: Aegritudines epatis, aut apostema calidum, aut durum, & nõ forsitan sit phlegmaticum, aut oppilatio, aut malicia complexionis frigide aut

dæ aut calidæ, aut debilitas eius tantum, aut uentositas grossa sub eo, & icteritia, & hydropisis. Et signa apostematis calidi sunt febris inseparabilis, & uehementia sitis, & uomitus cholerae, & quandoq; fit cum eo singultus, & icteritia, & tussis sicca in qua non est sputum omnino, & casus appetitus. Apostematis autem duri signum est, quod apparet tactui res dura sub costis, & corrumpitur color & minoratur appetitus. Oppilationis autem signum est grauitas, quam inuenit infirmus in dextro latere sine dolore, & non est febris & paruitas digestionis, & lenitas uentris. Maliciam autem complexionis in epate quæ calida est, sequitur febris, & sitis, & siccitas uentris multa, & paruitas appetitus, & asperitas linguæ absq; grauitate, & non est dolor sub costis dextris, & rubet aqua ualde. Malicia autem complexionis frigida est cum solutione uentris, & mollitie corporis & corruptione coloris, & tumore faciei, & prauitate appetitus, & digestionis grauitate, & dolore sub latere dextro. Debilitatis uero eius signum, est tantum egestio similis aquæ recentis carnis cum abluitur, cum paucitate appetitus, & extenuatione corporis. Ventositatis autem, quæ est sub ipso, signa sunt tētio, quæ est sub latere dextro, quæ cōmouetur cū digeritur

digeritur cibus, & sedatio per compressionem uehementem super ipsum, et existimant stulti medici quod est oppilatio uel apostema.

Ex traditione autorum recentium.

Morborum epatis quidā sunt à causa propria seu propria passione ipsius epatis, & quidam à compassione. Morbus pro-
ueniens à propria causa diuiditur in tria. In morbos consimiles, officiales, & communes. Primo de morbo consimili epatis calido uenit dicendum. Talis ergo mala complexio calida, siue sit materialis, siue non, sitim generat, & ardorem, & siccitatem in lingua. Sed si adest materia sequitur nausea uel uomitus, si uero non, non fit. Item cum materia urinae est magis citrina, & magis turbata, & saepe ad est febris, & dextrum hypochondrium sentitur calidum. Si in frigiditate sit mutata, in hoc habet sua propria signa, nimiam famem, quod est, quia frigiditas comprimit cibaria ad fundum stomachi & ita fit inanitio in ore stomachi, & ita fames & appetitus sequuntur. Hanc saepe sequitur diaria ptisanaria, quia deficit attractio in epate, & digestio, sanguis minuitur, quia minuitur digestio, & non est febris, sed est magis uia ad hydropisim, nisi forte post lon-

T

gum

gum tempus quādo ingrossatum est corrumpitur
unde putrescit & facit febrem, subtilis est urina,
quia liquidius consumitur in humore, & ingrossa-
tur humor, & non exit, nisi quod liquidius est. Cura
malæ complexiōis calidæ epatis est aqua hordei, et
aqua citrulli, & aqua cucurbitæ, & syrupus aceto-
sus purus, & aqua endiuie, & aqua solani pro-
priæ, et assiduatio emplastrationis epatis cum san-
talis, et roß. et camphora, et non sit cibarium nisi
acetosum, comedantur carnes hœdi & lactantis ui-
tuli, & berberis, agresta, et potetur aqua ueri fri-
goris, et sit dimissio uini omnino. Cura malæ com-
plexionis frigidæ, est omne quod calefacit epar ex
medicinis & cibis, sicut piper & calamentum, zin-
giber conditum & uinum uetus purum, & empla-
stratio extrinsecus cum cypero & spica & squinā-
to & myrrha & costo & uino odorifero stiptico
ueteri. Cura apostematis calidi epatis, cū est incipi-
ens, et usq; ad hebdomadā secundum Rasim, est phle-
botomia cephalicæ in latere dextro, & emplastre-
tur epar santalis & camphora & roß. ana. & in-
frigidetur epar semper, & sit contentus cibo hor-
deaceo, & detur in potu, aqua granatorum aceto-
forum & aqua endiuie et aqua solani cum syrupo
acetoso de sacharo puro. Cum ergo alleviatur fe-
bris,

bris, sint cibi ex herbis & agresta cum pullis, & dimittat uinū omnino usq; quo uerificetur ei sanitas. Cura apostematis duri epatis, est ut in potu sumat diacurcumā et athanasia, & trochiscos de bdellio, quorum confectio secundum Rasim est hæc: Recip. Rosarum tritarum 3. 10. spicæ nardi 3. 2. centaurij 3. 1. lacæ 3. 1. s. myrrhæ 3. 1. costi 3. 1. s. mastiches 3. 2. amygdalarum amararum 3. 2. bdellij 3. 3. resoluator bdellium cum uino, & conficiantur cum eo medicine, & fiant inde trochisci, & sumantur de eis in potu 3. 2. aut 3. cum aqua endiuie si fuerit caliditas, & si non, cum aqua mellis, aut cum aqua & uino. Cura oppilationis epatis est, si cum ea fuerit caliditas, syrupus acetosus cum aqua endiuie, et si fuerit cū ea frigiditas, diacurcuma maior cū aqua radicum, et dimittat cibos grossos uiscosos sicut pultes, et panis azimus, & pedes & caseus, & omnia dulcia quæ habent grossitiem, & comedat res cū quibus fit abstersio, & multiplicetur sal in pane suo & fermentū. Cura debilitatis epatis est emplastratio cum rebus calidis stipticis, sicut sunt mastiches, cyperi, spicæ, thuris, nucis cipressi, gallia muscata, uinum uetus purum. Et fiant cibi eius ex granis granatorum & passulis cum suis interioribus, ipsæ enim confortant epar & impinguant

T 2 ipsum.

ipsum. Epar adip exiccatus teratur optime, & bibatur ex eo cochlear unum et aurei. 2. cum uino dulci, & si habeat febrem, cum aqua frigida solum, cōfert enim (ut uult Rasis) diuamentum, maxime ei qui in epate suo habet aegritudinem. Syrupus de epatica ad epatis calefactionem & debilitatem mirabilis: Recip. Epaticæ. M. 1. lenticularum aquæ. M. 1. s. florū cucurbitæ, uiolarum, rosarum ana ℥. 1. cimarū, squinanti ℥. 1. s. sachari taberzet librā 1. irroretur cum succi granatorum unc. 4. & aromatizetur cum santal. utriusque, & spodij ana. ℥. 1. Alius Syrupus: Recip. Succī endiuie, succi solani, succi cucurbitæ ana. lib. 1. succi granatorum mazorum lib. 5. sachari lib. 1. & aromatiza ut supra. da. ℥. 2. cum aqua rostri porcini & uno trochisco de camphora. Solutiuum bonum filij Serapionis, ad oppilationem epatis ex grossis & uiscosis humoribus: Recip. Hierepicæ simplicis ℥. 1. agarici puluerizati ℥. 1. da cū aqua polypodij, absinthij, apij, anisi, azari & mastiches ana. ℥. 1. Syrupus ualens contra oppilationem epatis & splenis, dissoluit uetositatem, & digestionem iuuat, colorem reparat, renes et uescicam aperiendo mundificat: Recip. Mastiches, cinamomi, croci, gariophil. nucismuscate, galangæ, zingib. ana. ℥. 1. apij, anisi, carui, foeniculi, petroselin. cap-

ni, capparis ana 3. 3. saxifragiæ, stœchados, follicu-
lorum senæ, thymi, epythimi ana. 3. s. sachari quod
sufficit. Pilulæ expertæ ad omnem oppilationem ui-
scerum antiquam, ualent hydropisi, ictero, et quar-
tanæ: Recip. Succu eupatorii, cuscute, absini hij, fumi
terre, epythimi, folliculorum senæ ana. 3. s. agarici
albi, rheumbarbari, hieræpicæ ana. 3. 2. spicæ, ligni
aloës, squinanti, zingiberis, gariophyllorū sem. a-
nisi, api ana. 3. 1. pulpæ colocyntidis, serapini,
armoniæ, lacce lotæ, opponacis, lapidis lazuli lo-
ti pluribus uicibus cum succo buglossæ, foliorum
mezereō repressorum in aceto, salis gemmæ, polij
ana. 3. 2. turbith, myrobalanorum citrin. ana. 3. 2.
dissoluantur gūmi in uino odorifero, & cum succo
fumiterre uel endiuie informētur pilulæ, dosis est
ana. 3. 1. ad. 2. cum prudentia tamen Medici & uir-
tute patientis. Descriptio emplastri resoluētis a-
postemata epatis laudabilis: Recip. Styracis, ceræ
ana. 3. 1. s. olei mastiches, olei rosarum ana. 3. s. ui-
ni 3. 1. liquefiat cera & oleum & misceatur cum
eis. Aliud: Recip. Aloës 3. 3. mastiches 3. 1. chamo-
milæ, & melliloti ana. 3. 3. oleide lilio quantū suffi-
cit. Puluis ualens ad percussionem epatis & ca-
sum: Recip. Balaustiarū, cyperi, uiolarum, myrhe,
boli, amydi ana. 3. 3. sanguinis draconis, lacce ana.

T 3

3. 1. s.

3. i. s. dosi 3. i. cū apozemate de rosis, mastiche
& arnoglossæ.

De hydrope, quam nostri corrupto
uocabulo hydropisimuo
cant. Cap. III.

Iuxta traditionem Græcorum & Latinorum.

Y ἄγω Græcè, Latine aqua intercus dici
tur. Serenus Samoniacus: Corrupti ieco-
ris uitio uel splenis acuto, Crescit hy-
drops, aut cum siccata sella medullæ. Atque auidè
fauces gelidum traxere liquorem. Et ut dicit Firmi-
cus Maternus, libro tertio matheseos. Si à Saturno
defluens luna sit minuta luminibus, faciet circa uen-
trem frigus acciduū, quod Græci psychrocrelio uo-
cant, & infinitis phlegmatum uitij laborantes, ma-
cros, splenicos, lipsetricos, hydropicos, phlegma-
ticos uel disiriacos etc. hydropisis si dicitur apud il-
lustres nescio, nondum enim legi. Ventrem indeco-
rum reddit hydropisis, cuius species ἀσκιτῆς dici-
tur, ex qua extrahendæ ratio aquæ in alijs libris di-
cetur, locum enim ad ilia uersus deligimus, ubi peri-
tonœi sola ferè nuditas est. Suminis enim crassitudo
omnino uitanda est, cutisq; digito dimouenda, im-
missoq; cultello usque ad omentum, quod primum
sub peritonœo occurrerit, penetrandum est, quod
paracene

paracentesim uocat Paulus Aegyneta Nec id nimis
um audacter, nec temere intestina uulnerentur, tan-
tumq; humoris colligendum est, ne uires intermori-
antur, uitalem enim spiritum is humor continet, de-
mum remissa cute, uulnus per se obstruitur atq; ita
sensim singulis diebus demitur aqua, quare uires in-
doneo cibo tuentur medici. Iecinore ergo uehemen-
ter frigefacto, aut inflammato, aut obdurato, uel
quoquo alio modo languente, cum membrorum a-
liorum languore, frustratio quaedam est sanguinis
conuersionis, uocaturq; morbus hydorus, in quo cre-
ber intus est spiritus, cum exiguo humore cōgrega-
tur inter intestina, ut si pulsetur uenter tympani fe-
re sonitum ædat. Ideo ab alijs Tympanites, ab alijs
tympanias humor uocitatur ab inflationibus, quæ
circa stomachum et aluum & colon intestinum, &
inueteratis febribus, quandoque à duritia perito-
noei, uel in mulieribus uulue. Quandoque econtra-
rio uis magna humoris est in exiguo spiritu, in eis-
dem coit locis tanquam in utre aliquo contentus,
inde morbus Ascites humor nominatus qui ex præ-
dictis iam causis ipse quoque constat. Plurimum
autem à duricia quæ in splene & iecore fluxibusq;
circa intestina diuturnis, ex quibus contingit uen-
trem turgere, & reliquum corpus altum eli-

T 4

quari.

quari. Est autem cum per uniuersi corporis tumorem frigidior & pituitosior comprehenditur sanguis, modo ab iecore delatus, modo ab omni corporis carne, quasi stillante aqua, ut album & pituitosum corpus uideatur mortuo persimile, uocatur leucophlegmatias hypofarcidis humor uel anasarca, qui fit ex longis febribus, ex stomachi malo habitu, & uetustis sanguinis fluxibus, & fluxu muliebri, et spirandi difficultate, et uigilijs immoderatis, ac huiusmodi de causis. Hos igitur curabimus à detractione incipiendo, uerū in Ascite, et Tympanite medicaminibus utemur aquæ cum humorem educentibus, in Anasarca uero sanguinem detrahendo curabimus, præsertim hæmorrhoidibus, aut purgādo languorem menstrui, nisi in malo habitu præcesserit sanguinis detractio. Hinc igitur, ut in malis habitibus expedit, particulatim deiectionem administrare, inde stercus bubulum bene arefactum liquare, in oxycrato coqui, uel oxymelle, et sulphuris quarta parte, inde emplastrum toti apponito uentri. Aut spyratum capræ in urina capræ uel pueri, et uentri cataplasma facito. Hæc uehemēter purgant. Clysteribus autem utendum acribus, nisi uenter sponte humectetur, tum enim arefacere potius expedit. In mulieribus autem hydropicis pessa utendum

tendū huiusmodi: aniso, cardamomo, cumino, nitro,
aristolochia, teli, glichone, interno ficuum, & natu-
ralibus aquis, postea acpsamismo. In Anasarca uerò
reliquisq; partibus enudentur, & quoad fieri po-
test in sole aridis rebus fricentur. Reliquis autē uir-
tus aridior sit. Salsamenta igitur in sinapi come-
dant, & allia, agrestes uolucres & aridas comedāt
ex oleribus asparagum, gingida, porra, sinapi, et cā
calidas, & reliqua agrestia & theriacas. Vino utan-
tur ueteri, tenui, urinam ciente, atq; ex infusa mari-
na aqua, parum tamen potent, aquæ nihil prorsus,
scilicet cum aqua intercute febricitent. A calidis &
acribus edulijs adminiculisq; abstineant, mixtimq;
eis utantur purgamine corporis, prebentur eliquē-
tia, & urinam cientia, quæq; attenuent distrahātq;
spiritus tum intus, tum foris, perpetuisq; utendum
inanibus cucurbitulis, quæ uentri impingantur, quæ
Ascite opprimuntur, superioribus utantur opitula-
mentis.

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.



Hydropisis est errare uirtutem in epate
naturalem, uirtus enim digestiua epatis
cū mutare cibi succos in sanguinolentos
humores deserit, cum quibus & tres humores. Cū
T S inquam

inquàm hæc uirtus pigrescat in complenda actione sua, necesse est sanguinem corrumpat, qui indigestus, corpus male nutrit, unde fit ut totum corpus tumescat. Hydropisis ergo ex sola defectione uirtutis est mutabilis, corruptio enim sanguinis ex infirmitate est huius uirtutis. Galen. dixit, impossibile est hydropisim sine passione epatis esse. Non enim nascitur nisi ex debilitate uirtutis digestiue & sanguinis generatiue, quod proprium est epatis. Sed tamen non quodocūq; epar in sua proprietate deficit, uel in aliorum membrorum uicinitate deficit hæc uirtus, nō cessat tamen à cōplementis suæ actionis. Epar enim aliquando patitur, & tamen hæc uirtus actionem naturalem suam non prætergreditur. Augmentata tamen ipsius passione & maxime dominante, necesse est hanc deficere. Neq; succum cibi mutat, ut sanguinem inde faciat. Qui cum sit crudus & indigestus permanebit, hydropisim faciet. Serapio: Hydropisis fit aut ex epate quando forte fit frigus eius, aut ex sanguine frigido qui aggregatur in reliquo corpore, & fit etiam ex multitudine frigiditatis membrorum aliorū, de proprietate quorū est ut infrigident corpus. Species uero hydropisis sunt tres, et una quidē earū fit ex multitudine humiditatis quæ aggregatur in pitonæo, et est uelamē quod est

est inter supiora mēbra et inferiora, et inter intesti-
na. Et alia fit ex uentositate, quæ replet illa loca. Et
in tertia corpus totū uidetur, sicut corpus mortui,
quod iā inflatū est. Et prima harū nominatur Ascii-
tes, et secūda Tympanites, et tertia Hypofarca. Et
in omnib. speciebus hydropisis inflatio pedū est acci-
dens cōmune, & illud quoniā caliditas innata in eis
est debilis, & nō expellūtur uapores ad illud quod
apparet de corpore, propter id ergo fit quod uenit
ad pedes secundū modum cibi, & resoluitur ibi, &
mutatur ad superfluitates malas. Quid si dixeris,
quare non inflātur manus? dicemus quoniā manus
sunt propinquē cordi, et quoniā cor est fons caloris
naturalis, tunc iuuantur à calore naturali, et nō cō-
sequitur eas corruptio. Et nobis est ut dicamus, quia
hæc est causa alia, & est quia manus sunt facilioris
motus q̄ pedes, propter ergo multitudinem suo-
rum motuum resoluitur quod effunditur ad eas. Et
hæc est causa tertia. Et est quia de proprietate ua-
porum grossorum est ut descendat materia inferi-
us, propter illud ergo ponunt pedes inflatos. Et
diaria est accidens commune in hydropisi, quæ ac-
cidit in locis uacuis uiscerum quādo accidit eis apo-
stema. Et si læduntur per apostemata, tunc est æ-
gritudo hydropisis. Et differentia inter hydro-
pism

pisim quæ accidit ex epate, et inter speciem quæ fit ex locis uacuis uiscerum est, quoniam inflatio quæ fit ex epate descendit sub digitis, quādo tangis eam super mollitiem, & remanet locus eius submersus, & post paululum redit ad habitudinem suam primam, & non est altera secundum hoc, quod est: quia causa inflationis illic est plegma, & hæc causa eius est uentositas. In hydropisi autem quæ fit propter membra anhelitus, et tussis est accidens proprium, & inflatio crurium etiam, & proprie in hydropisi, quæ fit ex pulmone. Hydropisim autem quæ fit propter apostema epatis, sequuntur motio tussis, & diminutio in eo quod descendit ex fece, & siccitas. Si autem cum tussi sit sputum, & foetor, tunc non speratur de infirmo, quod est, quia hoc significat quod pulmo iam repletus est istis materijs, propter illud ergo moriuntur uelociter, quoniam anhelitus eorum constringitur & præfocatur. Et si hydropisus est cum febre, non oportet ut administres quæ calefaciunt, nec exterius super uiscera, neq. cum cibis & potibus, imò est necesse ut detur infirmo aqua solani, & aqua alkekengi, & aqua apij cū lacte abluta & raueseni, & croco, & myrobal. citrinorū. Et cōferunt proprie species ndiuie amaræ. Et non oportet ut in potu sumant cōfectiones calefaciendæ

facientes, neq; medicinas solutiuas multæ calidita-
tis, quoniam ipse confortant sitim, & adurunt apo-
stemata & uiscera. Auicenna: Hydropisis est egri-
tudo materialis, cuius causa est materia exuberans
frigida ingrediens membra, & crescunt per eam
quidem membra manifesta omnia, aut loca uacua
partium, in quibus sunt regimen nutrimenti & hu-
mores. Et dignius est ut sit Ascites malignior omni-
bus speciebus hydropisis. Et homo de quo uehemē-
tius timetur cum aduenit ei hydropisis, est ille cuius
complexio naturalis est calida & sicca, non enim
egrotat per contrarium sue complexionis, nisi
propter rem magnam. Et fluxus uētris in hydro-
pisi est mortalis. Et plurimum statio aquositatis nō
est nisi inter zirbum & syphac intrinsecū. Et quan-
do expellit natura ex hydropico aquositatem, hy-
dropisis per seipsam significat euasione. Et fluxus
quidem uentris quandoq; est iuuatius ualde in Hy-
posarcha, scilicet uirtute forti. Et plurimum causa-
rum tympanitis est corruptio digestionis primæ,
propter uirtutem aut propter materiam. Et cum
Ascite est grauitas sensibilis in uentre, & cum per-
cutitur uenter non est ei sonitus, sed quando com-
mouetur ex ea auditur sonitus aque commotæ, &
similiter quando permutatur habens eam ex late-
re ad

re ad latus. Et cum est Hypofarcha apparet cū ea
inflatio in corpore toto, sicut accidit corpori mor-
tui, & imprimuntur digiti in omni loco corporis
cuius. In Tympanite egreditur sumē plurimo exitu,
& eius uenter est quasi chorda tensa, & cum uen-
ter percutitur manu, auditur ex eo sonitus uentris
in quo est inflatio. Et scias quod euacuatio cum me-
dicinis laudabilior est, quā quæ sit sectione & re-
sudatione, & sit difficile succurrere eis. Et spes est
ad omnem hydropisim in diacurcuma, & syrupo
scyllitico & theriaca & propriē in fine hydro-
pisis. Et oportet ut euacuatio cum solutiuis non
sit subito, imò secundum uices. Nam illud quod
subitum est, mortale est. Et nocumentum para-
uum debilitat epar. Aloës autem ualde malum
est epati. Non respicias autem ad illud quod dicunt
Sophistæ, quod natura lactis est contraria hydropi-
si, imò scias quod est medicamen iuuatiuum pro-
pter illud quod in ipso est de abstersione, & est ite-
rum conueniens propter illud, quod in ipso est de
propriestate sua. Lac autem camelinum & caprinū
in potu detur cum eis, quæ solutione uentris edu-
cunt aquositatem & subtiliant & prouocant. Et
de incisione myrach scias quod parum proficit nisi
in corpore ualde forti, & oportet ut non audeat fie-
ri dum

ri dum possibilis est cura alia. Pilulæ de mesereon
ultimæ sunt in Ascite, & pilulæ de rheumbarbaro
in Hyposarcha. Oportet uero ut cibus hydropico
sit paucus & semel in die, & si possibile est ab
stineat à pane tritici propter suam uiscositatem &
oppilationem, & sint contenti pane hordei cum se
minibus. Et ius gallinæ est iuuamentum eis, ipsum
enim aggregat ad prouocationem & rectificatio
nem epatis. Vino autem non appropinquet calidā
habens hydropisim. In frigida autem, non oportet
ut bibat ex eo nisi subtile & antiquum parum, non
cum est ieiunus, nec super cibum, imò post horam,
& cum est cibi descensio à stomacho, & omnia diu
retica cōferūt eis. Et in hyposarcha quæ fit à causa
calida, oportet ut phlebotomia fiat, ut egrediatur
uirus malum & prouocetur. Et phlebotomia non
ingreditur in tympanite nisi raro. Et quandoq; ne
cessarium est in tympanite, ponere uētosas euacua
tiuas super uentrem eius multotiens. Rasis: Empla
strum Asciti cōueniēs: Recip. Farinæ hordei, sterco
ris ouini ueteris, cyperi, baurach, bolidarmeni ana.
partes æquales. Ex his omnibus tritis fiat epithe
ma super uentrem. Et si in palpebris & extremi
tatibus fuerit apostema molle, & testiculi aposte
mantur, faciesq; ac totum corpus mollicie quadā te
neantur,

neantur, erit tunc hydropisis species que Hyposaracha nominatur. Aegro itaq; hac laboranti: Trochisci de lacca cum apozemate de radicibus sunt tribuendi, & uenter quaq; hebdomada ex pilulis de rheubarbaro est soluendus, & patiens in arena calida sepeliendus. Et præterea est præcipiendum ut exercitio utatur, & famem ac sitim sæpe patiatur. Si uero uenter inflatus ac tensus fuerit, & cum percutitur, sonum reddit, ut tympanum, hydropisis species adesse significabitur, quæ tympanites dicitur. Quam qui patitur à comestione olerum abstinere debet, atq; eorum omnium quæ uentositatis sunt generatiua, uenter quoq; omni die ex panno est uaporandus, & uentosa super uentrem ponenda, medicamina tumorem dissoluentia danda sunt ut diaciminum, electuarium de baccis lauri. Aeger præterea exercitio uti assuescat, & famem pati, & ex collyrijs, quæ uentositatem dissoluunt sibi subijciat. Venter quoq; cum mantili donec incipiat rubere, fricetur, & ex oleo rutaceo clysterizetur.

Ex traditione recentium auctororum.



Hydrops est passio chronica ex frigidityte epatis generata, quia uirtus epatis cibos non coquit, nec in sanguinis substantiam conuert-

conuertit. In hoc conueniunt omnes autores, quod
causa hydropisis est propriè materialis frigida, li-
cet aliquando calor superfluus potest esse causa re-
mota. Hydrops autem est apostema aquosum uni-
uersale, sicut uult Aboali in. cap. de apostemate, li-
cet alicubi dicatur hydrops mala complexio, sed
hoc est impossibile. Dicit autē Alexander quod hy-
dropisis tria sunt genera. Vnum est quod ex tenui
humore, & ex uentositate generatur, & uocatur
Ascites, aut ex uentositate spiritus, & dicitur Tym-
panites, tertium est de phlegmatico sanguine su-
perfluo in toto sanguine, & dicitur Hypofarcha, si-
ue leucophlegmantia, cum quo conueniunt Auicen-
na & Serapio & Isaac in uiatico, quamuis dicatur
esse Constantini, quod sibi falso ascribitur. Cause
hydropisis due sunt in genere. Aut propter pro-
priam passionem epatis, aut propter compassionē.
Propter passionem propriā tribus modis, aut pro-
pter suos consimiles morbos, uel officiales, uel com-
munes, propter malitiam complexionis, propter
malam complexionem quatuor modis secundū qua-
tuor malas complexionēs, propter malas comple-
xiones compositas, & materiales, quia calor super-
fluus operatur ad innati caloris epatis resolutionē,
& corrumpit naturalem, unde epar spiritibus reso-

V lutiis

lutis & calore innato resolutio in frigidatur. De frigidityte epatis satis patet siue sit coniuncta sicco, siue humido. Vnde patet quod hydropisis generaliter est morbus aquosus, licet quandoq; fuerit à calore, quod est, quia calor innaturalis operatur ad asperitionem pororum & corruptionem caloris naturalis, qui cum debilis sit cito resoluitur, unde corpus in frigidatur, & ita generatur humor aquosus, & hydropisis. Item morbi officiales epatis sunt sicut oppilationes uel apostemata eius, quæ debilitant materiam uel digestiuam. Calidum enim apostema ad resolutionem caloris innati operatur. Oppilatio similiter contrahendo humiditates, unde calor innatus suffocatur. Dupliciter enim contingit corrumpi calorem naturalem interiore sicut exteriorem, per uiam resolutionis, & compressionis, & condensationis, sicut patet in igne non cooperto. Morbus communis, siue solutio continuitatis epatis, sicut incisio uel corrosio operatur eadem. Per compassionem autem generatur hydropisis, quando compatitur epar stomacho aut intestinis, spleni uel matrici, uel renibus, uel pulmone, uel diaphragmati, uel spine dorsi, & uniuersaliter in omnibus membris, errore debilitatur & uirtus epatis, unde deficiens in decoctione
chimo

chimorum, sicut patet in apostematibus cuiuscunque nobilis membri, unde fit febris, quia apostema ad se trahit ipsum, & calorem innatum sicut uentosa, unde in frigidatur epar, uel etiam ex sola febre acuta cum fortis calor extraneus resoluat & corrumpat calorem naturalem. Iuxta illud: Omnis hydrops in acuta aegritudine malum. Hydropisim factam propter apostema stomachi, uel meseraicarum, uel intestinorum, uel lumborum, significat diuturna uentris solutio, quia chylus in stomacho, uel in intestinis non potest generari, quia cibus non tandiu retinetur in his membris laesis propter apostema, uel solutionem continuitatis, uel si oppilentur meseraicae chylus non penetrat ad epar, & propter hoc est continuus fluxus chyli, materia hydropisis non euacuata, unde non deficit calor & tumor. Sed hydropisis propter apostema epatis significatur per tussiculam, quia uirtus nititur expellere nocumentum, sed deficit. Item adest difficultas egerendi, & quod egreditur cum angustia exit, quia fortis calor epatis ad se trahit stomachi & intestinorum succositatem, residuum uero induratur & transit in squibala. Item minuta sunt apostemata quae cito recedunt, quia materia subtilis est & uaporosa, sed statim redeunt.

quia nimia est materia. Mutatio est autem caloris naturalis in non naturalem, signum est cacochimia & hydropisis, & tumor uniuersalis uel particularis, & squaliditas & pruritus propter uaporē corruptum ad exteriora prorumpentem. Et commune accidens in omni hydropisi est tumor pedum & inflatio. Sed quia pedes remoti sunt à fonte caloris, & propter hoc nutrimentum non conuertitur, & quia ibi remanet non conuersum, tumorem facit. Signa autē distinctiua sunt hæc, quādoq; in Hypo-saracha est tumor æqualis per totū corpus, quia epatis uirtus fortis expellit à se, et mēbra attrahūt, quia intendūt se nutrire, et materia non est eis proportionalis, non conuertunt eam. In Tympanite uero & Ascite manus, brachia, collū, & caput gracilantur, quia ad ea nihil attrahitur nec mādatur ab epate iam defecto, color mutatur, & habet liuiditatem. Differt autē Ascites à Tympanite, quia Ascites uētre cōmoto sonat, sicut uēter semiplenus aqua. In Tympanite sonat ad modū tympani, & multū iuuatur per oscitationes et eructationes, et nō conuenit in alijs. Ascites uero magis per sudorem & aquositatis resolutionem iuuatur. Cause autē remotæ hydropisis sunt timorose ualde, sicut nimius fluxus uentris uel matricis, uel nimia retentio superfluitas

fluitatum, uel nimius potus aquæ frigidae & præci-
 pue in ieiunio, uel subita complexionis mutatio, uel
 debilitas totius corporis suas superfluitates ad e-
 par resudantis, quas omnes difficile est transcurrere.
 Et facilius ad curandum est Hyposarcha. Alia
 duæ difficiles, omnes tamen sunt curabiles in princi-
 pio si uirtus sit fortis & necessaria exterius appli-
 centur. Medicinæ efficaces & uirtutis nõ ualde mo-
 lestæ, & Asciti multum congruentes sunt istæ: So-
 lutiuũ aquositatis hydropisis: Recip. Pilularũ de ra-
 uedseni Mesue ʒ. 2. agarici, radicis yreos ana. ʒ. 1.
 salis gẽmæ, zingib. ana. gran. 2. eupatorij ʒ. s. pul-
 uerizãda puluerizẽtur, et cũ syrupo de absinthio fi-
 ant pil. 7. p. 3. Solutiuũ aquositatis et ipsius exiccati-
 uũ: Recipe Vnguẽti arthanitæ quantũ pro unguẽto
 sufficit, aceti acuti quod sufficit ad incorporandum,
 misce, hoc unguento ungatur uenter manu calida.
 Epatis & stomachi confortatiuum, oppilationum
 aperitiuum, & aquositatis exiccatiuum: Recip. Se-
 minum agni casti, apij, anisi ana. ʒ. 1. fœniculi ʒ. s.
 calami aromatici, spicæ ana. ʒ. 1. calamenti ʒ. s.
 absinthij sicci ʒ. 2. sem. endiuie ʒ. 1. solani ʒ. s. pul-
 uerizentur omnia ut decet, & cum syrupo de ab-
 sinthio fiãt pilulæ. 7. pro. 3. Assumat. 5. in singula
 hebdomada duobus diebus præterquã tempore

V 3

calido.

calido. Aliud fortius: Recip. Radicis camelcontæ 3.
 s. bethonica 3. 1. cuscute 3. 2. cinnamomi 3. 1. eu-
 patorij 3. 1. radice enulæ 3. s. macis 3. 1. origani
 polij ana. 3. s. rheum barbari electi ana. 3. 1. s. radi-
 cis squināti 3. 1. sem. solani 3. 1. puluerizētur pule-
 uerizāda & cū syrupo de absinthio fiāt pil. 7. pro.
 3. utatur ut supra. Aliud solutiuum: Recip. Hieræ
 Archigenis 3. 1. s. aquæ absinthij quod sufficit pro
 potione & fiat potio. Aliud efficacius solutiū: Re-
 cip. Trifera feruginata descriptione Nicol. 3. 1. s.
 aquæ absinthij quod sufficit pro potione et fiat po-
 tio, utatur aliquādo mane. Medicinæ remissæ potēs-
 tia, uirtuti familiares & cū hoc usuales. Solutiuum
 usuale & propriū: Recip. Seri caprini 3. 4. radice
 yreos puluerizate grosso modo 3. s. sachari albi 3.
 2. misce, & fiat potio. Assumat omnib. 15. dieb. ordi-
 ne solutiui. Si uero uult fortius, tunc huic toti
 addat iterum radicem yreos 3. s. Epatidis conforta-
 tiuū, sed nō solutiū: Recip. Urine hominis masculi
 pueri, ætatis intra terminum à quinto anno usq; ad
 12. annum inclusiue 3. 6. eupatorij 3. 1. spice gran.
 2. coralli rub. 3. 1. sem. endiuie 3. s. sachari albissi-
 mi 3. 2. misce & fiat potio, utatur aliquando. Ali-
 ud ut supra: Recip. Lactis capre calidi dum mulge-
 tur ab ubere 3. 4. eupatorij 3. 1. spodij gran. 3. sa-
 chari

chari albi 3. 2. misce capiat mane ad libitum. Epatis
 confortatiuum: Recip. Specierum confectiois de
 eupatorio Mesue 3. s. diarrhodon Abbatis 3. 1. ma
 cis 3. 2. seminis anisi integrorum 3. s. spodij, gran.
 5. seminum endiuie 3. 1. solani 3. s. coriandrorum
 preparatorum 3. 1. sachari albi lib. 1. puluerizetur
 puluerizanda misce, et cū aqua absinthij fiat cōfectio
 solida in morsellis 3. 3. pro quolibet. Assumat unū
 morsellum in alternis diebus cum surgit. Hec om
 nia supradicta ualent in Ascite. Syrupus solutius
 pro hyposarcha: Recip. Radicum sceniculi, petroso
 lini, apij, sparagi, brusci, acori radicum, spine albæ
 ana. 3. 1. scolopēdrie, prassij, melissæ, eupatorij ana.
 M. 1. radicū capparis, ciperi, seminis, anisi, sceni
 culi, cinnamomi ana. 3. 2. chamædreos, thamarin
 dorū ana. 3. s. turbith, agarici ana. 3. 3. polipodij 3.
 1. s. passul. 3. 1. sal. gēme 3. 1. sachari lib. 1. fiat syru
 pus utatur ad discretionem medici. Puluis exper
 tus in hyposarcha: Recip. Anisi 3. 2. cinnamomi 3.
 1. cataputiae 3. s. sachari albi 3. 2. fiat puluis, dosis
 3. 3. uel. 4. in mane cum uino uel aqua. Syrupus in
 Tympanite: Recip. Lactuce siluestris, epaticæ, sco
 lopendrie, endiuie, ana. M. 1. eupatorij, melissæ,
 thamarindorum ana. M. semis, radicum sceniculi,
 petroselini, liquiritiæ, spodij, corticis radicum ebuli
 V 4 ana.

ana. ℥. i. capparorum, passularū ana. ℥. s. santalorum rub. seminis endiuie, anisi, cinnamomi, ana. ℥. 2. sachari albi lib. i. fiat syrupus dosis ℥. s. cum pauca aqua calida, in qua extinguitur ferrum. Et omni mane semel usq; ad decem dies, postea purgetur cū ℥. 4. aut. 5. huius mixtionis: Recip. Electuarij ad melicholiā, diamezereō, diaphoeniconis ana. ℥. 4. rhei barbari ℥. 3. misceantur, sumat mane cum aqua calida, considera tamen uirtutem patientis. Et fiat confectio de qua sumat mane & sero ante cibum: Recipe trochiscorū de spodio, liquiritiæ ana. ℥. i. cinnamomi, macis, seminis endiuie, xyloaloes, azari, mastiches, galliæ muscatæ, corallorum rubeorum ana. ʒ. 2. margaritarum, santalorum, seminis, ozimi ana. ℥. i. sachari lib. i. fiat confectio in uase, dosis ℥. 5. cum pauco uini puri. Et fiat puluis quo utatur in cibis suis temporib; frigidis: Recip. Cinnamomi ℥. i. s. croci. i. fiat puluis. Et fiat sacculus ad stomachum: Recip. Absinthij, squinanti, calamenti, myrtillorum, rosarum, mastiches ana. ℥. 3. s. bulliant in uino aromatico & ponatur ad stomachum ante cibum. Et cum surgit à lecto inungat stomachum ex hoc: Recip. Olei nardini, olei mastichini, olei absinthij ana. ℥. s. misceantur & ungatur calidum cum absterfione, quod si aliquando apparet distemperatum

tum inungatur ex hoc: Recip. Santalorum trium,
spodij ana. ʒ. 2. olei rosati ʒ. 3. olei absinthij ʒ. 1. ce
ræ quod sufficit fiat unguentum. Cruris fiat lotio
ex aqua decoctionis radicū ebuli & florum origa
ni. Si apparet aliquod uestigium hæmorrhoidarū,
erit bonum eas prouocare. Si sumendo syrupum
prædictum apparet fluxus uentris, unde suspicaren
tur medici de solutiuo prædicto dimittant illud &
nihilominus detur ʒ. s. diacatholiconis cum ʒ. s. rhe
umbarbari, & dissoluatur cum aqua decoctionis ra
dicū corticis myrobalanorum citrinorum ʒ. 5. In
Ascite uero remota quæ posset esse causa primiti
ua, quod sit per malum regimen, & etiam antece
dente mala complexionē epatis calida, tunc uenien
dum est ad euacuationem aquæ citrinæ, à concu
te epatis quæ secundum quosdam est causa antece
dens, et secundum aliquos est causa coniuncta, licet
Auicenna dicat. 3. canonis, quod debilitas digesti
uæ epatis est causa coniuncta, non dicit simpliciter
quod sit coniuncta causa, sed dicit est quasi coniun
cta causa, quasi ut plurimum debilitatem sequitur
cachexia, quæ est mala complexio, dispositio præce
dens ad hydropisim, & ipsa aqua quæ uidetur ferè
causa cōiuncta est citrina, non tamen inde curandū
est quæcunque sit ista aqua. Sed euacuandum ip

V S

sum

sum & exiccandum omnes auctores student, quæ euacuata cessat tumor aquosus qui est ipsa hydropisis. Euacuatur autem infallibiliter ut poteris experiri, cum succo cachilæ, quæ Latine dicitur soldania, herba est nascentis in littoribus maris, & præcipue meridiani nostri, de quo succo sumat à media libra usque ad uncias 8. cum unc. 1. sachari rubei tepesciat aliquantulum, sumantur in matutinis, & uidebis mirabilia de euacuatione aquæ citrinæ, & illo die nihil uel parum comedat æger, & hoc fiat de decimo in decimum diem. Hæc enim herba à tota specie confortat epar, & educit aquam citrinam, quæ duo sunt quasi basis in cura hydropisis. Et notatu dignum est scire quod apud Arabes inuenitur cacele & kachile. Cacele est cardamomum, sed kachile est herba soldania iam dicta, & in hoc apparet error Gerardi Cremonensis in translatione. Nam in tertio canonis capitulo de cura Ascitis, purgetur cum aqua cardamomi, nunquam enim cardamomum euacuat, neque est solutiuum, sed errauit non intelligendo uocabulum. Hic error manifeste apparet in de simplicibus, ipse enim ponit duo capitula, uidelicet cacele, id est, cardamomum, & kachile, id est, soldania, de qua nos magnam habemus

mus copiam. Hæc etiam Rasis tertio Almanforis tangit dicens: Cachile aquam citrinam euacuat, & urinam prouocat. Et ipse Gerardus transtulit utrunque librum, & ideo utrobique errauit, licet sit error in uocabulo tantum, non tamen est paruus, nam quandoque error resultat maximus in opere, post tertiam purgationem oportet ut uoluentur in arena maris subtilissima tempore æstatis, & meridie tempore magni æstus benè cooperto toto uentre, ab hora sexta usque ad uesperas tribus diebus continuis, ita ut sit totus sepultus in arena. Si uero non sit ibi mare, & sit in hyeme, calefacere oportet arenam maris, uel aliam arenam cum admixtione octauæ partis de sale in furno calido, ita quod arena sit multum calida, & tunc in solio domus sepeliatur æger in arena prædicta calefacta in tres partes, ita ut cū una pars in frigidatur, alia renouetur, uidebis uentrem diminui & ad nihilum deuenire tumorem. In cura Ascitis cum apostemate calido uel frigido, non te intromittas. In cura uero Hypofarchæ procedas euacuando & purgando, cum electuario factō in hunc modum. Accipiat fructus cucumeris asinini tempore canicularium dierum, & exiccetur

exiccetur ad solem semper projiciendo aquam, quæ
supernatat donec siccetur, tunc Recipe eiusdem suc-
ci ℥. i. bdellij ℥. i. mastiches ℥. s. salis gemmæ ℥. 2.
incorporentur simul, & cum uolueris dare, forma
pilulam istam ad modum piperis, ciceris, uel fabæ,
da sero eunti dormitum unam solam, & uidebis mi-
rabilia, ueruntamen sit medicus prudens in exhi-
bendo cucumer asininum, nam à solis prudentibus
medicis exhiberi debet. Confortetur epar cum oleo
nardino & emplastro, quod scribit Rasis nono Al-
mansoris, capitulo de ægitudinibus epatis, in quo
ingreditur calamus aromaticus, spica, roß. &c. Et
detur eadem mixtura ex diacurcuma & rosata no-
uella. Vltimo deueniat ad arenam calidam. Ad Asci-
tem cum tympanite fiat iste syrupus, & sumat de
eo omni mane ℥. i. Recipe scolopendriæ, melissæ
ana. M. i. radicum sceniculi, petroselini, tamarisci, li-
quiritiæ, eupatorii, ana. ℥. i. sem. portulacæ, cappaa-
rorū ana. ℥. s. seminum anisi, endiuie, sceniculi, san-
talorum rubeorum ana. ℥. 2. sachari lib. i. fiat syru-
pus, sumatur cum decoctione scolopendriæ. Item fie-
at sacculus in quo bulliant hæc: Recip. Absinthij, se-
minis aneti, capparorum, tamarisci, chamomilæ, ca-
lamenti ana. unc. s. & frequenter ponatur ad sple-
nem ieiuno stomacho. Sero ad minus una hora ante
cœnam

ecenam sumat §. 2. diarrhodon Abbatis cum pauco potu uini puri, uel parum limphati, comedat carnes pullinas uel perdicum, bibat uina mediocria parum limphata.

De regio morbo, quem Ictericum, seu Icteritiam recentiores uocant.

Cap. IIII.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Icterus à Græcis, à nobis morbus regius dicitur. Est enim morbus cum per totum corpus bilis suffunditur, quæ interdum nigra, interdum flaua est Et dicitur ab ictero aue, de qua Plinius lib. 30. naturalis historiae, cap. 3. Auis (inquit) icterus uocatur à colore, quæ si spectetur, sanari id malum tradunt, & auem mori. Hanc puto Latine uocari galbula, hæc ille. Quod autem alij dicunt morbum uocari ictericiam, uix inuenies apud receptos, quod si aphorismi Hippocratis ita habeant, & aliæ recentiores translationes, non mihi faciunt autoritatem, dum ego de fonte unde hauriuntur, et ex illustrib. autoribus me accipere profitear, nec in hoc accusandus Hippocrates, sed librarij imperiti qui optimos libros mendosissime exscribere consuerunt, nec uitiositas codicum nisi in libentarios rectorquenda. Sed redeamus, Ictericus dicitur qui pas-

titus

titur icterum, quibus diuersis alijs nominibus appellatur, dicitur enim à Plinio, Varrone, Horatio et Sereno morbus regius, & quare sic dicatur reddit Samonicus rationem duob. uersibus. Regius est uero signatus nomine morbus, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula. Aliter hic morbus à Celso aurigo appellatur, & homo auriginosus, qui patitur. Dicitur & arquatus, à colore cœlestis arcus, ut dicit Nonius. Et ut dicit Acron super artem poëticam Horatij, quidam dæmoniacum, nonnulli comitiabilem, alij aquarium uocant, & Iuuenalis ictericon satyra sexta. Consultit ictericæ lento de funere matris. De hoc morbo Hippocrates ait: Si post septimū diem febricitātem ægro superuenit tutum esse, mollibus tantummodo præcordijs substantibus. Dioscles ex toto si post febrem oritur etiam prodesse, si post hunc febris, occidere. Colore autem cum morbum detegi maximè oculorum, in quibus quod albiū esse debet, fit luteum. Asclepiades aquam quoque salsam, & quidem per biduū purgationis causa bibere cogebat, ijs quæ urinā mouent reiectis. Est autem icteros (autore Paulo Aegyneta) morbus cum per totum corpus bilis suffunditur, quæ interdum nigra, interdum flaua est. Potionandi sunt arquati apij, uel adianthi, uel lapathi, uel serpilli trita decoctione.

ne, aut absinthium potuiingere. Prodest autē multum raphani succus cum uino potus cyathus, & succus cichorij cyathorum. 2. uel. 3. per se, uel cum uino. In inflammatione uero iecoris arquatos potior nator cenomellæ, aut coctione tenuis aristolochiæ, aut hyperici, aut adianthi, aut struthij, aut erythroni, aut abrasuræ cornu cerui 3. 1. cum uino, aut sulphuris apyri drach. in ouis absorbeatur. Hæc plurimum ad oppilationem faciunt, dato cinnamomum trium digitorum quantitate tollæ cum cenomellæ cyathum, aut myrrham fabæ magnitudine cum piperis granis. 5. tantundem cinnamomi.

Secundum Pœnos & Arabes.

Ictericia quidem fit aut propter caliditatem epatis multam per seipsum natam, aut quoniam epar calefactū est ex cibis, aut medicinis calidis, aut apostemate, aut oppilatione, aut propter multitudinem cholerae rubæ, aut propterea quia natura expellit ad eam exteriora corporis, aut ex morsione uermiū, aut animalium uenenosorum calidorū, aut propter debilitatē fellis ab attractiōe cholerae rubæ, aut propter oppilationē meatus quo attrahitur cholera ab epate, aut ppter oppila-

pilationem meatus, quo expellitur cholera ad intestina, & illorum quidem quorum epata secundum naturam sunt calida, colores sunt citrini semper, & in albugine oculorum eorum semper est citrinitas, & non accidit eis inde maximum nocumentum, nisi cum illud superfluit in eis. Serapio: Ictericia non est nisi uictoria cholerae citrinae in toto corpore, & non uincit haec, nisi aut quoniam non mundatur ab ea corpus, scilicet quod est necesse, aut quoniam ipsa generatur super illud quod est necesse, aut ex aggregatione duarum rerum simul. Et causa prima non est nisi ex egritudine quae accidit in epate, aut in felle. Quod est, quia epa quando apostematur, aut induratur sicut lapis, aut oppilatur meatus eius, donec oppilant materiae meatus, quibus mundificatur fel & coarctat ipsos, tunc necessario quando permiscetur sanguis cum felle, & effunditur sanguis commixtus cum felle ad omnia membra corporis, accidit ex eo ictericia, & fortasse totum corpus fellis laeditur, & fortasse accidit in uno meatuum eius, scilicet aut in meatu superiori qui recipit choleram ab epate, aut inferiori in quo descendit fel in intestina, & unusquisque eorum laeditur, aut propter debilitatem quae consequitur eum ex malicia complexionis, aut ex aliqua re apostematis, quod
accidit

accidit in eo, & prohibet à penetratione. Quod est, quia meatus superior quando debilitatur, tunc oppilatur, donec non attrahat choleram ab epate, et mundet ipsum, tunc fel apud ipsum permiscetur cum sanguine, & spargitur in reliquum corpus. Et secundum hanc formam etiam in meatu inferiori, quando non expellitur fel ad intestina secundum consuetudinem naturalem, tunc ipsum redit ad superiora cum acuitate, & figitur in reliquo corpore, & in ipso corpore fellis fortasse accidit quod accidit in uestica recipiente urinam, quando impletur super mensuram. Quod est, quia quando ipsum extenditur ex multitudine fellis, quod aggregatur in eo, mollificatur adeo donec non potest expellere choleram ad inferiora, sed redit ad superiora contrario rei naturali. Et ita accidit ictericia ex doloribus splenis etiam. Et fortasse ictericia accidit secundum viam crisis, præter quod sit causa eius aliquid eorum quæ narrauimus. Et iterum accidit ex phlegmone in epate, aut in duobus meatibus mūdificantibus fel, & sequuntur grauitas in latere dextro & febris. Tibi ergo inest ut differentiam facias inter ictericiam quæ fit ex epate, et inter illam quæ fit ex felle, quando diligenter consideras urinam & stercorea. Quod est, quia si iungitur egestio cum felle,

X

tunc

tunc non est ægritudo in felle, & in meatibus eius,
sed in epate, quod si egestio est alba, tunc significat
lesionem duorum meatuum mundificantium fel, et
si urina est remanens secundum colorem suum na-
turalem, tunc non est ægritudo in epate, quod si co-
lor urinae est cholericus, acutus, tunc significat læsio-
nem epatis, etiam urina declivis ad nigredinem sig-
nificat dolorem splenis. Et egestio facta etiam in ic-
tericia ex splene non est multæ albedinis, quod est,
quia natura constringitur, & exiccatur multum in
his causis. Avicenna: Ictericia est alteratio coloris
corporis foeda ad citrinitatem tendens, aut nigre-
dinem propter cursum humoris citrini uel nigri
ad cutem, & quæ sequuntur ipsam sine putrefactio-
ne, quæ si ei associetur faciet accidere tertianam in
citrina, & quartanam in nigra. Et membrum qui-
dem generans choleram in natura, est epar. Nam
cum ualde calefit complexio epatis, facit chole-
ram Ictericia quæ est in colica, fit propterea quod
humor viscosus glutinat faciem meatus, quare cho-
lera non effunditur ad intestina. Ictericia autem ni-
gra splenetica, ipsa in modum suæ generationis est
secundum ictericiam cholericam. Et in illo qui ha-
bet ictericiam factam, & non curatur neque resolvitur
eius materia, est timor, & pluribus eorū associatur
mors

mors subita. Scias q̄ in plurib. ictericis citrina et nigra tingitur urina, et quāto urina est plus citrina & acutior, est magis significatiua sanitatis epatis et uirtutis ipsius. Et facta à cōplexione calida epatis, non albescit cū ea egestio ea albedine quā habet oppilatiua, imò quādoq; tingitur plus, et nō sentitur grauitas quae sentitur in oppilatiua. Et albificatur ex oppilatione egestio in primis, deinde accidit ictericia. Et cū epatica non albificatur egestio, nisi gradatim. Cōtinua non fit à splene omnino, licet nigra quādoq; fiat ab epate, uerum nigra splenetica maioris est nigredinis. Et uomitus iuuatiuus est in omni citrina, & istis quidem nō conceditur ut bibant uinū nisi plurimē permixtum, & ut nō perueniat nisi ad illud quod est lene ex carnibus, & ad ius carnis auis. Et omnis qui habet ictericiam ex causa calida, oportet ut deuitet uigilias, & iram, & motum plurimū, & balneum. Et dicitur quod ictericiā patientes, iuuantur per considerationē in rebus citrinis. Illud enim mouet naturam ad expellendum materiā citrinam totam ad cutem. Ego uero non sum ex illis qui negent huiusmodi curationes, sicut negant plures eorum qui philosophantur ad eas. Constantinus: Nomen ictericiæ à simili sumptum est, à uolucris, scilicet aurei uel crocci coloris, quæ me-

dia æstate solet esse in colore deserta. Ictericia autem est commixtio cholerae & sanguinis, diffundens se per omnia membra corporis cum sanguine, & apparens in corporis superficie. Nutriamus cum chrisolocanna, portulacis, bliti, cum amygdaleo, demus ptisanam, pisces recentes, pullos, cum aceto et saccharo. Trochisci ualentes ad ictericiam, oppilationem epatis et splenis: Recip. Hierapicrae, absinthij, succi eupatorii ana. ʒ. 2. rosae, spodij, squinanti, folij, azari, ana. ʒ. 1. s. laccae, rheumbarbari ana. ʒ. 1. croci, scamonij ana. ʒ. s. tempera cum succo endiuiae, fac trochis. de ʒ. 1. s. & da. 1. cum succo endiuiae, et oxysacchara mane.

Ex traditione autorum recentium.

Ictericia est cutis defœdatio uniuersalis, propter humorem innaturalem in exterioribus corporis dispersum. Et differt à morphea, quia morphea est maculosa nō continua. Item ictericia fit propter uitium in secunda digestionē, morphea autem propter uitium in tertia digestionē, quia deficit uirtus assimilatiua. Ictericia autē quandoq; generatur à rebus exterioribus, ut à morfu reptilium scorpionis, aut à ueneno sumpto integrius sanguinem corrumpentibus. Quandoq; causatur

tur à causa interiori, & hoc dupliciter, ut aliquan-
do ui naturæ, aliquando ui symptomaticis. Vi naturæ
quando natura confortatur ad expellendum feces
in die septimo, uel alia die critica sibi proportiona-
ta, & hoc est bonum signum. Vi autem morbi, sicut
ex abundantia materiæ in die non critica ad exte-
riora exeunte & prorumpente, & præcipue si fiat
in febre ante septimum diem, & talis semper est
mala, quia mortem & morbi prolixitatem signifi-
cat. Item icteritia aliquando fit cum febre, aliquan-
do sine febre, & secundum hoc est regimen eius di-
uerfificandū. Diuiditur autem icteritia in tres spe-
cies, scilicet in aureā, in agriatapegaseleantos, &
in melanchimon. Aurea fit de cholera mala, non ta-
men adusta, unde retinet proprium colorē, scilicet
ruffum uel subruffum, unde denominatur ab auro,
tales enim icterici similes sunt auro. Agriatape-
gaseleantos nominatur à psitaco habente uiridem
colorē, qui psitacus dicitur, ab agriata quod est a-
greſte, pegaseleātos quod psitacus, tales enim sunt
uirides, quia cholera adusta exterius eos sic depin-
git. Melanchimon uero dicitur à melā, quod est ni-
grum, & chimus, quia fit de chimo nigro melanco-
lico cutem exterius denigrante. In cura autem ic-
tius passionis necessaria est cognitio causæ, quæ

X 3

per

per propria signa est cognoscenda, hoc tamen ab initio sciendum quod ictericia ex febre ante. 7. diē generata, à medico est relinquenda, rarissime enim ista curatur, nisi sit cū fortissima uirtute, potest aut generari in febre, et sine febre. Sed in febre nō est ex eadē causa, ex qua generatur sine febre. In ictericia uero curanda siue curabili, primo uidendū est utrum sit cum febre, aut sine febre. Si sit cum febre, primo febri subueniendum est, materiam digerendo, & eius maliciam reprimendo. Cessante febre, attendendum est utrum materia remaneat euacuanda, & si hoc in declinatione febris acutę digeratur, & similiter expellatur, si fiat ictericia sine febre, mala materia existens in corpore digerenda et euacuanda est, & corpus perfectē mundificandū, sed si in corpore postea infectio remaneat, cum dissolutiuis est insistendum. Si ergo ictericia sit ex mala epatis complexione, uel uenarum, insistatur cum alteratiuis corpore mundificato. Si fiat ex apostemate, fiat mūdificatio secundum causam apostematis & epatis. Si autem sit ex oppilatione, utendum est deoppilatiuis, quę ab autorib. ponūtur. Contra infectionem in corpore remanentem, sic propriè operandum est: Singulis diebus drach. 2. bibātur de succo lactuce, & loco eius ponitur lactucella si inuenia-

ueniatur. Item fiat stupha ut pori cutis relaxentur.
 postea uero lauetur facies cum succo maligranati
 et forti aceto, et due guttæ succi maligranati oculis
 instillentur. Item aliter: Fiat puluis de spodio, raa
 fura eboris, santalis rubeis, rosis, mirobalanis ci
 trinis, & rheumbarbaro, & illo puluere utatur
 singulis diebus cum succo endiuie, & cum uino te
 pido albo & subtili. Solutiuum minoratiuum in icte
 ricia: Recip. Casiæ fistulæ unciam 1. thamarindorū
 drach. 2. rheumbarbari electi drach. 1. aquæ sumi
 terre 3. 1. seri caprini quod sufficit pro potiōe, rhe
 umbarbarum prius minutim incisum infundatur in
 dicto sero, per horas. 12. deinde optime exprima
 tur, coletur, & substantia abijciatur, & expressio
 ni reliqua omnia addantur, misce & fiat potio. Di
 gestiuum: Recip. Syrupi acetosi simplicis, iulep uio
 lati ana unc. 1. aquarum endiuie, cuscute, rapha
 ni, ana. unc. 1. misce. Solutiuum eradicatorium: Re
 cip. Casiæ fistulæ 3. 1. thamarindorum 3. 2. rheum
 barbari electi, electuarij de succo rosarum ana. 3.
 1. aquæ sumiterræ 3. 1. serini caprini q. sufficit p po
 tione. Rheubarbarū in frusta minuta diuisum et nō
 pistatū, infūdatur in dicto sero ut supra, reliqua o
 mnia addātur, misce et fiat potio. Cōfectio: Recip.
 Specierū diarrhod. abbatīs 3. 1. trias. 3. 5. trochi
 scorū

scorum de rheubarbaro ℥. 5. seminum cōmunitū mē
 iorum frigidorum ℥. 3. sachari albi ℥. 2. misce, &
 cum aqua cuscute quod sufficit ad incorporandum
 fiat confectio in morsellis ℥. 3. pro morsello. Soluti
 uum usuale: Recip. Lactis caprini, cartami cōtusi, in
 fundantur in dicto lacte tribus horis, deinde totum
 aggregatum cum coagulo coaguletur, & taliter di
 mittatur per horas. 12. ultimo in dicto lacte in frus
 ta diuiso auferatur serum, deinde: Recipe dicti se
 ri ℥. 4. sachari albi ℥. 1. aquae endiuiae ℥. 1. mi
 sce, hoc enim singularissimum est. Digestium usua
 le loco syrupi: Recip. Aquarum endiuiae ℥. 2. cuscute
 ℥. 1. sachari albi ℥. 1. misce. Ad sanandam icteri
 ciam utatur quotidie scariola cum cibis & potibus.
 Experimentum in ictericia est, ut coquatur cortex
 fabarum in aceto, & mixta palea ordeï fiat suffimi
 gatio, & si uis admisce parum de absinthio.

De passionibus lienis seu splenis.

Cap. v.

Iuxta traditionem Græcorum & Latinorum,

IN sinistra parte aduersus iecur lien pa
 rum inferior suillo similis habetur, pur
 gamenti sanguinis receptaculū, cum hu
 morem atram bilem nostri, Græci melancholiam
 dicunt. Hic non ut iecur præcordijs, sed sinisteriori
 uentriculi

uentriculi parti & omento committitur. Eius quida-
dem materia mollis est, rara ac fistulosa, longitudi-
nis crassitudinisq; modicæ, sed lienosis ita plerunq;
intumescit ob humoris confluuium, ut zona ueluti
cingere hominem uideatur cum sordibus (ut Plato
inquit) iecur abundat, lienis raritas id purgat, &
eas combibit, quoniam concauum est & exangue,
unde purgamentis impletum excrescit cursoribus
(ut traditur) peculiare impedimentum, propterea
quandoque nonnullis laborantibus splen inuritur.
Adimi posse homini sine uitæ periculo, uerisimile
non est. Liene solito ab iecore humorem attrahere
melancholicum, qui ueluti corporis est lutum, si eius
attrahendi uis infringatur debiliteturq;, aut meatus
oppiletur quo prius atrum humorẽ uenabatur, san-
guis impurus per totum dilabitur corpus. Verum si
tenor dolorq; in liene sit oppilatio, indicatur quod
si horum nihil, sitq; potestatis attrahendi imbecil-
lis, sitq; atræ bilis uomitus siccæ febris, aliaq; cachœ-
tes, qualitate lienis ostendit retentionem uimq; de-
bilitati. Si excernēdi ipsius imbecillitas amoueat ap-
petitum, neq; fertur melancholici humoris redun-
dantia ad os uentris, ut exacuat appetitum. Obstru-
cto in liene humore melancholico, primo quidem
inflammatio fit feruore & dolore tenoreq; demon-
strata.

strata. Posterius etiam in girum cadit, seruire & dolore pacato. Tumore autem & duricia permanente, his nimirum corpus male olens euadit, & gingivæ abroduntur, & in cruribus ulcera sine cicatrice permanent, in quibus iecore pariter elangueunte, ut diximus, aqua intercus euadit, lienisq; distemperantias propemodum, ut iecoris curabimus. Permanente uero inflammatione ab ancone sinistro uenam secabimus, aut in extrema manu, quod ex longiore interuallo fiat conuulsio, aut ob aliquam naturalem affinitatem. Inde apponenda cataplasmata per attenuantia, ne manifestus aliquis calor appareat astringenda apponendo aliqua, id autem est sue nature quod salis flos appellatur, idque cataplasma mirificum est: Telis unc. 4. hordeaceæ, cardamomi ana. unc. ficuum pinguiū. 31. peristerionis herbæ aridæ 3. ficus irrigandi sunt acerrimo aceto, & coquendi cum alijs iam discissis. Inde rursus coquendus fimus capræ cum cruda lyfi, coquendo in oxycrato cataplasmata facta cito, habeat quoque, si uelis, salis florem calefacto cyprino, cum paucis aceto utere. In cataplasmatibus primo quidem simplicioribus, cuiusmodi est ceræ drachmas 32. tauri tantundem, nitri 3. 3. rhe fine terebinthinæ, agni semine, capparis radieis, corticis

corticis ana. unc. 3. coquendo, inflammatione in a-
ridam duriciem incidēte ualidioribus utendum, ut
superficies remollescat, ut est ex caprarum fimo,
qui spirachi dicuntur, & citrino. Conferunt e-
tiam duriciei, capparis cortex aceto eliquatus, &
cataplasmata factus, qui sanè etiam potus ex ace-
to, uel oxymelle exhaurit crassos & tenaces hu-
mores. Est etiam salicis quoque cortex simili-
ter illitus, centaurij quoque succus foris appositus,
& potus, & lupinorum amarorum decoctio cum
ruta & pipere pota, farinaq; ipsorum impacta per
cataplasmata, necnon aqua in qua sæpe candens
ferrum extinctum sit per se data cyathis. 3. febrici-
tātibus, sine febris autem cum uino, & cū aceto cya-
thus, uel laphati agrestis radice cum scylla triobo-
lus, uel dato acetum scyliticum uel oxymel & com-
positum, panacis radice, ammoniaci, capparis radi-
cis, corticis struthij, scyllæ tostæ internum æquis
partibus 3. dato, facit etiam hoc asthmaticis & hy-
dropicis. Epithema iecori superimpositum, leuans
eius tumorem mirificè ex Alexandro & Tralliano.
Cydoniatum: Tolle farinam ordeï, fœnugræcum
contusum æquis portionibus, omnia subige o-
leo rosaceo, & iecori superimpone, nardus
cum

cum aqua frigida pota, epaticis, & nephreticis & ictericis succurrit, laphatus cocta in aceto & appositita, spleni medetur.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.

S Plenis passio duricies est sui, quæ in pro-
patulo est sensui, quia facile potest tangi,
unde fit ut non alia significatio necessa-
ria sit, et cum splen magis magnificatur, multo plus
corpus maceratur. Aliquando splenetici uomunt
sanguinem cholerae nigrae pertinentem, & aliquan-
do emittitur cum egestione, quandoque eorum appe-
titus ad comestionem augmentatur, & aliquando
pigritia totius corporis cum tristitia, & risus parui-
tate contingit ex sanguinis corruptione, & parui-
tate eius in eorum corporibus, unde Fledius Alexan-
drinus: Splen, inquit, est instrumentum risus, cuius a-
ctio est turbulentiam sanguinis trahere sibi. Cum au-
tem uirtus deficit in turbulentiam trahendo sangui-
nis, remanet in sanguine clausa, & obscuritatem cum
nigredine præstat, unde per totum corpus, obscurus
uadit & melancholicus, & ideo color naturalis im-
mutatur & niger efficitur. Cum autem splen trahat
sanguinis turbulentiam, & feces clarificet sui sub-
iecti, necesse est ut sit clarus, & temperatus, & per
totum

totum corpus dispergatur sanguis, cum huius temperamenti sit atq; clarificationis, animam non sollicitam & gaudentem reddit, quod Eledius intellexit, cum splenem esse instrumentum risus dixit. Si splenis passio certificetur antequam confortatio & durior sit, facilius fit in curatione, & obediens in medicamine, quod si neglexeris donec in oppilatione & apostema indurauerit, durus est ad curandum, & cum splen habet duriciem, medicari oportet cum cataplasmate & epithemate, et emplastris non solum exterius, sed fortis ad bibendum detur, quia splen medicinam accipit epate fortiolem & grossiorem. Serapio: In splene quatuor sunt uirtutes sicut in epate. Vna est earum quæ attrahit sanguinem melancholicum ab epate. Et secunda uirtus digerens hunc sanguinem quo nutritur. Et tertia eius uirtus est, quæ expellit superfluitates melancholicas ad stomachum. Et quarta uirtus qua retinetur melancholia & sanguis grossus qui effunditur ad ipsum, donec recipiat digestionem. Dum ergo uirtutes istæ permanent remanentes secundum dispositionem suam naturalem, tunc corpus mundificatur à superfluitatibus melancholicis, sicut oportet & splen est sanum, nec est ægrotudo in eo. Et quando debilitatur una earum, tunc nocumentum
ingredia

ingreditur super operationem quæ completur per
eam, quod est, quia si debilitatur uirtus attractiua
quæ est in eo, tunc effunditur sanguis melancholicus
ab epate ad totum corpus præter quod fit mundus,
& propter illud denigratur color eius & acci-
dit ab eo ictericia nigra. Et si debilitatur uirtus
mutatiua quæ est in eo, tunc secundum quantita-
tem qua mutatur eius humor melancholicus qui ef-
funditur ad ipsum, sunt accidentia in corpore.
Quod est, quia si est decliuus ad acetositatem, facit
accidere uirtutem appetitus cibi quando funditur
ad os stomachi, & si aduritur facit accidere tristi-
ciam melancholicam, & fortasse facit accidere sub-
uersionem stomachi, & fortasse facit accidere acci-
dentia alia multa, quando sunt ei dispositiones mul-
te. Virtus autem retentiua quæ est in eo quando
debilitatur, tunc sequitur illud, euacuatio humor-
is melancholici indigesti, quandoque per uomitum
cum nausea, & quandoque per solutionem uentris se-
cundum declinationem superfluitatis & quantita-
tem eius. Apostemata autem quæ fiunt in splene,
non sunt secundum plurimum nisi dura, lapidosa, pro-
pter grossitudinem humoris qui uenit ad ipsum, &
fortasse fit in ipso etiam phlegmon, quod est, quia
in eo sunt arterie multe continentis sanguinem ca-
lidum

lidum ualde. Et iam extenditur et coarctatur splēs
et opprimitur etiam ex uentositate inflatiua quæ
cōtinetur in eo. Et cognoscuntur apostemata facta
in splene ex grauitate, quæ accidit in latere sinistro
ubi est splen. Quod si apostema est phlegmō, tunc
accidit ebullitio et dolor ex tensione et grauitate.
Et si apostema est melancholicum, est absq; ebulli-
tione, et neq; est caliditas, neque dolor, imò accidit
grauitas in duricie fixa. Communitas autem sple-
nis ad epar in dolore quando dolet, facit accidere
etiam sicut diximus ante. Et uentositas quæ inflat
splenem, et apostemat ipsum et opprimit eum,
cognoscitur in alia contrarietatum opprimentem
tactum, per hoc quod apostema expellit tactum et
tensionem uehementem absq; grauitate. Auicenna:
Extenuatio splenis significat bonitatem humorū,
et pinguedo ipsius maliciam ipsorum. Et eius cura
proxima est curationibus epatis, et indiget ut sint
medicinæ fortiores et penetrabiliores eis. Plura
igitur apostemata splenis sunt dura. Et splene-
ticus est ille qui habet duriciem in splene suo. Et
cum scis quod causa in illo est oppilatio ex sangui-
ne plurimo melancholico, oportet ut phlebotomes
basilicam et saluatellam et dimittas saluatel-
lam constringi per seipsam, cum constringitur
ante

ante casum uirtutis. Et omne lac præter lac camelarum est malum spleni. Et quando non cōferunt medicina, oportet ut ponantur uentose & scarificatio super ipsum. Et aqua ipsorum sit aqua ferrariorum, & omne in quo extinguatur ferrum ignitum multotiens. Rasis: Aegritudines splenis aut sunt debilitas eius ab attractione melancholice, aut magnitudo ipsius, & magnitudo eius, aut fit post febres, aut cum febre, aut sine febre, est autem ex apostemate duro uehementi, aut sine illo, aut est inflatio eius sola. Debilitatis autem eius ab attractione melancholice signa, sunt corruptio coloris, & conuersio eius ad nigredinem, & conturbatio albuginis oculorum cum casu appetitus. Et cura eius est positio uentosarum super splenem sine incisione uice uena, & emplastretur cum medicamine confortante splenem altera, & fricatio, & commotio eius, & motio ipsius cum manu, & equitatio, & exercitium, & id genus alia.

Recentium autorum de hoc sententia.



Plen est membrū oblongū, spongiosum, porosum, cauernosum, in sinistra parte collocatum, à media parte stomachi usq; ad finis

ad sinistram pelliculam epatis porrectum. Et ad
magnitudinem eius sequitur extenuatio corporis.
Et eius extenuatio & paruitas, significat bonitatem
complexionis. Ex magnitudine uero splenis multa-
rum egritudinum fit generatio, sicut hydropisis,
phthisis, & omnium, febrium compositarum. Splene-
netici autem continuum patiuntur dolorem in sini-
stro latere, moesticiam multotiens patiuntur pro-
pter uapores melancholicos uentriculos cordis in-
gredientes. Crassi uero uel repleti maiorem dolorē
sentiunt propter splenis repletionem. Splenetici
autem colorem habent fœdum, quia uel citrinum ad
liuiditatem pertinentem, uel pallidum aut nigrum.
Grauedinem patiuntur in tibijs propter descensum
melancholiæ, ascensus montis eos grauat, quia eis
deficit anhelitus. Appetitus autem in quibusdam
confortatur, in quibusdam corrumpitur propter
diuersitatem materie calidæ corrumpentis appeti-
tum uel frigidæ confortantis. Splenetici multoti-
ens contingit uomitus, & euomunt choleram, quod
est signum splenem egrotare de causa calida, uel
euomunt melancholiam acetosam, quæ cadens super
terram ebullit sicut acetum. Spleneticoꝝ urina
quanto subtilior tanto deterior, quia significat hu-
morem compactum, quanto autem intensior & ma-

X gis sub-

gis substantiata, tanto melior, quia significat malas
splenis humiditates cum urina currere, & malas
splenis habitudines. Per talem autem urinam, sple
nis frequenter soluitur ægritudo, passio autem sple
nis calida materialis uel sine materia sinistrum la
tus inflammat, sitim generat, lingue ariditatem &
coloris citrinitatem, casum appetitus, propter cali
ditatem replentem stomachum, frigiditas uero cō
traria cōsequitur, & addit multum rugitū & ace
tosam cructuationem. In sicca uero passiōe, multa
est duricies, & sanguis grossus, & urina est subti
lis. Passio uero humida, molle uel lene efficit latus
sinistrum, et humidum colorem cum paruitate sitis,
abundantia saliuæ. Splen positus est in obliquo, un
de à medicina transeunte cito non immutatur, &
fortiori indiget medicina quā epar, & propter sui
remotionem à uis medicinae, & propter sui immo
bilitatem. Epar etiam nobile est membrum & sub
stantiæ tenerioris. Phlebotomia de basilica multum
ualet in causa materiali calida, & phlebotomia de
saphenis in frigida passione splenis, & etiam in ca
lida de saluatella. Hec autem cōmunes sunt curæ in
oppilatione uel apostemate. Apostemata autē gene
ratur de quatuor humoribus simpliciter, uel de eo
rū cōmixtione. Raro autē de materia phlegmatica
genera

generatur. Et inter passionēs splenis oppilatio est frequentior. Est autē differentia inter oppilationē et apostema, quia in oppilationē omnes cauernae et pori sunt repleti absq; molesta extensione, et cōtinuitatis solutione. In apostemate uero materia est in uno loco aggregata uiolentia, uiolentam distentionem et solutionem cōtinuitatis faciens, quā apostemata splenis quandoq; sunt rotūda, quādoq; oblonga, quandoq; torturam habentia uel formam triangularem, quā uisu et praecipue tactu discernitur, et signa materiae praedictae cognoscuntur. Malicia autem complexionis splenis absq; materia solam indiget alteratiuis, sed si sit cum materia ferē indiget omni medicamine, sicut in unctionibus, infusionibus, euaporationibus, fricationibus, et emplastris, digestiuis, euacuariis, uentosis, scarificatione, phlebotomia, cauterijs. Contra duriciem splenis cum aliquali caliditate epatis, regatur regimine conuenienti, et fiat syrupus iste: Recip. Tamarisci, medianae corticum salicis, scolopendriae, prassij hortulani, endiuiae syluestris ana M. i. radicum foeniculi, petroselin, apij, acori, corticum capparorum, passularum ana uncia i. seminis portulacae uncia s. chamædrios, chamæpythios ana unc. s. seminis foeniculi, anisi, endiuiae ana
℥ 2 drach.

drach. 2. prunorum numero quinq; pulueris sacchari lb. 1. fiat syrupus parum acetosus, dosis unc. 1. s. usque ad 2. cum aqua calida. Sumpto syrupo purgetur cum pilulis de lapide lazuli secundum Mesue, & pilulis aggregatiuis secundum eundem ana ʒ. 2. Et facta purgatione quiescat aliquibus diebus, postea reconficiatur syrupus predictus & addantur sibi ista: Recip. Polipodij, senæ ana unc. 2. eupatorij M. s. epithymi unc. 1. sacchari unc. 3. ponatur epithymum in fine decoctionis, & sumat unc. 2. mane cum aqua calida. De tertio in tertium, uel de quarto in quartum diem cum interuallo octo dierum sumat unc. s. diasene secundum Nicolaum, ex illo in quo intrat lapis armenus, & lapis lazuli, & si uidetur necessitas additionis pauci rhubarbari fiat. Et in omnibus medicus ponderet uirtutem infirmi cum medicina, ne succumbat uirtus à forti pharmaco. A principio cum incipit sumere syrupum, incipiat ungere his duabus unctionibus ad partem splenis ieiuno stomacho bis in die, prima est hæc: Recip. Muscilaginis, seminis altheæ unc. 2. muscilaginis seminis foenugræci, adipis gallinæ ana unc. s. olei chamæmil. unc. 2. olei amygdalarum dulcium, hyssopi humidæ ana unc. s. conquassentur omnia simul, & si expedit, inspissetur cum

cum pauca cera citrina. Secundum unguentum est quod ponit Mesue in Cap. de pane porcino. Vtatur aqua extinctionis ferri, quam bibat post euacuationes factas. Et si expedit propter distemperantiam epatis ut epithemetur, illud cum santalis fiat, quod si hoc totum regimen et assiduatio, & iteratio eius non perducit ad sanitatem, intendatur regimini impinguatiuo cum electuarijs factis ex pineis, amygdalis, fisticis, & similibus, ut exhibitione lactis capreoli, nec (ut uult Gentilis) dubitetur de eo quod dicitur lac est malum spleni. Regimen autem impinguatiuum est notum. Quando autem duricies splenis est cum aliqua distemperantia epatis in calore, cura est difficilior, & si res prolongabitur suspicandum est de hydropisi, nisi praeueniatur alia accidentali aegritudine. Confectio trochiscorum Alexandri ad duriciem splenis & eius oppilationem ab humoribus uiscosis et pinguibus: Recip. Seminis anisi, azari, seminis apij, absinthij, amygdalarum amararum ana, quod sufficit, fiat puluis, & postea trochisci fiant. Confectio leuis stomacho & splene dolentibus: Recip. Galangæ, cimini ana 3. 2. misceantur cum melle ros. 3. 10. & detur cochlear unum. Unguentum ad splenem durum: Recip. Succipanis porcini, & succi qui emulgetur ex ra-

X 3 dicibus

dicibus salicis ana lb. 1. succi extremitatum tamarisci ℥. 2. olei yrini lb. 2. byssopi humidæ ℥. 3. aco-
ri ℥. 2. bdellij, armoniaci ana ℥. 1. s. ceræ citrinæ
℥. 6. fiat unguētum. Cura apostematum splenis ex
cura oppilationum ipsius, & apostematum epatis
innotescit. Curam ergo illorum proseguere secun-
dum illorū intentiones & modos. Et ex appropria-
tis in apostemate calido est alumen, in eo enim est
incisio aliqua cum qualitate equali, & stipticitas,
& uirtus frigiditatis, quare oportet ut misceatur
cum medicinis cinis eius apocrusticis, & resolutio-
nis. Et acetum etiam est ex illis, et aqua foliorum sa-
licis, & aqua portulacæ, & capillorum ueneris hu-
midi. Et sumere in potu de semine portulacæ ℥. 1.
cum aceto arnoglossæ exiccate & puluerizate, o-
mni die cochlear unum, & alia quæ à proprietate
operantur frigida.

Dedolore intestinorum Colica & Iliaca. Cap. VI.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Olica passio est ægrotudo maximi cruci-
atus in uentre sub cingulo in intestino,
quod dicitur colon. Supra aluum collo-
catur colon crassioris intestini pars, peruium est ac
late

late fufum cellulis plurimis infinuatum, in quibus
excrementa diutius immorantur. Indeque quondam
recipiunt effigiem, catoceliam Græci uocant, ab ali
quibus aluum etiam uocari ſcio, reni ſiniſtro inuo
lutus annectitur, unde nephreticis colicisque mor
bis dolores conſimiles ſentiuntur, abſtinentia ta
men inter cæteras notas diſcernuntur, illos eleuat,
hos aggrauat cibus. Deinde id inteſtinum lienem
attingit, ſurſum uerſus ad dexteram ſtomachum
ſcandit, huius ob id inteſtini noxiuſ humor os ſto
machi afficit, & præcordia. Vnde lipothymia ſæpe
concidunt ægri in ſela aluum deiicientes, nec ſine
ratione id inteſtinum inter inferiora annumeran
tur. Serenus: Cum colon inuiſum morbi ge
nus intima carpit, Mande galeritam uolucrem
quàm nomine dicunt. Hic morbus cordapſos eti
am dici ſolet, & cordios apud Celſum libro quar
to. Iliaca paſſio, eſt morbus gracilioris inteſti
ni, ileos enim non ilios, inde ilioſi qui laborant eo
morbo. Ilioſi uero dicuntur, qui iliorum dolore
torquentur. *Λαγών* uero etiam apud Græ
cos dicitur iliorum dolor. Iliæ enim Græci *λαγόν*
uocant appellant laborem uel dolorem. Remedia
itaque Colicæ paſſioni ſunt adhibenda: Primum,
quibus ex frigidis, & tenacibus, & craſſis humori

bus sunt dolores excitati. Prouidēdum ergo ne ue-
hementer incalescant. Nam si multum incaluerint
huiusmodi humores magis inflantur, quos interscin-
dere concoquereq; oportet medicaminibus mini-
mè inflātibus, attenuantibusq; ac arefacientibus ci-
tra nimiam calefactionem in morbi primordio. Ex
aluo igitur stercus educendum, commodis ei mor-
bo clysteribus. Adhibendum oleum in quo coctum
sit cuminum, uel ruta cum adipe anserina, uel gal-
linacea, uel ex radicibus agrestis cucumeris exco-
ctis, & myrrha, et blito, & oleo cucumerino, ac sæ-
pe oleo cōmuni iniecto, excernitur uitri faciem ha-
bens pituita, infestantemq; confestim dolorem pla-
cat, quod si ob doloris magnitudinem consternen-
tur, est balneum admouendum ex melle, cumino,
nitro, rutæ semine arido, brassicæ caule probè fer-
uesfacto & salsore irrigato, aut brassicæ cinis mel-
le ammixtus, anus autem illiniendus succo cyclami-
ni cum melle & nitro, aut centaurio cum melle &
nitro. Alexandri cura probat, ut parum umbilici ex-
cisi ab infante cum nascitur, argento, aut auro in-
clusum, sale maceratum ne corrumpatur, qui gesta-
uerit morbi colici erit expers. Mirifice prosunt eti-
am cucurbitulæ circa umbilicum ad dolores aufe-
rendos. Caprinum epur ure, dissolue, & da potan-
dum

gum cum uino & proderit. Stercus lupi si fieri possit habens osicula da ferendum coxæ alligatum aut lumbis, ut neq; terram, neq; aquam attingat, & leuabitur dolor, ut Alexāder tradit. At Diogenes: Tere, inquit, in puluerem & cribella, da languēti ex aqua calidi dimidium cochlearium. Potiones autem sint absinthium, & cuminum æquis partibus, uel panacæ cum aqua, uel castorij, & anisi, & piperis 3. cum oximelle. Attenuata autem pituita catapotijs huiusmodi purgabimus: Aloë, euphorbio, coccognidio puro, scāmonio, æquis partibus dentur 3. 2. His autem congruit uictus calidior & aridior. Acutissimus tenuioris intestini morbus ēi λένος à Græcis appellatus, dolor est cum periculo, casum grauem secum ferens, eo nanq; detenti miseranda morte euocatur, stercore per os postremo euadente. Constat autem hic morbus cruditatibus & opilationibus cum corrupta permanserint, & mortifera medicamina clademq; afferūt intestinis frequenter inflammatis colica succedēte, affectione. Pueri igitur irrigationibus & cataplasmatibus, iniectionibus & balneis, ut in colicis diximus, curandi. Adolescentes uero & puberes sanguine leuandi sunt, si minus, cucurbitule admouendæ sunt per totum uentriculum multæ & inanes, & ubi dolor

Y 5 confricanda

confricanda astringendaq; sunt membra, efficacibus clysteribus quoq; utendum, & in oleum iniectionibus antidotis, & purgationibus omnibus, quibus & in colicis omnibus præterq; qui acris & uellicantibus uexantur colici, de quibus dictum humoribus, & si mirifice humores uellicantes euomuerint, anethū coctum, potumq; detur, post potum panem in calidā aquam immissum, statim dato manducandum, cibos calidos, præterea non cohibentes nutrimentum, rhum, et cuminum terendo dato potandum in oximelle cyathos sex. Qui in lethalem ileum lapsi fuerint, uomere cogito aquæ calidæ potionē, inde oleo calido potionandus, aut iure pingui quo adhuc euomant, post aliquot dies theriaca potionandi, durante uero oppilatione scisso lacte cum pauco scammonio, uel aloë, aut purgante aliquo alijs deijcienda est.

Secundum Poenos & Arabes.



Egritudines quæ accidunt in intestinis ex colica, non accidunt nisi aut ex apostematibus, quæ sunt in eis, aut ex humoribus acutis mordicatiuis secundum aliquem modorum difficilis dissolutionis fixis in eis, aut ex uentositatibus grossis uaporosis retentis in eis. Et accidentia communia quæ cōtinuantur in hac egritudine & renum,

renum, sunt nausea, uomitus, dolores, retentio magna nature, et uentositates, quarum uia sunt ut egrediatur superius & inferius, uerū tamen ista accidētia in hac ægritudine sunt uehementiora, & plus consecutua quā ipsa sunt in dolore renum, & non figitur dolor in loco uno, sed permutatur per mutationem. In dolore renum sunt debiliora, & sunt in loco uno. Urina est etiam in principio ægritudinis clara, aquosa, deinde post illud fit crassa, & habet sedimen, & in fine fit in ea arenosum sedimen, & propriè quādo est dolor colicæ ex apostemate quod est phlegmon, tunc enim necessario sequitur ipsum febris, & dolor grauis, & sensus inflammationis, & sitis. Et sequuntur ista accidētia etiam illum qui habet hanc ægritudinem, propter humores mordicatiuos cum dolore mordicatiuo & siccitate in lingua, & sentit cum acuitate urinae. Et si hæc ægritudo est propter phlegma grossum uitreum, aut uentositatem & inflationem, tunc accidens commune in ea est frigiditas inferiorum, & dolores chronici grossi propter humoris ipsius frigiditatem & tēSIONem membrorū in quibus est cōtētus. Et propriè si est ex humore crasso uiscoso, tūc est cum grauitate tēSio. Et si est ex uētositate uapōrosa, & inflatione, tūc est tēSio absq; grauitate, et si expellit

expellit natura fecem declaratur quod in ea sunt uentositates, & fortasse natat supra aquam, & simulantur in substantia sua stercore uaccino. Et egritudo ileos accidit quando oppilantur intestina gracilia, aut ex apostemate, aut ex stercore duro, aut ex humiditate grossa & uiscosa. Constantinus siue Isaac: Causa colicæ passiōis est septiformis. Prima, est cum augmentatur calor igneus & cholericus super stercus, unde & humiditas stercoris desiccatur, & induratur, ideoq; non egreditur. Secunda, cum cibus in sua essentia est siccus & stipticus egestionem exire prohibens. Tertia, est cum phlegma uiscosum intra illud augmentatur intestinum & inuiscatur, ut oppilet uias eius, & prohibeat exire stercus. Quarta, cum grossa uentositas in hoc intestino inuiscatur, uel causa frigida cōplexionis, uel ex defectione stomachi ad digerendum, uel epatis, uel ex cibo in sua essentia uētofo et inflatiuo. Quod si inueniat intestinum defectum, & ad hanc passionem paratum, generat colicam passionem propter constrictionem uentositatis in egestionem stercoris. Quinta, cū nascitur apostema in hoc intestino, prohibent exire stercus. Sexta, cum augmentatur in uentre lumbrici & ascarides, qui inuiscati & intorti, stercorea non permittunt exire, unde in colicam

eam incidunt passionem. Septima, cum sensus intestini deficit, neque nocumentum stercoris sentit, unde stercus in intestino remanens non exit. Multi antiquorum dixerunt hanc passionem esse ex defectu in intestino expulsiue uirtutis, uel ex defectu sensus intestini, quia si expulsiua ad expellendum digestionem ab inferiori parte deficiat qualibet ex causa, uel sensus intestinorum lacertorum innatus exire non permittat, neque ex utroque latere intestinum opprimat, ut ad inferiora deponat, necesse est in ileon deueniat. Ileos uero dolor est intestinorum, prohibens stercus exire ab inferiori parte, et aliam quando cogens manere, cuius causa est bifaria, uel de calido apostemate in subtili intestino nascente, uel de humoribus frigidis grossis et crudis inuiscatis. Accidentia sua inseparabilia, sunt uomitus spissus, omnia quae bibit euomit, dolor est nimius, tortura in uentre superiori. Auicenna: Colica est integra intestinalis passio dolorosa, cum qua difficilis sit exitus eius quod egreditur per naturam. Et colica quidem secundum ueritatem est nomen eius in quo est causa in intestinis grossis, quod si est in intestinis gracilibus, tunc proprium nomen ei secundum scientiam ueram est ileos. Et malicia complexionis humidae singularis non semper est causa colicae.

colica, nisi per accidēs, scilicet, quod sit calida, frigida & humida materialis. Et quando accidunt colica & ilcos secundum semitam accidentis ægritudinum pestilentialium aduenientium, & perueniunt de regione ad regionem, & de homine ad hominem, & iam retulit illud quidam Medicus de antiquis, & dixit quod perueniebant quidam eorum ad epilepsiam quæ erat mortalis. Et plurimum quidem accidit colica à phlegmate crasso, deinde à uētositate forti facta et penetrāte in tunicis intestinorum, & uillis ipsorum propter solutionem cōtinuitatis ipsorum. Et colica quidem multotiens permutat ad paralytim, & sanatur per eam, & similiter quandoq; sanatur per dolores iuncturarum, & quandoq; ad dolorem dorsi, & quandoq; ad melancholiam & epilepsiam, & quandoq; ad hydropisim. Fortitudo doloris uomitus, post uomitum sudor frigidus, frigus extremitatum, singultus, post singultum turbatio rationis, spasmus, retentio eius quod egredi oportet saltem cum ingenio est res mortalis. Et dolor lapidis est paruus quasi sit acus, & colicus est magnus, scilicet, spacio. Et colicus incipit ab inferiori parte dextri lateris & tendit ad superiora sinistri, & quando confirmatur dilatur in dextra & sinistra. Renalis uero incipit à
superio

superioribus, & descendit paulatim, & est decli-
uior ad posteriora. Renalis fit fortis in hora ua-
cuitatis, & colicus alleuiatur in ea, & si fit fortis
consumitur aliquid. Colicus fit fortis subito, &
lapidosus paulatim, & fit fortis in fine suo, colicus
ad partes mouetur plures, & renalis figitur.
Clysteria & exitus uentositatis & fecis alleuiant
colicum, & non alleuiant renalem aliquo modo,
de quo fit curandum in pluribus dispositionibus,
& è conuerso lapidem frangentes. Et ileos acci-
dit ex omnibus causis ex quibus accidit colica, &
quandoque accidit propter potationem specierum
uenenosarum facientium ileos. Et deterior ileos
est ille, in quo expellitur stercus ad superiora, &
nominatur foetidus, deinde ille in quo est sudor
foetidus, deinde ille in quo est anhelitus foetidus,
deinde ille in quo est eructuatio foetida, deinde
ille in quo est inferior uentositas foetida. Signa
ileos sunt ut sit dolor super umbilicum, & non e-
grediatur aliquid omnino desubtus, & non fiat in-
uamentum magnum cum clysteri, sicut dicit Hip-
pocrates, & quandoque uomunt uermes & ascari-
des in hac aegritudine. Cura ileos appropinquat cu-
rae colicae, uerū est fortior, & illud quod bibitur est
magis inuatiuū in eo, et est necessariū clystere etiā.

Nam

Nam illud est adiutorium bonum, bibito, & equale est siue præmittatur siue postponatur. Et phlebotomia magis hic est necessaria, nam si fuerit apostema non erit eius excusatio, et si fuerit dolor fortis ex quo timeatur apostema, oportebit uti ea, ex hac enim quandoq; accidit separatio humorum malorum in corpore, propter retentionem eorum à dolore. Curatur etiam cum uentosis plurimis positis in superioribus uentris. Rasis: Cōfectio pilularum soluentium colicam uelociter: Recip. Aloës 3.10. scammonij 3.2. s. interioris colocynthidis 3.3. tertiam, salis gemmæ 3.2. serapini 3.3. sebram tantundem, & sunt decem doses secundum Rasim. Cōfectio ad colicam frigidam: Recip. Cimini, anisi, ameos ana pugillum unum, bulliant bene et in colatura resoluantur penidiarū 3.5. & medullæ cassiæ fistulæ 3.6. & fundatur de super oleum amygdalarum dulcium 3.3. Cōfectio medicaminis, quod datur cum dolor uehemens commouetur, & sedat dolorem quando timetur quod ægro superueniat syncopis propter uehementiam doloris: Recip. Zingiberis, macropiperis, styracis liquida, croci, seminis hyoscyami ana, castorij, apij ana partem s. fiat pilulæ sicut cicer, dosis ab aureo s. usq; ad aureū 1. Modus cōfectionis ad colicā mirabilis: Recip.

Cartami 3.

Cartami 3. 1. serapini 3. 10. cōficiantur cum peni
dijs, dosis 3. 5. Cōfectio olei quo ungitur uenter et
spargit uentositatē: Recip. Olei rutacei 3. 10. cum
quo dissoluatur castorij 3. 2. euphorbij 3. 1. & fiat
inunctio cum eo.

Ex traditione autorum re-
centium.

Colica uero quædam est mala & despe-
rata, sicut illa in qua est uomitus cōtinu-
us, sudor frigidus, & frigiditas extremi-
tatum, & multus singultus, & spasmus, & permix-
tio rationis, & omnimoda uentris cōstipatio. Hæc
omnia sunt mortalia. Item si appareat pustula ni-
gra, sicut faba super uentrem sequenti die morietur.
Significatio uero bona, dolor mutabilis, & euacua-
tio per uentrem aliquanta, et alleuiatio post suppo-
sitoria, uel clysteria, & priuatio signorū malorum
prænominatorum. Signa specialia diuersarum spe-
cierum colicæ partim sumuntur ab indicio patien-
tis, sicut ab eo quod præcessit ad regimen, & iterū
à rebus naturalibus, & non naturalibus, & eorum
quæ sunt cōtra naturam. Ileos similiter quædam in-
curabilis est, ut illa in qua est spasmus, uomitus con-
tinuus, singultus, & permixtio rationis. Item ileos
in qua urina exit cum destillatione, mortalis est in

Z septimo

Septimo die, nisi solvatur per febrem superuenientem. Item ileos in qua est inferior uentositas multū foetida mala est, peior autē est illa in qua eructuatio est foetida, & in qua anhelitus est foetidus, & illa pessima in qua stercus est foetidum, & exit per superiora. Cura autem colicæ præposituratur & permutatur propter uehementiam doloris. Cura enim recta & ordinata in colica debet inchoari à remotione causæ antecedētis, p̄ suppositoriū uel clystere, & per medicinas laxatiuas ab interiori sumptas. In hoc tamen casu aliquādo compellimur inchoare ab accidentibus morbi, & non à causa mitigādo nimium dolorē per saccellationes, embrochationes, epithemata, & quandoq; per narcotica, sicut dicūt autores. Cura autē ileos curabilis multum est difficilis, fit ergo per inunctiones, epithemata, per phlebotomiā, & per fricationē extremitatum, & per medicinas laxatiuas, & per syrupos, et per clysteria, & per alia quæ comedūtur & bibūtur. Est autē cura colicæ & iliacæ cōsimilis, sicut morbi cōsimiles sunt, ea tamen quæ bibūtur & per superiora sumūtur, magis sunt propria in iliaca quā clystere, ita tamen quod post assumpta per os mouētia materiam clystere adhibeatur, materia enim prius mota facilius cum clysteri educitur. Item in ileon
multum

multum confert phlebotomia ab initio. Dētur syru
pi in causa calida, & oximel in frigida cum aqua
multū calida, postea fiat clystere. Item aqua ualde
calida per se bibita, uel exterius per uesticā encam
applicata multū ualet. Item in frigida multū cōfert
hierapicra. Cōtra colicam uentosam, & partim ex
fece fiat tale enema: Recip. Oleorum aneti, spicæ
ana ℥. 3. olei liliorum alb. unc. 4. uitella ouorū. 2.
misce. Aliud: Recip. Olei chamæmile unc. 5. oleorū
anethi, liliorū, sesami ana unc. 3. uitellū oui 1. misce.
Aliud: Recip. Decoctionis capitis castrati arietis
℥. 12. oleorū spicæ, liliorū alb. anethi, sesamini ana
℥. 3. uitellū oui 1. hierapicra ℥. s. misce et fiat clyste
re. Enema aliud: Recip. Vini albi uinosi ℥. 8. butyri
℥. 6. uitellos ouorū 2. croci ℥. s. misce dormiat sup
uentrē compressum. Si leniatur ex aliquo istorū, po
stea fricetur suauiter locus doloris cum manu uer
sus dorsum. Dormiat multū si potest. Lenitiuū &
mitigatiuū doloris: Vitelli ouorū sine albumine sum
pti ante cibum cum modico croci, iuuat. Mitigatiuū
doloris, & resolutiuum: Recip. Aquæ chamæmile
unc. 3. cinnamomi ℥. 1. croci grana 2. sacchari alb.
℥. s. misce et potetur stomacho ieiuno. Lenitiuū do
loris: Bibat olei communis unc. 6. stomacho ieiuno
si non habet stomachi debilitatem. Solutiuum:
Z 2 Recip.

Recip. Hierapicræ Galeni ℥. 3. cassiæ fistulæ ℥. 6.
 sebesten ℥. 2. aquarum rutæ, aneti ana, quod suffi-
 cit misce & fiat potio. Resolutiuum: Recip. Pulue-
 ris sem. rutæ ℥. 5. pulueris sem. carui ℥. 2. aquæ fœ-
 niculi, uini albi aliquantulum uinosi, antiqui ℥. 1. mis-
 ce & potetur stomacho ieiuno. Euaporatiuum: Re-
 cip. Milij partes tres quod sufficit pro sacculo, sa-
 lis partes 2. fufuris, florum chamæmilæ, florum a-
 nethi ana partem 1. misce & fiat sacculus & debi-
 te calidus loco dolenti appone. Confectio resoluti-
 ua: Recip. Specierum diacimini ℥. 2. specierum dia-
 galangæ ℥. 1. cinnamomi ℥. 2. croci ℥. 1. sacchari
 albi unc. 6. misce & cum aqua rutæ & fœniculi
 ana quod sufficit, fiat confectio solida in morsellis
 trium ℥. pro quolibet morsello. Fomentatio euapo-
 ratiua: Recip. Florum aneti M. 1. s. florum chame-
 milæ, meliloti ana M. 2. absinthij M. 1. s. folij ru-
 tæ ana M. 1. squinanti M. 1. s. arthemisiæ M. 1. eu-
 patorij M. 1. s. pulegij M. 1. s. rorismarini M. 1. s. cala-
 mēti, chamædrios, camæpythios ana M. 1. s. radices
 aristolochiæ rotundæ ℥. 1. sem. cartami ℥. 5. sem.
 iuniperi, fœnugræci ana ℥. 1. sem. anisi, fœniculi,
 carui, ameos, sileris mōtani ana ℥. 3. Contundatur
 omnia grosso modo, deinde misce et bulliāt in suf-
 ficienti quātitate aquæ usq; ad consumptionē tertiæ
 partis

partis aquæ. Solutiuum facile: Recip. Brodij galli
 decrepiti ℥. 8. polypodij quercini M. 1. florū ane
 thi M. s. sem. cartami contusi ℥. s. salis ℥. 1. gallus
 prius optimè fusticetur, deinde occidatur et euisce
 tur, ultimo reliqua omnia in eius uentre includan
 tur, & cum ipsis optimè decoquatur, cuius decocti
 onis sumatur diætā, & fiat potio. Vnctio mitigati
 ua doloris, & resolutiua doloris: Recip. Oleorum
 absinthij, chamæmilæ ana ℥. 1. oleorum spicæ, lilio
 rum alborum ana ℥. 3. olei rutæ ℥. s. pulueris cinna
 momi ℥. 1. pulueris sileris montani, cassiæ lignæ,
 spicæ ana ʒ. 1. ceræ quod sufficit, misce et cum mo
 dico aceti fiat unctio mollis. Suppositorium resolu
 tiuum uentositatis: Recip. Pulegij, spicæ ana ℥. s.
 radicum myrcos, radicum aristolochiæ rot. ana ʒ.
 2. sem. apij, prassij ana ʒ. 1. sem. rutæ ʒ. 2. sem. si
 leris montani, anisi, fœniculi, carui, ameos ana ʒ.
 1. cinnamomi ʒ. 2. cimini ℥. 1. amygdalarum ama
 rarum ℥. s. bdellij ℥. s. cassiæ lignæ, styracis siccæ
 assæ ana ʒ. 1. croci drach. s. salis communis drach.
 1. mellis quantum sufficit pro suppositorijs confi
 ciendis. Syrupus cōferens colicæ & iliacæ phleg
 maticæ & uentose: Recip. Calamenti, origani,
 hyssopi, sampsuci ana M. 1. anisi, fœniculi, sisele
 os, carui, sem. apij, raphani ana drach. s. radicis
 Z 3 enulæ

enulæ ʒ. s. yreos ʒ. 3. meu, phu. anisi, acori ana ʒ. s. squinanti, sem. urticæ ana unc. s. florum roris marini, boraginis, buglossæ ana ʒ. 1. mellis communis despumati lb. 2. aceti scylitici unc. 4. in petia bulliantur zingiberis, galangæ, gariophil. ana ʒ. 2. spicæ ʒ. 1. Et quandoque sufficit syrupus ex melle scylitico cum geleniabin ana unc. 1. cum aqua fœniculi. Pilulæ de quatuor rebus expertissimæ: Rec. Colochintidis, serapini, salis gēme, diagrydij cocti ana partes æquales, terātur & cōficiantur cū succo porri ana ʒ. 1. Clystere benedictū pro nobilib. cum suauitate educens phlegma & melancholiam, & sanat colicā: Recip. Anisi triti, polypodij triti ana unc. 2. s. bulliant cum aqua lactis caprarū lb. 5. & dissolue hieræpicæ unc. 1. mellis unc. 2. salis ʒ. 1. s. olei uiol. ʒ. 2. fac cum reiteratione si oportet.

De diarrhœa, dysenteria seu dysenterion, lienteria & uermibus. Cap. VII.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Diarrhœa iugis uētris cursus sine uomitu, liquida aluus, & sæpius q̄ ex cōsuetudine fertur, atq; interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idq; peius est. Sed
uno

uno die fluere aluum sæpe pro ualetudine, atq; etiam pluribus, dum febris absit & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus lesurum erat, utiliter effunditur, uerum spaciū periculosum est. Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt. Dysenterion Græcè uocitatur, Latine uero tormen dicitur, & est intestinorum exulceratio, à δ'ὸς quod malum significat, & ἐντέρον, quod est intestinum. Tormen uel tormines masculini generis (ut ponit Nonius) à torquendo dicitur. Et ut Plinius inquit, mentastrum torminibus efficacissimum. Inde torminosi, & dysenterici qui patiuntur. Recentiores Medici accipiunt pro cruciatu uentris, sicut & Baptista Mantuanus de patientia, sed uix ita apud idoneos reperitur, sed ille ut hic, ita sæpe aliàs cum uulgo sentit de nominibus morborum. Intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat usq; modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam squamosis excernitur. Interdum simul quedam carnosæ descendunt, frequens deijciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Lienteria Græcè, hoc est, intestinorum solutio latine, λυω enim dissoluo ualet, ἐντέρον, intestinum. Est autem morbus ubi cibus non perficitur & digeritur, sed incoctus

Z 4 egeritur,

egeritur, inde lenterici qui aluini dicuntur. Lienteria est exire comesta, uel bibita in eadem qualitate qua sunt accepta. Galenus hanc passionem diffinit dicens: Lienteria est digestionis ablatio, cum cibis in stomacho nullatenus mutetur in liquorem, nec in colorem, nec odorem. Et est lenteria duplex. Vna quidem in superficie intestina exulcerans, in multis dysenteriae consimilis, ex alijs facta distillationibus. Altera uero quæ ob imbecillitatem cibum in uentre detinet, incoctaq; egerit nutrimenta, leniaq; exeunt incocta & humida uentre in totum distillante. In lentericis facile inconcoctus euadit cibus, eoq; coeliacis distinguuntur. Est ergo uentri cataplasma adplicandum: Lini seminis cum dactylis & echino, & bato cum oxymelle coctis, quod si inflatio affuerit misceantur cuminum, anethum, & ruta, aucta porro distillatione pariter apponimus mala cytonia, alumen humidum, acatiam, hypocistida, cecidem, uel ex his aliqua, uel omnia. Cerata uero ex myrrha, uinoq; aliquo astringente. Potus autem simplex: Arnoglossi semen, aut lappathi semen, malipunici cortices, uua arida, uel uuæ prematuræ succus aridus. Præsentaneum uero remedium est: Lappathi agrestis semen uncia, arnoglossi seminis uncia, hypocistidis drach 6. gummi uel

uel acatiæ tantundem. Sume contritis cytonijs co-
ctionem facito, cumini, piperis, rhois, syriaces, ba-
laustij ana ℥. 2. corticis mali punici ℥. silphij ℥. uel
aridi ℥. & potui infunde, uel misce oxymel mane,
& in uespera myrti atri cochlearium & dimidiū,
anisi, rosarum aridarū fac pastillos, et dato drach.
4. cum aqua. Theriaca quoq; ex uiperis præstans
remedium est. Dysenteria uero, quæ à Latinis tor-
men appellatur, intestinorum exulceratio est, quā-
doq; ex cessante tenesmo, uel uentris fractura qua-
piam, quandoq; inde est morbi principium ubi sunt
uaria biliosa excremēta, dein iuxta proportionem
cruenta, & postremo purulenta cuiusmodi è mor-
ticinis effluere consueuerunt. At quæ ab atra bile
tormina principium ducunt, lethalia sunt, quippe
quæ cum exulceratione cancrum subesse indicant.
Ex eo igitur quod effluit cum stercore ægritudi-
nis causa dinoscitur, excernitur nanq; aliquādo ni-
grior quā esse consueuerit sanguis, iecore exce-
ptum cibum non satis commodè concoquēte, ac ob
ipsius infirmitatem, uel uim extrariam sæpe è uen-
tre excernitur quiddam simile eis, quæ ex ablutis
recētibus eijcitur carnibus, ob hoc passionem hanc
uocitant dysenteriam. Communiter igitur utendum
est remedijs, quibus in coeliacis alijsq; contra natu-

ram utimur excretionibus, at proprie cōmoda erit
lemnia sigillata, seu pota, seu abiecta, prius clystere
facto ex mellicrato, inde salso & portulacæ suc-
cus idoneus à dysentericis potus, ipsaq; portulacæ
cocta in oxycrato mansa, cōuenit etiam arnoglos-
sum, & bati fructum ac folia, & althææ radicis co-
ctio. Hippuris ex aqua uel uino pota, eiusq; succus.
Fluores etiam alui arefaciunt oua ex aceto, tosta et
mansa. Nonnunq̃ autem (ut Celso placet) lumbrici
occupant aluum, hiq; modo ex inferioribus parti-
bus, modo fœdus ore redduntur. Atq; interdum la-
tos eos, qui peiores sunt, interdū teretes uidemus.
Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum,
aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit
contritum, uel hyssopum, uel piperis acetabulum,
scammonij paulum, uel etiam pridie cum multū al-
lium ediderit, uomat. Posteroq; die malipunci te-
nues radículas colligat quantum manu comprehē-
det, easq; contusas in aquæ tribus sextarijs deco-
quat, donet tertia pars supersit. Huc adiiciat nitri
paulū & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus
horis duas potiones sumat, aut aquæ, uel muriæ
duræ sic adiectæ, tum desidat subiecta calida aqua
in pelue. Si uero teretes sunt, qui pueros maxime
exercent, & eadem dari possunt, & quedam leuia
ra, ul

ra, ut contritum semen urticae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, uel mentha, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsa, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, et allium prodest, uel maluae oleum subter dedisse.

Iuxta mentem Poenorum &
Arabum.

Quando autem euacuatio est supra consuetudinem, tunc est aut propter gravitatem multitudinis eius quod recipitur supra stomachum, aut quoniam mordicat stomachum acuitate sua, et uadit propter illud ad expellendum illud, aut propter uiscositatem ciborum, & lubricitatem eorum, & proprie quando ambulat qui accipit ipsos successione susceptionis eorum, aut ex debilitate eorum, quoniam cibaria sunt diminuta, à necessitate sunt superfluitates eorum diminutae etiam, & si sunt grossa, pontica, tardatur in descensione. Et non est tarditas euacuationis superfluitatis, & antecessio eius propter debilitatem stomachi & intestinorum tantum, sed propter debilitatem lacertorum qui sunt super stomachum, & pectus etiam. Et euacuationes continuae quidem fiunt, aut propter debilitatem, aut mordicationem. Scias quod

quod lubricitas stomachi non est nisi ægritudo uentris & intestinorum, quæ accidit ut lubricent comesta uelociter propter quod alterentur penitus, nec qualitate sua, nec ipsorum substantia. Cōstantinus siue Isaac: Lienteria nascitur ex defectione uirtutis contentiue in stomacho, uel ex uulneribus in superficie stomachi & intestinorum. Defectio contentiue est ex mala complexione stomacho dominante, uel intestinis. Hæc complexio si est perfecta & firmata ut exire nequeat, aliquando inter stomachum & intestina, humor proprius unde nascitur est phlegma, patitur infirmus semper oxyremiam, id est, inseparabile accidens, exit cibus ilicò cum ingreditur sine ulla digestionem uel expressionem uirtutis, uulnera in superficie stomachi, uel intestinorū. Causam habet, humores acutos, calidos, pūgitiuos, insequentes contentiuam uirtutem uelociter antequam digerere incipiat, hoc modo infirmus sentit puncturam & ardorem, & nisi festinemus medicinam, in dysenteriam mutatur. Hæc species lenteriae nō habet oxyremiam in principio, quæ si quandoq; appareat cibum morari in stomacho, tamdiu ibi esse significat donec natura aliquantulum mutat, unde naturam intelligimus in suam actionem reuersam. Sed cū uideatur infirmus nihil tenere intra stomachum

stomachum, unde hoc fiat inquirendū est, aut enim est ex defectione uirtutis contentiue in stomacho, uel intestinis, uel ex uulneribus. Si ex defectione uirtutis contentiue, uidendum est unde defectio sit, aut ex mala complexione sibi dominante, aut de materia ibi coadunata. Si sit ex materia coadunata, mundificandi sunt humores cum medicina quæ cum expressione deponat. Si ex mala complexione sit sola, interrogemus infirmum utrum ardorem sentiat intra stomachum & sitim, & fumosam cructuationem. Ex his enim intelligimus, quia ex incensione caloris sit. Si nō senserint & multū comederint & parum digesserint, perpēdimus quod ex frigore sit, deinde medicanda sunt contraria contrarijs. Dysenteria est egestio sanguinis cum excoriatiōe uel uulneratione sui. Causa eius uel interior est, uel exterior. Interior, sicut digestio, aliās egestio cholericæ, acuta, pungitiua, quam patitur infirmus cum per intestina cholera acuta transeat, perforās & excorians, uel ex suo acumine uulnerans, uel ex falsi phlegmatis acumine, & sua salsugine idem in intestino faciente, sicut uidemus in uitrei actione, uel in uitreo phlegmate, uel aquosa humidate. Exterior, sicut de pharmacia, quæ ex uirtute sua & acumine facit simile. Cum enim intestinum inueniat defectum

defectum & discoopertum excoriat uelociter ipsum. Vniuersalis significatio dysenteriae est tortura, & angustia, & egestio sanguinolenta mixta cum cholera rubea, uel cum re alia coagulata alba, & uiscosa in interiori quasi uestimentum intestini. Particularis significatio dysenteriae est, cum haec apparent in digestionem: Si enim est cholericca, intelligimus esse ex cholera rubea. Si phlegmatica, cognoscitur esse ex phlegmate salso. Si exterior sit causa, ex inquisitione infirmi est intelligenda. Ascarides & lumbrici solent nasci in intestinis, qui uniuersaliter ad rem extra naturam pertinent, unde expelli oportet. Causa eorum est saturitatis multitudo, & indigestibilium ciborum acceptio, de quibus in intestinis crudi adunantur chymi, quibus cum calor dominetur excoquantur, & inde animalia illa generantur. Sunt qui dominantur in subtili intestino superiori, hi uocantur lumbrici, quia longi sunt, & quidam nascuntur in grosso intestino, quod est sub umbilico, & ascarides uocantur & cucurbitini. Qui hanc habent speciem, multum comedunt, & si non comedant, sentiunt puncturam, & incisionem sub umbilico, & in uentre. Sunt quidam nascentes in inferiori intestino, quod uicinum est ano, hi sunt uermes minuti,

minuti, qui si ibi remaneant ut crescant, patitur infirmus molestationem ceteris prioribus maiorem, sicut ablationem desiderij cibi, stuporem, mentis alienationem, febrem, & aliquando stridorem dentium in somno, maxime si non saturentur cibo, aliquando dormientes garriunt, & cum excitantur tremantes surgunt, plurimi linguam emittunt ab ore, & quasi masticant cum nihil in ore habeant. Oportet ergo ut festinemus ad eos emittendos, quia si in uisceribus remaneant, corpus consumunt, membra emolliunt, neque expelluntur nisi prius interficiantur. Auicenna: Scias quod omnis fluxus uentris, aut est ex cibarijs & cibis, aut aëre continente, aut ex membris. Et fluxus apostemosus sanior est quam epaticus, & ille qui est ex debilitate, est susceptibilior curationis. Quaecunque autem excoriatio melancholica est, eueniens secundum semitam inceptionis, est mortalis. Et multotiens quidam perforantur intestina habētis ulcera, & moritur secundū plurimū. Inquit Hippocrates: Omnis fluxus uētris post ægri tudines subito est malus, & significat mortem proximam. Et singultus in fluxu uentris est significatio mala. Et fluxus stomachi sanguineus sine dolore

dolore plurimo, & absq; nocumeto sequēte ipsum
in appetitu & alijs, est saluus. Fluxus uentris pro-
hibetur in quantum est fluxus, cum stipticitatem fa-
cientibus, & incrassantibus materias, & facienti-
bus conglutinationem, quandoq; etiam necessaria
sunt narcotica. Et quandoq; curatur fluxus uentris
cum diureticis, & sudorem facientibus, & dilatan-
tibus poros, & uomitum facientibus, omnia nanq;
hec mouēt materiam ad cōtrariam partem fluxus.
Et scias quod dormire est ex rebus magis iuuantibus
ei qui habet fluxum uentris. Et ex retinentibus
fluxum est positio uentosarum super uentrem, &
balneum, & fricatio. Et interdicatur eis uinum, si
autem non fuerit excusatio propter uirtutem, tunc
sit nigrum saporis stiptici & parum, & si expecta-
uerint ut non bibant omnino, curatur per se. Opor-
tet ut cum sciueris quod causa in ipso est oppilatio
in epate et meseraicarum, ut intendat cum apertio-
ne oppilationis. Et scias quod adeps caprarum bo-
num est supra totum illud, quod aggregatur in cly-
steri ex glutinatiuis, est enim succurrens, & sedās
mordicationem, & portat super locum ægritudi-
nis uelociter. Scias quod clysteria pinguia, glutina-
tiua sedant dolorem eius qui habet ulcus in intesti-
nis suis corrosiuum, sed non sanat. Et non cures in
corrosi-

corrosione nisi de medicinis conferentibus corrosioni, licet quandoq; lædant & dolorem faciant, nõ tamen respiciatur ad id. Non oportet ut retineatur fluxus creticus cum non perducit ad timorem. Si tenesmon fuerit ab ulceribus & corrosione, non ci-
bentur amaris, neq; salis ualde, neq; acutis, neq; acetosis ualde, omnia enim ista faciunt egestionẽ mor-
dicatiuam, dolorosam, aut excoatiuam. Et scias quod frigus facit tenesmon in pluribus horis. Ra-
sis: Excoatiõis autem quæ fit in ano & est tenes-
mon signa sunt, frequentia assellationis pauca, si-
cut sputum. Verbi gratia, cum dolore lædente pro-
pe anum, & illud cum quo egreditur egestio nõ est
permixtum cum fece, & iuuantur habentes eã sup-
positione collyrij plusquã reliquis curationibus.
Confectio trochisci ad tenesmon experti. Recip. Se-
minis hyosciami, sem. aneti, sem. foeniculi ana. ʒ. ʒ. ʒ.
ameos ʒ. 2. s. opij, ʒ. 3. seminis apij, ʒ. 1. fiant tro-
chisci aurei unius detur. 1. & administretur cum
non est caliditas.

Neotericorum super his
sententia.

In hoc loco agitur de triplici fluxu uen-
tris, sicut de Diarrhœa, Liëteria, et Dysen-
teria. Differentia autē ponitur inter diar-
rhœam,

rhœam, lenteriam & dysenteriam, quia in diarrhœa est simplex fluxus humorum, ut ciborum sine uentris exoriatione, uel continuitatis solutione. In lenteria est egressio ciborum indigestorum, nōdum in humores conuersorum. Dysenteria est fluxus humorum, sed cum exoriatione & continuitatis solutione. Diarrhœa uero de facili conuertitur in lenteriam & dysenteriam. Fit autem diarrhœa uel ex nimia repletione humorum, uel ex eorum nimia liquiditate, uel à nimia fluxibilitate, uel à nimia uasorum uel orificiorum largitate, uel à nimijs rheumatismis à capite, & ab alijs membris ad stomachum & intestina deriuatis, unde uiscera omnia & eorum orificia lenia & lubrica efficiuntur, unde continenda nequeunt retinere. Lenteria autem fit aut ex cibarijs, aut ex superflua humiditate, aut ex membris. Fit aliquando ex cibarijs nimis pinguibus & uiscosissis, qui non tandiu non possunt sustineri ut digerantur, sed talis lenteria cito recipit correctionem. Itē fit lenteria ex membris, id est, ex uitio membrorum, ut quando lacerti qui sunt instrumenta uirtutis retentiua, sunt paralyticati, ex paralyysi enim talium deficit retentiua. Item fit lenteria post dysenteriam propter abrasionem uillorum stomachi & intestinalium, & hæc est incurabilis. Item fit lenteria ex uulne

uulneribus intrinsecis stomachi et intestinorū, quæ sunt ab humoribus acutis. Item fit lenteria ex defectu uirtutis retentiuæ, propter maliciam complexionis solum, & iterum fit propter phlegma uiscosum in uillis adhærens, unde omnia redduntur lubrica, & talis lenteria lubricitas stomachi & intestinorū appellatur, propter phlegma uiscosum & lubricū, & uillos stomachi replet, unde cibus lubricus non potest retineri donec immutetur. Signa autem lenterie incurabilis, habentur per dysenteriam præcedentem. Signa lenterie ex paralyfi, habentur per insensibilitatem & frigiditatem. Signa lenterie ex uermibus habentur, quia dolor & mordicatio præcessit. Signa autem lenterie ex uiscoso phlegmate, sumuntur ab egestionibus uiscosis phlegmaticis. Lenteria uero ex defectu uirtutis contentiuæ dignoscitur per hæc, & per priuationem aliorū. Fluxus autem qui est cum sanie & sanguine, aut fit ex dubellati quæ erumpitur, & illud fit ex percussione, & prouenit aut subito plurimū eius, aut paulatim, aut propter uenam ruptam, aut propter debilitatem epatis à digestionē, aut propter excoiationē, & excoiatio fit in intestinis superioribus, aut inferiorib. aut in ano. Et excoiatio alia est mala, putrida, antiqua, & alia cū qua nō est putrefactio, & alia quæ fit à cholera, et

alia quæ fit à phlegmate salso, & alia quæ fit à cholera nigra, & de istis alia est in intestinis superioribus, et talia in inferioribus. Egestio sanguinis puri, fit propter solutionem continuitatis. Egestio uero sicut substantia carnis, causa est massa sanguinis coagulati & condensati. Et aliquando est fluxus uentris ex splene, aliquando à capite propter catarrhū descendentem à cerebro ad stomachum, & appellatur cerebellaris. Aut fit fluxus à stomacho cum non est digestus cibus, aut fit à toto corpore, et quandoque ad bonum, quandoque ad malum. Et aliquando dysenteria est epatica, aliquando ab intestinis cum rasione & dolore. Et aliquando fit propter mesentericas, propter malam dispositionem ipsarum. Et aliquando egestionis sunt chilosæ, & causa est debilitas attractiue, quæ est in epate, aut oppilatio uel apostema quæ sunt in sima epatis, uel in mesentericis, unde non potest chylus penetrare ad epar ut fluat chymus. Cause uero aquosæ egestionis uel ablutinæ uel lauatiue, est debilitas digestiue uel retentiue. Causa uero cholerica egestionis, est multa cholera cum forti expulsiua. Causa uero uirulentæ egestionis, est fortis adustio humorum & corruptio, & quandoque ruptura apostematis, & iste fluxus aliquando est periodicus. Egestio uero nigra uel,
grossa,

grossa, uel subtilis est propter rupturam apostema-
tis uenecosi, aut corrosiones, uel ulcera, aut san-
guinis adustionem circa epar uel in uasis. Ege-
ssio melancholica est à splene, quando uidelicet op-
pilatio aperitur. Medicinæ simplices quæ ualent
contra fluxum uentris. Primo, coagulum leporis
uel hœdi sumatur drachma 1. cum uncia 1. aquæ
plantaginis tepidæ. Secundo, theriaca recens pro-
pter opium, quæ si non recens reperiatur, sumatur
de ipsa drach. 1. opij gran. 5. & misceatur cum a-
qua plantaginis tepida, uel uino grosso de torcu-
lari. Tercio sunt lentes excorticate, quia cum
corticibus sunt laxatiuæ & fortissime bullitæ, &
postea in patella assatæ cum pinguedine mutonis,
& ministrare cum pauco aceto. Quarto, est san-
guis mutonis fortiter decoctus sine sale & pingue-
dine, cum brodio mutonis. Quinto, est sanguis
turturis antiquæ datus in potu cum uino grosso de
torculari, & non coquatur sanguis. Sexto, est se-
men nasturcij integrum assatum in sartagine, mini-
stratum cum lacte butyroso, in quo ferrum uel la-
pilli sint extincti. Item magna uentosa si pati-
ens eam tolerare potest sine scarificatione, super
umbilico. Item aliqui faciunt suffumigationes ab
extra cum sella perforata, & fumus recipiatur per

anum cum aceto fortissimo, in quo projiciatur pruna ignea, uel lateres antiqui igniti. Item electuariū ad idem: Recip. Corticum citri cum saccharo conditorum minutim incisorum, carnum citoniorum conditorum, conseruæ rosarum antiquæ ana ℥. s. cōseruæ buglossæ antiquæ ℥. 3. interioris cinnamomi electi, florum chamæleō ana. ℥. 1. s. coralli albi et rub. fortissime abluti cum aquis exiccatiuis ana. ℥. 2. sanguinis dracon. ℥. 2. s. santali albi & rub. coriandri preparati, acatiæ, hypocistidos ana ℥. 1. sachari libra. s. aquæ buglossæ, succi citoniorum ana. unc. 2. fiat electuariū per bolos. Item potus aquæ prunellorum, & sorba & mēspila comesta ante prandium mirabiliter astringūt. Item in tenesmonē, quando patiens surgit de sella lauando pudibunda cum aqua frigida, & postea bombacem superponendo in eo quod sequitur: Recipe olei rosati antiqui unciā 1. uitelli ouorum fortiter conquassatorum duorum, opij puluerizati drach. 1. misce & tepesciāt, et hoc facto inungatur bombix bene carminata, quæ ponatur intra pudibunda quantum potest. Contra dysenteriam quæ sequuntur fiant. Clystere primo potest fieri tale: Recip. Aquæ decoctionis hordei torrefacti, quod sufficit pro decoctione herbarum infrascriptarum, foliorum plantaginis. M. 4. corrigiōe

giola seu centinodia M. 2. & uitellum oui numero.
 1. olei ros. unc. 3. gummi arabici drach. s. pinguedi-
 nis hirci unc. 1. & fiat decoctio, cuius colaturæ: Re-
 cipe unc. 15. reliquas uero medicinas adde, misce et
 fiat clystere. Istud clystere sibi imponat tepidum,
 stomacho ieiuno saltem semel in die. Iulep potabi-
 le delitiosum in dysenteria: Recipe uini granato-
 rum unc. 6. granorum ribes unc. 2. sumach unc. s.
 thamarindorum drach. 3. margaritarum drach. 2.
 syruporum de acetositate citri unc. 7. rosarum 3.
 6. aquarum plantaginis partes 2. acetosæ partem.
 1. aquæ cisternæ chalibeatæ partes 3. de his trib. si-
 mul quod sufficit ad omnium supradictorum deco-
 ctionem, & fiat iulep ut decet secundum artē. Puluis
 ad idē: Recip. Coriandrorū preparatorū 3. s. sem.
 plantaginis 3. 2. corallorū rub. sem. acetosæ ana. 3.
 1. puluerizētur subtiliter, deinde misce et aliquādo
 capiat cū crusta panis assata in principio prādiij &
 coenæ, et post comedat bolos tres citonyj optimē de-
 cocti, bibat aquā cisternæ et chalibeatam, & ipsam
 aquā aliquādo bibat mixtā cum tantundē uini nigri
 nō multum uinosi. Solutiuū facile uentrē stipticum
 relinquēs: Recip. Micletæ 3. s. rheubar. torrefactū
 secundū canones 3. 1. aquarū plātaginis partes 2. ace-
 tosæ partē. 1. de his aquis simul q. sufficit fiat potio

Ad 4 ut

ut decet secundum artem. Istud assumat in aurora,
 & postea dormiat per duas horas, & postea stet ie-
 iunus horis quatuor, & nonumat lauatium ali-
 quod. Potest etiam dari aliud remedium secundum
 tamen discretionē medici, ut: Recip. Absinthij uiri-
 dis. M. i. s. menthæ uiridis. M. s. mastiches ꝯ. s. ga-
 riophilorum ꝯ. i. macis ꝯ. 2. calami aromatici ꝯ. i.
 rosarum, florum labruscæ ana. M. i. sumach, myrti-
 li simul bulliant in uino nigro & aqua fluuiali mun-
 da & clara, quod sufficit pro somentatione usq; ad
 consumptionem quartæ partis ipsius liquoris, dein
 de reliqua puluerizentur grosso modo, ultimo ipsa
 puluerizata dictæ decoctioni addantur. Digesti-
 uum humorum aqueorum, & cholæræ simplicis, &
 adustæ, & phlegmatis falsi, fluxumq; intercipientis,
 aut aliquo modo sistens: Recip. aquarum rosarum ꝯ.
 12. acetosæ ꝯ. 6. sumach ꝯ. s. mastiches ꝯ. i. spodij
 ꝯ. s. sumach, spodium & mastix contendantur gros-
 so modo, deinde simul bulliant in ipsis aquis ad len-
 tum ignem usq; ad cōsumptionem quartæ partis ip-
 sarum aquarum, & usui reserua. Syrupus contra
 dysenteriam in gracilibus intestinis, et peruenit ad
 exeuntia epatica, & ad singultum prauum: Recip.
 Passularū ꝯ. 2. liquiritiæ unc. i. s. santalorum rub.
 absinthij, radicū fœniculi, petroselini, seminis endi-
 uie,

nia, berberis, cinnamomi ana. unc. 1, rosarum, sem.
 anisi, squinati ana. 3. 2. spica 3. 1. rheumbarbari 3.
 s. sachari 3. 7. aquæ endiuie 3. 3. fiat syrupus do-
 sis unc. 1. s. in mane. Iulep ad fluxum uentris: Reci-
 pe aquæ endiuie, aquæ lupuli ana. 3. 6. ponatur in
 infusione cinnamomi drach. 2. sachari 3. 5. fiat iu-
 lep. Ad dysenteriam pueri lactentis cum febre. Re-
 cipe aquæ arnoglossæ 3. 8. passularum torrefacta-
 rum 3. s. seminis ros. 3. s. sachari taberzet unc. 6. fi-
 at iulep. Ad idem in initio: Recipe olei omphacini,
 olei de citonijs, olei mastichini ana. unc. s. inūgatur
 stomachus. Clystere in excoriatione intestini recti
 quando esset ibi tenesmon: Recip. Thuris albi, san-
 guinis draconis, terræ sigillatæ, boli armeni, ana. 3.
 1. croci 3. s. accipiatur ex istis pulueribus 3. 2. &
 cum cyatho succi arnoglossæ & pauca aqua hor-
 dei, uel cum uno cyatho plantaginis fiat clystere bo-
 num & expertum. Contra uermes & exitum ani:
 Recip. Succu absinthij quod sufficit ad infusionem in
 frascriptam, micæ panis in canone infrascripto, a-
 loës epatici drach. 1. gentianæ drach. s. nigellæ 3.
 2. mastiches drach. s. lupinorum drach. 1. myrrhæ
 3. s. coriandrorum præparatorum 3. 2. corallorū
 rubeorum 3. s. fellis tauri aut bouis 3. 2. puluerizā-
 da puluerizentur seorsum & difformiter ut decet

A4 5

secunda

secundum canones, deinde in dictum succum absinthij infundantur, & ex dicto succo imbibatur mica panis grossitiei unius digiti & figuræ scutalis siue in modum scuti, postea ipsa mica panis taliter imbibita aspergatur ex dicta mixtura pulueris in felle tauri aut bouis, ultimo mica taliter imbibita & aspersa suauiter in uelo serico subtili & raro, & c.

Clystere cōtra uermes: Recip. Lactis caprini ℥. 12. mellis ℥. s. Vnctio: Recip. Oleorum mastiches unc. s. absinthij, amygdalarū amararum ana. unc. 1. pulueris aloës, absinthij, gentianæ ana. ℥. s. nigellæ 3. 2. seminis portulacæ, coriandrorum, corallorū rubeorum ana. ℥. s. fellis tauri 3. 1. baurach 3. s. ceræ quod sufficit pro unguento, puluerizanda puluerizentur, deinde omnia simul misce & fiat unguentū. Pilule solutiue uermiū et humorū ipso ū: Recip. Aloës 3. 2. myrrhæ 3. 1. s. croci 3. s. rheūbarbari 3. 2. corticum radicum capparorum, baurach, thymi ana 3. 1. puluerizentur subtiliter, deinde omnia simul misce, & cum syrupo de absinthio quod sufficit ad incorporandū, reformatur pilule 8. pro. 3. Potus digestiuus: Recip. Agrimonie M. 2. radicis graminis. M. 1. siliginis unc. s. coriandrorum præparatorum 3. 2. sem. portulacæ 3. 1. misce, deinde omnia bulliant in sufficienti aqua ad consumptionē

tertiæ

tertiæ partis, deinde exprimantur & colaturâ usui
reserua. Pulvis: Recip. Aloës, absinthij, ana 3. 1. bau
rach. 3. 1. gentianæ 3. s. calamenti, mastiches, nigel
læ, menthæ, abrotani ana. 3. 2. coriandrorum præ
paratorum, corallorum rub. ana. 3. 1. fellis tauri 3.
2. succi cepæ unc. s. puluerizanda puluerizētur, de
inde omnia simul misce, & semel aut bis in die inun
gatur stomachus ex oleo de absinthio calido, postea
aspergatur ex isto puluere supra stomachum 3. s.
Confectio: Recip. Diptami albi. 3. 1. nigellæ 3. 1. se
minis portulacæ 3. 2. coriādrorū præparatorū 3.
2. cornu cerui usti 3. 1. sachari albi lib. 1. misce, &
cum aquis agrimonie, gentianæ ana. quod sufficit fi
at confectio solida in forma rotunda. Electuarium:
Recip. Theriacæ antiquæ 3. s. Emplastrum: Recipe
radicis enulæ unc. 1. foliorū uiridiū absinthij, rutæ,
menthæ, abrotani ana. M. 1. nucleorū persicorū, lu
pinorū ana. 3. s. baurach 3. 1. thymi, nigellæ, gētia
næ, aloës ana. 3. 1. s. fellis tauri 3. 3. cepæ 3. 1. coriā
drorū præparatorū, sumach, sem. portulacæ ana.
3. 2. olei absinthij, olei amygdalarū amararū ana.
quod sufficit. Radices, herbæ, nuclei & cepæ contū
dantur, & deinde sufficienter bulliant. Vltimo om
nia cum reliquis incorporentur, & fiat emplastrū
ad lentum ignem.

De

De hemorrhoidibus & egritudinibus ani. Cap. VIII.

Iuxta traditionem Græcorum & Latinorum.



Lui exitus anus dicitur ubi muscoli sunt, quibus astringitur cum opus est, aut laxatur, inibi uenarum ora sunt tanquàm ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe tetrū sanguinem fundūt, sicut ē naribus, αἱμορροΐδας Græci uocant, eo profluuio purgationis uice utūtur, nec ualde imbecilliores ob id fiunt, ideo importunē quidam curati, cum sanguinis exitum non haberent, inclinata in præcordia ac uiscera, diu illa materia, subitis ac grauissimis morbis correpti sunt, in eadem parte, quæ corona est & sedes dicta, condilomata innascūtur, tubercula quædam quæ nunc dura, nūc mollia, quæ ex inflammatione oriri solent, uerum si uetera iam induruerint, medicamentis causticis interdum aduruntur. Anus sicut et uulua procidit, quam sedis procidentiam uocamus uel sedem conuersam, quam stipticis retro agimus, ulcera eidem & fungi similiaq; innascūtur, quæ aduri solēt. Mariscæ item & rhagades anum infestant cute circumfissa. Hos morbos (ait Alexander Benedictus) lasciuia luxuriæ procacitas & æstuans libido facit, non sine naturæ & maiestatis diuinæ iniuria, & utriusq; lege calcata, uitios

ta, uitiorum inuentrix libido, quæ neglecta natura,
diuerticula quæritat, hoc est genus humanum per-
dere. Anus multa te diſq; plena mala recipit, nec in-
ter ſe multum abhorrentes curationes habet. In-
terq; uitium eſt, cum ora uenarum tanquàm ex ca-
pitulis quibuſdam ſurgentia uidentur, quæ ſæpe
ſanguinem fundunt, αἱμορροΐδα Græci uocant,
atq; in quibuſdam parum tutè ſupprimitur, qui ſan-
guinis profluuiſ imbecilliores non fiunt. Habent e-
nim purgationem hanc non morbum, ideoq; curati
quidem cum ſanguinis exitum non haberent, incli-
nata in præcordia ac uiſcera materia, ſubitis et gra-
uiſſimis morbis correpti ſunt, ſi cui ergo nocet ſuc-
currendum. Hæmorrhoidum nimirum ſignificatio
nobis indicatur ex operatione, quæ ex deiectione,
euacuationeq; fuit, ut multis utendum ſit clyſteri-
bus, ſimul inteſtini ſuperflua deiicientes, ſimulq; a-
num irritantes, conuerſionem ad exeundum ex ano
expeditiorem faciamus. Aegrotum itaq; ſupinum
ad apertam lucem ſiſtemus. Sic aſtrictione ute-
mur, ſilum multipliciter obuolutum adhibentes la-
queo, hæmorrhoida aſtringemus, unum modo erum-
pendi locum ſanguini ſuperfluo relinquentes, quod
ita iubeat Hippocrates, poſt aſtrictionem oleo &
uinculo uſi eo loco commodo, olea tepenti mellicra
toq;

toq; uentrem curabimus, postea in frigidantibus et
croci cataplasmate utemur. Et post hæmorrhoidū
lapsū filum tollemus. Leonidas autem filo non
utitur, sed uua agresti cohibens aliquandiu, hæ-
morrhoidas excisorio scalpro excipiat, post manus
injectionem, quam ἡδῆγῆς uocant Græci, man-
na, & amylo, & chalcitide, uel adusta spōgia cum
pice curat. Utendum alij aiunt pastillo ad absolutā
adustionem. Condyloma tuberculum est, quod ex
quadam inflammatione nasci solet, in anoq; intume-
scere, cum pluribus locis cutis exciditur rhagada,
Græci uocant cōdyloma. Igitur inflammatione, uel
rhagade antecedente est. Primum igitur exochia
nuncupatur, cum autem callosum factum est, con-
dyloma. Expedit ergo ut illa, ita hæc, mydio reten-
ta, excisorio scalpro excindere, crustaq; enata cura-
re, rhagadas porro stercore maxime ob duratas, &
circa cicatricis ortum, quod calore euadentes diuti-
us durent, recentes faciendæ sunt unguibus, uel scal-
pro diffecando, ac statim in cicatricem deducamus.
Est autem aliud leuius omnibus proximis, quod te-
nesmon Græci uocant, id neq; acutis, neq; lōgis mor-
bis annumerari debet, cum & facile tollatur, neq;
unquā (ut Celsus placet) iugulet. In hoc æque atq;

in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æque dolor ubi aliquid excernitur, descendūt autem pituitæ mucisq; similia, interdum etiam leuiter subcruenta. Sed his interponuntur nonnunquā ex cibo quoq; recte coacta. Desiderare oportet in aqua calida, sæpiusq; ipsum manu nutrire. Cui plura medicamenta idonea sunt, butyrū cum rosa, acatia ex aceto liquata. Emplastrum id quod $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\phi\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha\kappa\omicron\upsilon$ Græci uocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatū & ita appositū, eademq; ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbene decoctæ, ut interiores partes foucantur, alternis uero diebus aqua, alternis leue & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet è gelida & frigida, propior ratio uictus talis qualem in tormine supra præcepimus.

Pœnos & Arabes nunc
audiamus.

Hæmorrhoids est apertio oris illius uenæ quæ est in ano, unde sanguis effluit, sicut uidemus in multis sanis temporibus interpolatis. Causa huius, humores sunt grossi & uiscoli

uiscosi in intestinis, quos uirtus expulsiua expellit
& à natibus eijcit, sicq; fit hæmorrhoids apostema
& uulnera. Aliquando hæmorrhoids est propter ac-
cutos & pungitiuos humores de potione acuta, &
forti, malos humores ad nates trahenti, & has pas-
siones efficienti. Hæmorrhoides semper sequuntur
ista accidentia: mutatio coloris in citrinitatem, &
maximi si inueterascant, angustia in præcordijs, do-
lor dorsi, grauitas in coxis & cruribus, inflatio in
lateribus. Quæ si sint ex grossis humoribus & ui-
scosis, nimiam gurgulationem & inflationem in uē-
tre habent. Si ex acutis humoribus sit pruritus in
natibus, & dolor, et teneismus. Putat infirmus se de-
bere egerere cum nihil habeat. Vniuersaliter ad me-
dicandum hæc infirmitas dura est. Passiones ani si-
cut hæmorrhoids, apostema, uulnera & fissura no-
cent, & dolorem faciunt, nates infirmum expreme-
re cogentes, quasi ex quadam suauitate, unde exit
anus, aliquando quoq; egreditur ex mollitie lacerti
uoluntarij. Ideoq; stercus infirmi sine uolūtate exit.
Si ex depressione nascuntur, dolorem nimium faci-
unt. Auicenna: Scias quod ægritudines ani sunt diffi-
ciles ad sanandum, propter ea quæ aggregantur in
eo, quoniam est callis, & quia est diuersum pene-
trans ab inferiori ad superius, & quia est uehemē-
tis sene

tis sensus, & quia est positus in inferiori. Hemorrhoides diuiduntur in uerrucales & sunt deteriores alijs, & in uueas & morales, & in exterius natas, & profundas & sunt deteriores, & proprie ille quæ tendunt ad partem uirgæ, quandoque enim stringunt urinam cum apostemate. Et plurimū quidem generantur hemorrhoides, ex melancholia et sanguine melancholico, & parum ex phlegmate et sunt quasi ipsæ sint uesicæ uentrium piscium. Et nō est possibile ut accidant hemorrhoides, nisi aperiātur orificia uenarum in ano. Et non oportet quod ex hemorrhoidibus apertis currentibus sanguis currens retineatur, donec perueniat ad debilitatē et mollificationem genuum, & comprehensionem syncopis, & uideatur sanguis non niger. Et plurimis quidem habentibus hemorrhoidas adest color proprius eis, & est citrinitas declinans ad uiriditatem. Oportet ut in inceptione eius rectificetur corpus, & euacuetur sanguis malus, ita ut phlebotometur saphena. Et uentosatio eius quod est inter utrasque spatulas confert ad eas, & ad humores melancholicos. Et earum curatio perducit quandoq; ad fistulas et ad rhagadias. Scias quod in sanguine quod currit ab hemorrhoidibus, & ex ano, est securitas ab herpete, estiomeno, mania, melancholia, epilepsia,

Bb

erysia

erysipila, milio, cancro, excoriatio, scabie, glabie, id est tineas, lepra, pleuresi, peripneumonia et ceteris huiusmodi. Et impendatur studium in lenificatione naturae, ut non noceat duricies fecis ano, et magnificetur labor. Et quando retinetur sanguis ex eis qui consuetus est manare, timetur aliqua harum ægitudinum, et hydropisis et phthisis. Rasis: De ægitudinibus ani sunt hæmorrhoides et fistulæ, et inflatio uenarum, et mollificatio ani, et rhagadiæ, et uermes parui, et exitus ani cum sit egestio. De hæmorrhoidibus aliæ sunt eminentes, aliæ profundæ. De eminentibus quedam sunt uerruæ duræ, et quedam sunt molles, crudum emittentes humorem et nominantur morales, et quedam sunt humide sanguineæ. Confectio medicaminis eradicatis hæmorrhoidas mirabiliter: Recip. Hyoscyami succi nigri aur. 2. succi hyoscyami albi aur. 4. aluminis iameni, calcadis, ana. aur. 2. affius aur. 1. cerusæ tantundem, teratur et misceatur cum cera dissoluta cum oleo rossi. et liniatur super pannum, et ponatur desuper.

Quid Neoterici de hoc morbo dicant.



Hæmorrhoidis nomen est æquiucum ad quinque ramos uenæ chilis, qui terminantur in ano, et ad passionem illorum ramos

run

rum siue uenarum, ueruntamen sepe aestimat aliquis habere hemorrhoidas propter sanguinis exitum ab ano & non habent, sed habet ulcera in recto intestino interius uel exterius, uel in illis uenis quæ sunt supra ipsum. Hemorrhoidarum species tres sunt, quædam sunt similes uerrucis oblongis, unde ab Auicenna dicuntur uerrucæ, & istæ omnibus alijs deteriores sunt, & istæ aliquando sunt apibus similes & longæ. Aliæ sunt similes uuis, et dicuntur uuæ, et sunt cæteris leuiores. Aliæ sunt moris similes, & dicuntur morales. Item profundæ deteriores sunt. Item quædam sunt anteriores ex parte testiculorū, & sunt ualde malæ, & quædam posteriores, & sunt minus malæ. Et fiunt hemorrhoidæ quandoq; ui naturæ, quandoq; ui sympthomatis. Si autem ui naturæ secundum periodos ut de mense in mensem, quædoq; semel in mense, quædoq; semel in anno, & maxime in autūno, quandoq; sua grauitate descendit ad illas uenas inferius, quæ si nō aperiuntur dolor fit magnus, & si aperiuntur quod superfluum est sine dolore egreditur. Mollificatio siue paralysis ani, aut eius egressus inuoluntarius, fit quandoq; propter casus supra dorsum, et propter percussione, unde lacerti rūpūtur uel desiccātur, quædoq; uero ex nimia humiditate relaxate, fit etiam ex retentio-

tionem superfluitatū, unde longā non paralyticatur,
& fit insensibilis, fit etiam propter nimiam reten-
tionem urinæ, quandoq; fit ex nimia compressione
& nimio conatu & appetitu egerendi, unde pro-
pter nimiam compressionē exit anus. Potest etiā fieri
propter apostema, unde anus expellitur ad exteriora,
uel ex continua scissione super lapides & super
sedes frigidas ualde, undecunq; contingat passio est
multum dolorosa. Contra dolorē hæmorrhoidarū
cura, est suaue prouocatiuū et aperitiuū illarum, ut:
Recip. Foliorum ficus et cum dorso eius fricet eas,
& hoc quando uniuersaliter uolumus eas aperire
ut sanguinem educāt. Ista utatur fricatione pluries
cum hæmorrhoidæ tument & dolent, & sanguinē
querit educere, uerum hanc præcedunt euacuatio-
nes debite ad hæmorrhoidas. Vnguentum mitiga-
tiuū doloris earum si cum eis est ardor: Recip. O-
lei rosati, olei uiolarum, albuminis oui cum uitello,
ceræ albæ fiat unguentum molle, inūgatur petia in
dicto unguento, deinde ducatur circa candelam &
imponatur, & ultimo extrahat petia remanente. Et
si non sentit ardorem tamen dolet, addatur modicū
croci. Si est sine ardore, apponatur adeps anatis cū
substantia corpulenta, accepto frusto longo aliqua-
liter filo alligato, & sic integrū ano apponatur do-
lore

lore infestante, & propriè si est sine dolore. Cōtra
exuberantem fluxum hæmorrhoidarum: Recip. My
robalanos chebulos, numero. 2. pulpas istorum co
medat in aurora quatuor diebus continuis, in quib.
exuberantem fluxum patitur, & post stet ieiunus
horis quatuor, dormiat de super per horam. Aliud
medicamen efficacius: Recipe pilularum de bdellio
& à. 5. usq; ad. 7. sumat in aurora cum modico uini
nigri. Quidam patiebatur fluxū dictum, unde erat
pallidus & dispositus ad hydropem, incepit sume
re omni mane unum cyathū aquæ distillationis che
lidoniæ, in fritellis cum uitello oui & liberatus est.
Ad dolorem earū: Recip. Olei rosati, uiol. ana. ʒ. i.
cerussæ ʒ. s. camphoræ ʒ. i. s. fiat unguentum. Pul
uis consolidatiuus hæmorrhoidarum: Recip. Aloës,
thuris ana. puluerizētur & accipiatur tela aranea
molendini & albumen oui conquassati, madesiat,
deinde pulvere aspergatur suprascripto orificio hæ
morrhoidarum à quo fluit sanguis, supponatur. De
exitu ani. Confert eis sessio in aquis stipticis & in
ungantur cum oleo rosarum, & puluerizetur de
super medicamen stipticum, & infrigidentur. Me
dicaminis autem stiptici cōfectio: Recip. Charabæ,
thus, balaustias, gallas, antimonium, acatiam, & alu
men cribellata & simul puluerizētur & ano asper

Bb 3 gantur

gantur post inunctionem olei rosati, & quandoq;
additur in ipso cerusa secundum mensuram unius
illorum.

Finis libri quarti.

SIMPHO-

RIANI CHAMPERII, DE

morbis particularibus, Liber V.

De ægritudinibus renum & uesicæ.

Cap. I.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



RENES membranulis integuntur,
quibus sentiunt dum calculo labo-
rāt, quia multi renes laborare ui-
dentur. Duplices constituti sunt,
ut æquale corporis libramētū,
Galeno autore, animalibus præstarent, ex supera-
bundanti calore incontinentia & urinæ stillicidia
sequuntur. In meatibusq; arenæ materia, ac calculi
generantur. Vesica uero nervosa est, aliter uiris at-
que fœminis posita, nam in illis iuxta rectum inte-
stinum potius in sinistram partem inclinata, in his
supra ora genitalia constituta est, superq; elapsa ab
ipsa uulua sustinetur. Duo item meatus ab aorta
uali-

uvalidi & perpetui ad uesicam procedunt, nullusq; à uena maiori huc tendit. Qui uero de cauo renum ueniunt, cum uena maiore continuatam nō habent materiam, uesicæ uero ceruix carnosæ est, musculis referta, quibus humor continetur atq; laxatur, cum opus est incisa sola coalescit, reliqua pars coire nō potest, quod ediuerso contigisse refert Aristoteles. In masculis urinæ uia longiores atque compressiores, ad imum usque ad colem descendunt. In foemineo uero sexu breuiores plenioresq; communiq; demum uia, ad uulvæ ceruicem se ostendunt, quæ propter mulieres calculis minus afficiuntur in uesica, præter calculos setarum ueluti quædam capillamenta non sine diro cruciatu innascuntur, ex mucosa equidem materia. Quibus modis extrahi lapides conueniat, ne si chirurgus loci errore lethali ter ægrotis uulnus inferat cultello, locus apeririendus indicandusq; modus est. Aliquibus quædam in uesica concrescunt, quæ nihilo à conchilijs specie differunt. Sed iam ad renum ægritudines transeamus. Commune est colicorum, & in renibus calculos habentium à principio cohiberi uentrem, & multum dolere, & appetitum amoueri suum, colicorum est in his extendi, nephreticorū aut minus, colicorū potius in dextris ilibus dolorem habere,

Et ad stomachum usq; penetrare, Et iecur et lienē,
 Et stercus prorsus inhiberi, ut neq; in flatū euadat.
 Cum uero necessario excernatur inflatū sit, Et par
 stercori bubulo, Et quādoq; etiā uitiosum phlegma
 excernatur, Et urinae plus ac ipsa editur pituitosa.
 Dolentib. aut ex renibus, in ipsis dolor hæret renib.
 quasi perforantis paxilli uicem gerens, è regione q;
 testiculis dolet, rariuscule educit excremētum. Cly
 steribus autem omnino aluus inflata stercus edit bi
 liosum. Urina uero pauca Et harenosa editur, mea
 tusq; urinae obstruitur, hæc sunt in renibus calculo
 rū signa, in ætate pfecta genitorū, at in uestica calcu
 lorū concretio pueris potius esse consuevit. Horum
 autem signa sunt: cruda urina, ac subalbicans, conti
 nue cum harenosa hypostasi. Intendunturq; pudi
 bunda, strangulaturq; urina. Materialis igitur cau
 sa ad calculos gignēdos, est crassus ac terrestris hu
 mor. Effectrix uero flagrans renum calor, aut uesti
 cæ. Verum in renibus quæ calculos atterant, secētq;
 utendum medicaminibus, ne tamen admodum cale
 faciant. Sunt autem huiusmodi: asparagi radices et
 bati, utrunque exustum, Et agrestis radix, Et adi
 anthum Et bdelliū, lauriq; radicis cortex, et althæ
 semen, Et ciceris nigri ius, spongiarumq; lapilli, Et
 scilliticum acetum, Et phu, Et minij Et carpesia Et
 saxiphrae

saxiphragia. Sion etiam mansum & potum, scolymiq; radix & erysimū, & prionites, lauacrisq; iugibus utendum, & post lauacrū, eorū quæ dicta sunt, potent aliquid. Irrigationibus autem utendū & cataplasmatibus, & calefactionibus diminuentibus & placabilibus ex colicis assumendo. Renum purgantia sunt cuncta secantia, arnoglossi radix, et folia et fructus arida, dissoluta, pota. Asparagus, myacintinus, pēoniæ radix, cicerorum nigrorū coctio, amygdala præsertim amara, eryngij radices coctio, damasonium, adianthum, apij semen, fœniculi, dauci, petroselinī, ameos, anisi, leuistici, azari coctio, rhu, phu, iunci flos, seselis, acori radix, agrestis uitis lachryma, & cortex. Sanguis hircinus aridus. Opem autem ferunt hæc pota, postquā pubescunt inflā mari. Impedit nanq; durefcere calculosq; gigni. Vrinam, seu lotium libet appellare, uesica agit, acori coctio pota, azari, amaracinum oleū, amygdala amara cū uino dulci pota. Altheæ radices coctio, hæmatitis lapis solutus cum uino potus, gallinarū ster cus aridum. Anchusæ coctio, abrotani, anisi semen, sanguis hircinus aridus, atraphaxis semen, arthemisiæ coctio, aristolochiæ coctio, brathys solutissimi 3. 1. cum hydromelle, non febricitantibus autem cum uino, balsami fructus, glandis coctio, bdellium,

bati semē, balauſtia, bryonia radix, glycyrrhize, ſucus glichon, glyciſides fructus, dictānum, dracontium, elates coctio, erythrodani coctio. Hæc non permittunt gigni in ueſica calculos, & craſſitudines ſeculentias ſubſtantiasq; tales amouent, nec non impetiginosas & ulcerosas affectiones medicantur. Cum plena urina ſuerit ueſica, nec poſſit prouocari exprimiq; urina, apponimus genitalis membri glandi hæc: nitrum aqua dilutum, ſalſuginem, fel ciclamini. Calculos tum renum, tum ueſicæ purgantia, quæ eos quoq; confringunt: Cardamomum cum lauri radicis cortice potum, cyperum, amygdalinum oleum, paliuri ſemen, bdelliū, ſceniculi radix, thus, oxy myrſinæ folia, fructus ceraſorum, præcipue nucleï poti cum uino albo, pruna, apri ueſica arida, liſtoſpermum, tecolithum, bethonica, amygdalas amara, lapathi radicis coctio, tribuli uiridis coctio, adianthi coctio, uitis lachryma, ſaxiphragia, lapides qui in ſpongijs, electrum. Componantur autem potiones hoc modo: Rutæ agreſtis, & maluæ agreſtis & apij radices coquito cum uino, & humorem exprimito aquamq; ammiſceto, datoq; cyathos. 2. Item baſſami fructus, calculi qui in ſpongijs, glichonis, aridæ maluæ agreſtis ſeminis æquas portiones ſecato, dato cum uino diluto cyathos duos, & areſactum

Etum sanguinem hircinum, cicadas arefactas absque
alis & pedibus ad excernendos calculos, plerunq;
sanguinis iuuat detractio.

Ex traditione Poenorum & Arabum.

Apostemata facta in renibus, sequitur do-
lor in locis uacuis, secundum hoc tamen
quod si apostema est in substantia renū
carnosa, sentitur cum eo grauitas in loco, & si apo-
stema est in panniculo continente eos, aut in conca-
uitate ipsorum, aut in uijs urinæ quæ procedunt ex
eis, tunc dolor est acutus, & sequitur illud quod in-
firmus non potest stare rectus, neq; ambulare. Et si
est ibi motus uoluntarius, aut non uoluntarius, sicut
sternutatio, aut alius ex illis quæ sunt eis similes tūc
clamat infirmus, & conqueritur et non fit ei facile
dormire super uentrem suum, imò plurimum quie-
tis eius est ut sint accubitata & quieta ut non sint
suspensa. Et propter id plurimum quietis eorū est
in resupinatione dorso suo. Et dolor qui accidit ex
apostemate renum, quandoq; extenditur usq; ad e-
par, & quandoq; tenditur usq; ad anchas & uesi-
cam & uirgam Et quando uesica apostematur, do-
let cum ea uirga annexa collo eius, & non forsitan
descen-

descensus huius doloris sentitur, & nocumentum
eius ad hunc locum semper neq; frequenter, imò in
tercissim, sparsim, & dolent cum ea etiam anchæ, et
infrigidantur extremitates membrorum & pro-
priè crurium & pedum. Urina autem in principio
fit subtilis, & aquosa & tingitur, & in fine rubet.
Et quando apostemata renum sunt uehementia &
uelocis lapideitatis, tunc ex eis sunt in quibus nō est
omnino curatio, sed firmanentur & prolongantur, et
liquefaciunt corpus, & extenuant ipsum. Et aposte-
mata ex quibus fiunt dolores in istis membris, nun-
quā fiunt ex sanguine qui resudat in eis. Et ulcera
quæ fiunt in mēbris urinæ, aut fiunt in renibus, aut
in uesica, aut in uijs urinæ, & sequuntur ex acciden-
tibus cōmunib. eis, ut currāt cum urina sanguis mul-
tus et sanies, et accidit, eis, difficultas urinæ, donec
prohibetur id quod currit, si autē abscindatur illud
quod currit, erit inter ista accidentia propriè diffe-
rentia in situ & operatione, et speciebus solutionis
uentris et uirtute. In situ quidē quoniam si ulcus est
in renibus, est sensus doloris posterius in anchis &
alcatin, & si ulcus est in uesica uersus duo emuncto-
ria, tunc dolor sentitur antierius uersus pectinē, &
si est in uijs urinæ tunc dolor est in medio. Et si dolo-
rē sequitur difficultas urinæ & distillatio eius, tūc
ulcera=

ulceratio est in uesica, aut in uis urinæ. Et si descen-
sus urinæ est secundū equalitatē absq; læsione & si-
ne difficultate, tunc ulcus est in renibus. Et si ulcus
in renib. est, egrediūtur cū urina laminæ et fila car-
nea, et urina est equalis in grossitudine. Et si ulcus
est in uesica, egrediuntur cum eo cortices similes pā-
niculis ex uesica cum urina foetida, & ulcera quæ
sunt in uesica sunt difficilis curationis, propter il-
lud quod currit ex superfluitate aquosa, salsa semp,
& illa quæ sunt in renib. sunt facilis curationis. Isa-
ac: Apostemata in renib. fiūt ex humoribus ad ipsos
descendentib. unde dolor in anchis sentitur, & ri-
gor cum febrib. Iaceat ergo infirmus super sinistrū
latus si doleat in dextro, & è cōuerso. Si quis suspen-
sos & graues sentit renes ex apostemate est, si ni-
miū grauatur, sanies ibi colligitur, & cito aperitur,
sanies & sanguis cum urina egrediūtur. Si aposte-
ma sit ex cholericis humoribus, nimia sitis & dolo-
res maximi sequuntur, urina rubea, febris acuta. Si
ex frigidis humoribus, paruus dolor est in renibus,
& febris lenis, & urina alba. Aliquando humores
calidi & acuti descendunt ad renes, & inuiscantur
in eis facientes uulnera ex acuminibus suis. Idem
faciunt humores ad uesicam descendentes, medici-
na eorum est equalis, & dieta similis, Et sanguinis
egres-

egressio cum urina quatuor modis fit, uel de apertione uenae epatis ruptae, uel de apertione epatis solum, uel de incisione uenarum inter renes & uescicam. Et in renibus generatur lapis, & in uesica pariter duobus modis, ut si coquantur humores grossi & uiscoli ex calore igneo in renibus, in calorem extra naturam exeuntem, uel si in renibus nascantur uulnera unde sanies efficiatur, neque purgetur, sed remanens in renibus coagulatur lapisque efficiatur. Plurimum iuuenibus lapides nascuntur in renibus, pueris in uesica, cuius collum in eis strictum est, prohibens materiam exire, unde lapis concreatur, & item uesica eorum calidior est. Maior causa lapidum in pueris est grossities urinae naturaliter grossae, & ex grossitie uiscosae, quia calor eorum naturalis bene digerit & excoquit. Res autem uiscosa coagulatur magis & conglutinatur. In mulieribus uero raro nascitur, quia materia unde lapis concreatur, non adunatur multis ex causis in mulieribus, quia collum uesicae earum curtum est, & foramina sunt larga, & non multum tortuosa sunt, & minus bibunt aquam quam pueri, lapis enim maxime nascitur, quia aqua diuersa & turbida bibitur, ex qua humores grossi & uiscoli ad concreandum lapidem coadunatur.

Acciden-

Accidentia eius sunt febris & angustia urinæ, dolor continuus, si in renibus & in anchis quasi punctura acus intolerabilis sentitur. Si in uestica sit, sentitur dolor in pectine, prurigo in uirga, ita ut puer eam scalpere cogatur & tenere in manibus, et semper uirga erigitur. Passionem diabeticam habet etiam renes ex defectu contentiue uirtutis, unde semper sitiunt infirmi, neque aqua possunt saturari, quam & quantam bibunt, similiter eam mingunt, sicut uidemus in canino appetitu, quicquid enim comeditur cum ferre nequeat mouetur natura, et eijcit foras, similiter cum contentiua in renibus deficiat non potest retineri, quam habet aquosa humiditas, necesse est ergo ad uesticam effluat. Renes enim cum humiditate exinaniantur et mouentur, et aquosa humiditas de uenis sibi attrahitur, sanguis in uenis desiccatur, humiditas ab epate cum appetitiua trahitur uirtute, et epar similiter fugit à stomacho, sicque pars à parte sibi sumit donec perueniatur ad os stomachi ubi inde generatur sitis, cum aqua biberit uenae exeuntes epar à stomacho sibi eam appetunt, et sic uicina à uicinis quousque peruenit ad renes, qui ex calore sui cito trahunt sibi, et ex deflectione sue contentiue expellunt eam ad uesticam, & inde exit cum urina, unde fit ut aqua nequeat

queat satiari, neq; cesset sitis. Et passio est etiam uesica in expellenda urina, antequam multa coadunetur quantitas, appellatur guttata urina, quod duobus fit modis, uel quia uesica qualitatem urinae non potuit pati, quae acuta & pungitiua, uel quia defecula sit ut grauetur antequam urina coadunetur, sed quae ex acumine qualitatis contingit urinae, subsequitur ardor nimius, punctura uesicae, quod duobus fit modis, uel de passione renum uel secundum crissim, in quam natura expellit materiam morbi, unde morbus fuerat & transit per renes & uesicam. Et quidam ignoranter lectos commingunt non sentientes, quod pueri plurimum patiuntur propter grauitatem somni, & multitudinem humiditatis, aliquando in maiori aetate contingit cum complexio sit humida, maxime senioribus, quia uesicae eorum molles sunt propter humiditatem corporum. Et urina aliquando impeditur exire de uesica uel renibus, sed in iuuenibus, plurimum de renibus, propter calorem complexionis suae, pueris uero de uesica ex inordinata dieta. Et hoc fit ut uult Rasis in libro diuisionum propter aegritudinem in emunctorijs, aut propter aegritudinem uirgae, & aegritudo aut est lapis in meatu uirgae, aut caro nata, aut oppilatio sanguinis aut saniei. Signa itaque eius quod fit ex emunctorijs,

torijs, sunt: grauias in dorso, & repletio uesicae ex urina, cuius cura est, sumere in potu medicinas quae lapidē frāgunt. Et signa eius quae sūt ex oppilatione meatus uirgæ, sunt repletio uesicae, et inflatio eius, tentio et chorda, grauitas quædā in pectine, & ancha cum dolore uehementi, et tentione superflua. Et fit aut propter lapidem obsessum, aut propter apostema, aut propter carnem natam, aut propter oppilationem sanguinis, aut saniei. Carnis autem ortæ signum est, quod fit secundum plurimum post ulcera accidentia in hoc meatu, & non prohibet totam urinam, sed modicum eius, & quandoq; est inceptio exitura similis uerrucæ in hoc meatu, quod ergo ex ea est in emūctorijs, curationem non habet. Oppilatio autem sanguinis & saniei, fit post mictum sanguinis & saniei. Apostematis autē in uesica signa sunt, febris ualde fortis caliditatis adustiua, & uehemētia doloris, & punctura in uesica. Et quandoq; fit difficultas urinæ ex lapide cadente in ore meatus non in meatu, & signum eius est, quod cum proieceris infirmum super dorsum suum, & leuaueris pedes ad superiora, & uehementer commoueris egredietur urina, & istud sine cessatione fiat, ita donec egrediatur lapis. Et quandoq; fit difficultas urinæ ex mollificatione la-

Cc certi

certi uesicæ, cuius signum est, quod habēs eam mingit cum facilitate, quando super uesicam fit compressio, & eius cura est inunctio eius cum oleo nardino, costino, & castorio. Et quandoq; fit difficultas urinæ post uehementem retentionem urinæ, & signum est quod si fiat compressio super uesicam, egreditur urina tunc. Et confert pluribus modis difficultatis urinæ introitus in aquam calidam, in qua decocta sunt folia caulium humida, & cartanum, fœnugræcum, & rubea tinctorum, & emplastra pecten & alchatin cum eis, & conferunt quidem medicinæ prouocantes cum uesica est uacua, & nocent uehementer cum est plena.

Ex traditione autorum recentium,

Renes parua sunt corpora, rotunda, rubea, plurima pinguedine inuoluta, in fine spinæ circa caudam, & super lumbos posita. In renibus adeò paruis accidit mala complexio, & statim extendit se ad lumbos. Sunt enim lumbi carnes illæ maculosæ, quæ spinæ adiacent à dextris & à sinistris ualde tenerrimæ & passibiles. Practici large sumunt renes pro continente, id est, pro lumbis et renibus contentis. Renum autem passio-

passiones triplicis sunt generis, sed species diuersificantur, quia propter hoc quod fit morbus in renibus ex mala complexione cum materia, uel sine materia, & solutio continuitatis, fit in eis etiam officialis morbus serè, & secundum omnes sui species. Oppilantur enim renes ex lapide uel humiditate. Magnificantur autem aliquando, uel constringuntur, uel paruificantur. In positione etiam possunt diuersificari, potest enim in renibus fieri corrosio, ulcus, uulnus, collectio saniei, scabies, & nimia amplitudo in uis, uel constrictio, uel uirtutis corruptio, ut in dyabete, unde secundum hoc diuersa capita à Rasi, Auicenna, Isaac, & à Serapione constituuntur. Apostema uero in renibus fortorem efficit dolorem, quia operatur solutionem continuitatis, & malam complexionem, quæ sunt duæ causæ doloris. Apostema etiam uesicæ fortorem dolorem efficit circa renes, et pectinem, & circa anchas cum difficultate urinæ. In utroq; autem apostemate adest frigiditas extremitatum, & propriè crurium & pedum, urina in principio subtilis est & aquosa, sed in fine tingitur et rubet, quia nocumentum extēditur ad epa in statu apostematis, unde corrumpitur digestio in epate. Vlcera renum et corrosiões eorū frequēter post apostemata malè

Cc 2 curata

curata fiunt, uel quoniā ex sanie corrosiua sine apostemate, uel ex humoribus acutis, cholericis ad eos uenientibus. In sanie uero renum non est multus foetor, sicut in sanie uesicae, & propterea dolor in uesica acutior est magis descendens ad inferiora, sicut circa pectinem & peritonœum. Significatio autem talium ulcerum renum, est dolor cum grauitate, & mictus sanguinis saniosi cum forti commixtione, quia ab ulceribus uesicae exit sanguis & sanies non fortiter cōmixta, sed quasi separata. Exitus autem sanguinis aliquando fit à sima, & per intestina & egestionem, & aliquando fit cum urina, nec differunt nisi loco, quia si causae sint ex parte si me, tunc exit sanguis cum egestionem, si autem ex parte gibbi, cum urina. Renes etiam & uesica communicāt in lapidis generatione, non autem in istis solis sed in pulmone, & in qualibet corporis concavitate generatur lapis, sicut dicit Galenus in de interioribus, quia fatetur se aliquem uidisse à pulmone lapidem eiicientem, uel excreantem. Generatur autem lapis ex duobus, scilicet, ex materia patiente, & causa agente cooperante dispositione loci. Materia autem est uiscosa similis uel phlegmati, uel sanguini, saniosa, grossa, uel uiscosa phlegmatibus melancholicis, uel sanguinis saniosi, quod est raro
secundum

Secundū Auicennā: Angustia meatuū ad hoc etiam operatur. Alia est passio renū, quæ tria habet nomina apud Serapionē: Dicitur enim dyatos, id est, siti re faciēs. Dicitur dyabeten, quod interpretatur penetratio. Dicitur samida, id est, perforatio. Hoc autem prouenit ex debilitate uirtutis retentiue in renibus, est enim uirtus attractiua. Attrahit enim humiditates à toto corpore ad ipsos renes, aggrauatur retentiua ex multitudine eius quod attrahitur, non figitur ergo, sed succumbit propter pondus attractorum, unde uincit super illam expulsiua, et expellit ad uesicam à renibus totum illud unde renes exiccantur, & ex siccitate renum calor magis intenditur, calor enim renum magis efficiens est mala complexio renum, aut est absq; materia quæ retentiua debilitat, & attractiuam confortat primo loco, & inde expulsiuæ fortitudo sequitur, unde humiditates corporis liquefiūt. Hæ autem passionēs lubricitati intestinorum comparantur in uelocitate euacuationis, & desiderij intentione, quia caninus appetitus dicitur, sicut enim cibi accepti uelociter egrediuntur per intestina, retentiua et digestiua superatis, sic est hic, quia quod aliunde bibitur auidius attrahitur, et attractum euacuatur, neq; hic, neq; ibi accepta immutantur. Differētia est tamen in hoc

Cc 3 quod

quod caninus appetitus est ex passione uentris & totius corporis, dyabetes uero ex sola renum passione. item appetitus caninus attrahit cibos tantum, sed dyabetes non desiderat nisi potum. Et in canino appetitu adest lubricitas intestinorum, hic autem est lubricitas uesicæ per urinam. Nocumētum in emissionem urinae, ut ex prædictis patet, aliquando fit ex superfluitate sui exitus, ut in dyabete, aliquando ex inordinato exitu & inuoluntario, aliquando ex totali retentione uel eius diminutione, non tamen omnis diminutio est nociua, quoniam aliquando diminuitur urina secundū cursum naturæ, ut in nimio fluxu uentris, uel in sudore copioso, ut dicit Isaac in urinis, quia una euacuatio aliam diminuit, unde Hippocrates in Aphorismis: Urina multa facta nocte modicum secessum &c. Sed ad curationem renum primo ueniendum. Et contra ipsorum caliditatem fient hæc remedia. Solutiuum facilitatiuum: Recip. Thamarindorum, cassiæ electæ ana unc. i. succi uolarum recentium & in conserua sacchari 3. 2. succi rosarum 3. 1. 5. myrobalanorum chebulorum puluerizatorum 3. 1. 1. tragachanti, sacchari candidi ana 3. 2. iulep uiolati, aquæ endiuie ana quod sufficit pro dissolutiōe cassiæ, & thamarindi minutim incisi dissoluētur cum dictis iulep, & aqua sufficienti
ipsis

ipsis remanentibus in forma electuarij, ultimo reliqua omnia addatur, fiat electuarium. Vnctio pro renibus: Recip. Oleorum nenupharis unc. 5. rosati & uiol. ana unc. 2. tragachanti, & gummi arabici ana 3. s. seminum 4. minorum frigidorum communium, uidelicet, lactucæ, portulacæ, endiuie, plantaginis ana 3. i. rasuræ eboris, santalorū rubeorum 3. s. cere albissime quod sufficit, fiat unctio mollis pro renibus. Si congruit, efficacius priori: Recip. Vnguenti suprascripti unc. 1. s. muscilaginis psyllij unc. 5. misce. Si iterum efficacius adde camphoræ grana 6. Si uero adhuc efficacius conuenit remedium super loco renum, ex directo ponat unam laminam plumbeam latitudinis quatuor digitorum, & longitudinis saltem sex, & grossitie saltem unius costæ cultelli conuenientis ad incidendum panem, perforatam pluribus foraminibus latitudinis partis grossioris unius acus subtilis, seu conuenientis ad suendum, hanc teneat super renibus secundum necessitatem. Doloris mitigatiuum, lapidis comminutiuum, causarum dolorum & materierum omnium eductiuum, uentositatisq; resolutiuum & eductiuum: Recip. Oleorum liliorum alliorum unc. 4. spicæ unc. 3. anethi unc. 5. chamæmile unc. 4. uittellos ouorum numero 2. pulueris cinnamomi 3. 2.

Cc 4 croci

croci 3. s. pulueris sacchari unc. 1. salis communis 3. 2. misce fiat clystere. Istud clystete calidum debite imponat dolore ipsum uexante, aut dum uexationi ex dolore proximus est. Solutium proprium: Recip. Cassie fistule unc. 1. benedictæ 3. 2. electuarij Indi 3. 1. aquarum asparagorum, scolopædriæ ana, quod sufficit pro potione, misce & fiat potio. Istud solutium assumat debite calidum in aurora, & cum custodia. Doloris mitigatium, & lapidis comminutium: Recip. Parietariæ M. 4. pulegij, chamædrios, calameti, senationum, sauinæ, chamæpythios, abrotani ana M. s. radices altheæ frustatim incisarum unc. 1. sem. lini, foenugræci, cartami ana unc. s. anisi, foeniculi, ameos, carui ana 3. 2. florum chamæmilæ, meliloti, alchechengi ana M. 1. semina contendantur grosso modo, deinde omnia simul bulliant in sufficiente quantitate aquæ fluuiialis usq; ad consumptionem medietatis aquæ, postea optime exprimantur, & colentur, cuius colaturæ: Recip. Vnc. 15. uel 12. olerum liliorum alborum, anethi, spicæ ana unc. 2. cassie fistule unc. 1. benedictæ simplicis, sacchari rub. ana unc. s. uitellos oui numero 2. salis communis 3. 2. misce & fiat clystere. Item: Recip. Diacinnamomi unc. 1. assumat aliquibus diebus unum morsellū ieiuno stomacho.

Aliud

Aliud dolorum mitigatiuum: Recip. Spongiarum 2. grossiorum trium digitorum & latitudinis proportionalis loco dolenti, & ex decoctione præcedenti, fiat fomentatio cum spongia secundum canones quacumq; hora dolore uexante, præterquam renibus dolentibus, quibus hæc fomētatio non fiat. Simplicia quæ calculum comminuūt singularia, libet sub ordine quodam describere: Et ab herbis principium sumam, ex quibus est ruta agrestis, carduus, pulegium, abrotanum, arthemisia, apium syluestre, calamentum, absinthium, extremitates uitis albæ, chamæmila, capillorum ueneris, polytricum, fenationes, parietaria, pētafilon, malua, polium montanum, sauina, urtica, serpillum, hypericum, usneæ, gallitrichō, tribulus, scolopendria, asparagi, sisymbrium, cichoriū, cotula, uerbena, bethonica, trifolium, cresspula, seu herba cācri, folia raphani, matricaria, aliqui autem arthemisiam pro matricaria suis in receptis ponunt, sed falluntur in hoc. Harum autē herbarum usus talis erit: Recip. Decoctionem ex qua libuerit cum uino uel aqua ab 3. 1. usq; ad quatuor, et sit tibi dosis, sublimetur quoque & fiat ex his aqua, cuius eadem sit dosis, uel ex his in umbra desiccatis fiat puluis, cuius à 3. 1. usq; ad 2. cum uino albo dabis solum, scilicet, aut cum

cc s uino

uino, uel alio liquore ut libuerit. Et inter ista succus maximè cōmendatur, ut sunt folia raphani, & maximè syluestris, folia similiter cardui comestibilis, & istarum duarum succus ceteros excedit, fit itē ex gallitricho, tribulo, pulegio, folijs uitis albae, & saxiphragia, urtica, cretano marino et polilitricho, asparagi leniter cocti māducentur. Senationes uero ex aceto, oleo, & sale condiuntur, ac cretani quoq; marini, & de his tribus ferculum aliquādo. Ex seminibus cōueniunt puluis seminis cardui, & semen maluae, carui, dauci, semen genestae, nigellae, semen porri, sinapis, milium solis, semen asparagi, & tribuli, canapis, cyperi, raphani, anisi, cardamomi, sceniculi, citrulli, cucumeris, melonis, & cucurbitae. Ex istorum parte maiori fit decoctio, cuius usus in casu nostro, & in omni calculo & arenulis renum est utilis. Et super omnia nigra cicera commendantur, de quibus fit communiter decoctio, iusculum quoq; laudatur. Potes tamen puluerem ex aliquibus facere si uis, ut est semen maluae, anisi, cardamomi, cyperi, sceniculi, raphani, carui, dauci, genestae, nigellae, porri, sinapis, milij solis, asparagi, & tribuli, & talis puluis cū uino aut decoctione rubeorū cicerū, seu aqua mellis cōmuniter datur, & sit dosis à 3. s. usque ad 3. i. s. Ex radicibus
laudan

laudatur infra scriptæ, ut radix cardui, tamarisci,
xylobalсами, citrulli, thymi, tribuli, costi, pentaphi
lon, capparis, yringi, cortices radicis lauri, radix
saxiphragiæ, cyperî, rad. caulis, radix apij agrestis,
uerbenæ, lapatij, fœniculi, graminis, asparagi, ra
phani agrestis & tenelli, altheæ & acori. in istor
um quoq; numero scyllâ, atq; scordeon ponere li
bet, & acetum scyllæ, et oxymel maximè commen
datur, & ex istis decoctionem in uino uel aqua po
tes facere, uel eas sublima et q̃ maximè radices car
dii, & tã de decoctione q̃ de aqua sublimationis ab
3. 2. ad 4. dabis. Valet & ipsarũ succus cum uino
potui datus, uel fiat puluis qui cum uino subtili, aut
quo sorbili dari potest. Et inter ceteros laudatur
puluis corticis rad. lauri, costi, saxiphragiæ, cyper
ri, yringi, capparis & acori, ac cinis radicis cauli
um, istorum autem dosis sit à 3. 5. usque ad 1. & sic
de ceteris potest uti. Ex fructibus conueniunt ossa
cerasorum syluestrium, ex quibus subtilissimè con
tritis fit lac, cuius unc. 4. stomacho uacuo datæ ma
ximè prosunt. Conueniunt oliuæ cum aqua &
sale conditæ, ut mos est apud montem Pessulanum.
Conueniunt melones, fistici, ac pineæ, amygdalæ
amaræ cum rob subtilissimè terantur, & potui in ie
iuno dentur, & aliqui ipsorum oleum cum modico
pulueris

pulueris ireos potui quoque tribuunt, puluis bac-
carum lauri, lac ficus cum aqua bibitum, ac ficus
ipse comestæ, & trochisci quoq; ex succo pomo-
rum, aristolochiæ rotundæ facti. Item trochisci se-
ptem, qui ex granis septuaginta piperis fiunt, quo-
rum unum omni die patienti tuo cum aqua mellis
stomacho uacuo dare, efficacissimū compertum est
apud Auicennam. Ex gummis ualet gumma pomo-
rum, amygdalarum, gumma pini, gūma uitis, gum-
ma cerasorum. Valet serapinū ac bdellium, et istæ
gummæ cum uino dissolutæ, uel in puluerem subti-
lem redactæ, potui stomacho ieiuno dentur. Ex fo-
lijs seu lignis, uel corticibus arborum, ualent folia
amygdalarum amararum, quoquo modo dederis,
seu in decoctione aut in puluere, ualet & decoctio
foliorum rubi, & lac foliorum fici. Ex oleis conue-
niunt balsaminum, cuius dosis sint guttæ quatuor
cum uino maluatico, uel consimili dissolutæ. Valet
oleum de sauina, de piperibus, amygdalarum ama-
rarum, & benedictū seu de lateribus, & si ex his
fit inunctio, aut per syringam injectio ualet. Item
oleum de granis citri, cerasorum ac citrāgulorum,
tam inunctum, scilicet, quā bibitum. Ex minera-
libus conueniunt lapis iudaicus, coralli, lapis Hæ-
matitis, lapis renum, seu quod ab humana uesica
per

per incisionem extrahitur, et lapides qui inueniuntur in epate apri, lapilli uentriū gallinarum, uel palumborum, ac lapis spongiæ. Et inter mineralia multi nitrum enumerant, quod (ut inquit Auicenna) est inter lapides sicut stultus inter homines, & talia debent subtilissimè teri. Et aliqui ponūt quod isti lapides debent super cote confricari, dehinc uero cum uino, aut decoctione cicerū, aut mellis aqua dari. Istorum tamen dosis uariatur. Nam lapidis lincis, spongiæ & iudaici dosis ana ℥. s. usq; ad 1. aliorum uero à 3. s. usque ad 1. Ex animalibus infra scripta à ueteribus plurimum commendantur, ut cinis seu puluis uesicæ apri sua cum urina desiccata, puluis renū asini, cinis testarū cochleæ, ac etiam totius cochleæ puluis, pelliculæ uentris galli, puluis iecoris hirci, ac eius desiccati sanguinis, puluis stercoris columborū, ac gallorum, turturis quoque, sed illa stercore debent puluerizari subtilissimè, & cum aqua mellis propinari. Conueniunt quoq; infra scriptorum omnium cineres, ut cicadæ, ac pullorum hirundinum, ex quibus quoq; fit ferculum de quo infra laudatur. Item scarabeorum cinis, scorpionum, erici cum suis spinis, grilli, locustæ, lumbricorum terrestriū, millepedes, testa ouis à quo sit pullus egressus, uermis de nocte lucentis, ac alarum

ac alarum anserū suis cum plumis, ac auiculæ parua, qui hyemali tēpore apud nos sæpius apparent, quam quidem caudam tremulam uocamus. Hoc tamen infra quoduis istorum in olla rudi pane extracto in furno ad desiccandum pone, in quo tam diu stet, quod commodè teri possit, cauendo tamen ne desiccet in tantum quod carbo fiat. Et secundum Apuleium quæ esui in casu isto animalia nobis sunt, luna crescente capi debent. Vitellus item oui recentis durus, ualet cum croco trito comestus. Valent passeris comesti atq; turturis decoctio. Et sola quoque urina apri, porci, atq; capræ conuenit, quæ cum tanto uino albo non dulci dari debent. Et ista sunt simplicia quæ huic crudeli morbo ualere comperi. Contra ardorem urine: Recip. Syrupi de papaue-
re, pulpæ casie ana ʒ. i. pulueris subtilis trochi-
scorum descriptorum à Rasi nono Almās. cap. de
mictu saniei ʒ. ʒ. distemperentur omnia cum aqua
decoctionis seminum communium, quæ decoctio sit
colata, & totum detur tepidum anteq̃ dormitū uadat, & cōtinuet hoc toto uno mense de sero. Cōtra
mictum in lecto: Euitet diuretica prouocantia uri-
nam. Euitet brodialia, & ferculum in coena, sed in
prandio comedat ferculum, utatur uino nigro non
uinoso. Solutiuū potest fieri tale: Recip. Casie fistu-
le

le 3. s. myrobalanorum citrinorum, chebulatorū ana
3. s. aquæ acetosæ quod sufficit pro potione, misce
et fiat potio, capiat in aurora et dormiat parum
per postea. Vnguentum ad idem: Recip. Oleorū ro
sati 3. i. myrtillorū, mastiches ana 3. s. tragachātī,
gūmi arabici ana 3. s. albuminis oui optime spuma
ti et conquassati 3. s. santalorum rub. 3. s. boli ar
meni 3. 2. rasuræ eborū 3. s. ceræ nouæ quod suffi
cit pro unguento molli, et cum pauco aceto fiat un
guentum ad lentū ignem, ungātur renes ex hac un
ctione actu frigida in sero dum uadit dormitū, et
uti incipiat die tertia post solutiuum. Cōfectio em
plastri ad diabetem: Recip. Seminis portulacæ, so
lani, carnis porcine, sem. melonis, citrulli, aut rasi
ræ cucurbitæ, quodcunq; præsto fuerit, et empla
stretur cum eo patiens, et permutetur quando fue
rit tepidum, sitq; cibus eius lentes excorticatæ, ace
tum, agrestia, et omnia quæ ingrossant sangui
nem. Cōfectio diabetis: Recip. Spodij, succi liqui
ritiæ ana 3. 10. sem. lactucæ 3. 10. sem. portulacæ
drach. 25. rosarum, coriandri sicci ana drach. 5. aca
tiæ, gummi santali citrini, lentium excorticatarum,
balaustiæ, boli armeni ana drach. 2. camphoræ 3.
s. fiant trochisci 3. 3. et detur unus in potu cum
aqua rosarum, et aqua granatorum acetosorum.

Cōfectio

Confectio quæ retinet urinam ualde: Recip. Glandium 3. 1. thuris masculi 3. 30. coriandri infusi in aceto, myrobalanorum nigrorum, boli armeni ana 3. 10. fiat puluis, & sumatur ex eo omni sero & mane 3. 4. Alia confectio quæ retinet urinam: Recip. Gladium 3. 10. rosarum, myrtillorum ana 3. 3. acatiæ 3. 2. amyli, gummi arabici, boli armeni ana 3. 1. lentium excorticatarum 3. 10. omnia misceantur simul ut decet, & utatur secundum discretionem medici. Confectio ad destillationem urinae sine ardore: Recip. Glandium thuris ana 3. 30. cyperii, myrrhae, galagae, cinnamomi, enulae, acori ana 3. 3. terantur & sumantur de puluere eorum 3. 2. s. Confectio prouocans urinam: Recip. Sem. apij, meu, phu, dauci rubrae qua tingitur, petroselinii, sauinæ, azari, ameos, fœniculi, galliæ, costi, amygdalarum amararum excorticatarum ana 3. 10. sem. melonis 3. 5. cātharidarum 3. 1. armoniaci aurei s. dissoluantur cum uino, et fiant pilulae similes auellanis, dosi 3. 2. s. est enim bona ad difficultatem urinae, et molliciem in corpore, hydropisim, hyposarcham, et ægrotudines in quibus necessaria est subtiliatio corporis, & quando est caliditas addatur in ea sem. melonis, & detur de ea 3. 1. plus uel minus. Confectio ad mictum sanguinis experta: Recip.

Recip. Boli armeni, charabæ ana ʒ. 10. acatiæ, ba-
laustiæ, gummi, hypocystidos ana ʒ. 3. sem. apij,
hyoscyami ana ʒ. 2. fiant decem trochisci, & den-
tur in potu cum robur stipticis & detur 1. Con-
fectio emplastri ad rupturam experti: Recip. Nu-
cis cipressi partes 2. cyperi, sampsuci, gallarum,
acatiæ, thuris, gummi arabici ana partes æquales,
dissoluatur gummi in uino & aggregetur cum eo,
& fiat emplastrum.

De ægritudinibus membrorum ge-
neratiuorum. Cap. II.

Secundum Græcos & Latinos.

Satyriasis uel satyriasis est morbus quan-
do fit pulsus testium, & uelut singultus
quidam inguinis, sequens inflammatam
quandam passionem seminalis receptaculi cum in-
tensione & tentigine. Quod si non cessauerit pul-
sus ille, solent seminis receptacula intendi, uel spas-
mus nasci, unde celeriter moriuntur homines. Et
dicitur satyriasis, quoniam ea affecti faciem similem
satyris habent, nasum, crassa labra, aures lenigatas,
ut scribit Galenus. Priapismus uero est cum genita-
les partes in suam longitudinem protenduntur, &
in circulum intumescunt sine appetitu Veneris. Saty-
riasis

riasis (ut iam dictum est) pudendorū est tremor, in
flāmationis quadam affectione seminalia sequens
uasa cū tenuiore intestino, & nisi tremor leniatur,
consuevit uasa seminalia abolere, aut distentionem
neruorum, spasmumq; inuhere, & inde statim ne
care. Morientes autem inflant uentrē, & sudorem
excutiunt frigidū, raro hic apparet morbus, & mu
lieribus potius. Subito igitur sanguis ē uena detra
hēdus, uictusq; sit tenuis, nec uinum potet lāguens.
Beta prodest & malua, & aliquantulum linozo
stis, non improbantur simplicia clysteria, quæ ad
mingendum cient prohibenda, cōfert in natibus re
frigerantia adhibere, ut strychnochylus, aut succus
portulacæ, aut hyoscyami, aut conij. Penis & uici
na loca illinienda refrigerantibus, ut lithargyro,
cimolia, cerusa, aceto, eliquata in aqua, aut uino dul
ci, supinum quiescere perniciosum est. Potare expe
dit nymphaeam radicem, & irim, & adianthum, &
rutæ succum, nutrimentum sit paucus cibus, sitis to
leranda. Languore durante cucurbitulæ à princi
pio sunt admouendæ, si multitudo exurat, sangui
sugæ admoueantur, uēter crudalysi cataplasmate
illiniatur. Priapismus uero est penis membriq;
genitalis explicatio in longitudinem, & in gyrum
tumor. Target enim absque Venere. Indicatur
nanq;

namque manifesta inflatio, cum ea pars spiritu turget mediocri, quadam caliditate factus ex humidis tenacibusq; ac crassis humoribus, certum est eam partem calefaciendam non esse, sed aptè refrigerandam rosacea, et cerata cum aqua discissa, ac chamæmilo, pudendisq; epithemata ponenda. Medicamina uero inducenda quæ uim attenuandi habent, ut manifesta absit calefactio, admouendaq; sunt quæ naturaliter exerceant, nymphaea his potanda est, & agni semen, rutaq; uiridis cibus ammiscenda. Hoc tamen non est in ipso faciendum principio, quandoquidem satis calefacit, sed postèrius, ut aliorum attenuandi uim habentium usus adueniat, deiectione utendum est, idq; uomitu faciendum, ne infernæ uētris partes stillantes ob uicinitatem lædant, exercitium, frictioq; admittenda ob spirituum distractionem. Coitus in his duobus proximè memoratis morbis prorsus est alienus, nisi coniectura consequamur aliquam redundare materiam. Est etiam circa naturalia uitium, seminis nimia profusio, cōtinua sine pudendorum intētionē, siue uenere, siue nocturnis imaginibus, sic fertur, ut interposito spacio tabe hominem cōsumat, id ex imbecillitate potentiæ fit & succumbentibus uiribus, ubi quies custodienda, cōtegantur nates et pecten,

D d 2 appo=

apponatur uinum & melinum, uel cenanthinum, cataplasmata fiant diaphœnicon, malorum cenanthēs, acatiæ et hypocystidis, & rhois, & similium apponantur iunci, & bari, & huiusmodi in uino decoctiones, uel etiam aqua. Cibis utatur arefacientibus, reliquis temporibus exercitium ducatur, quo totum corpus & languētes partes in fluxorem perducantur. Cubile profuerit stomna frigidior, & medicamina frigida omnia subillitanatibus, & sub coleis, cuiusmodi sunt coriandrum & cicuta, quæ conium nominatur, & cerusa, & portulaca, cunctaq; cum aceto.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.

SI arteriæ et nerui uirgæ impleantur uentositate, necesse est uirgam erigere, & rectam diu permanere, quod si diu permaneat, neq; resideat, sine tamen uoluntate & concupiscentia coitus, passio est quæ porgesmos uocatur, cuius causa est uentositas inflatiua, & grossa humiditas uiscosa, & calor moderatus. Galenus omnis, inquit, medicina uel diæta, quæ coitum augmentat, huic passioni est nociua, cui medicandum est dando contraria, uentositatem mitigantia, & refrigerantia. Rasis: Quandoq; accidit erectio assidua

assidua nocens & perducēs ad spasmum, et agri-
tudines assiduas. Cura eius est, si est caliditas, phle-
botomia, & si adest albedo coloris et paucitas san-
guinis, adhibeatur medicamen calidum minorans
sperma. Serapio: Scias quod euacuatio spermatis
extra naturā, aut sit ex spasmō instrumentorū sper-
matis, sicut accidit in epilepsia, et est corruptio sen-
sus & mollificatio, aut ex debilitate uirtutis reten-
tiue, quæ est in instrumentis spermatis donec non
potest retinere sperma, & totum hoc accidit etiam
quādo mouetur uirtus euacuatiua, quæ est in instru-
mentis istis motu malo. Et sumat in potu ex medici-
nis quibus est proprietas in curatione huius agri-
tudinis, sicut est nenuphar cū uino stiptico, & aqua
decoctionis lentium, & aqua portulacæ, & semen
eius cum semine lactucæ. Et si non est caliditas ap-
parens, permisce etiam semen agni casti, & rutæ
recentis in cibis eorum. Et oportet, ut hoc admini-
stretur in fine, non in principio, quoniam calefacit
ualde. Medicamen ad Gonorrhœā: Recip. Seminis
agni casti & rutæ amborum ana ʒ. 1. teratur &
cribelletur, & detur cum aceto permixto. Aliud:
Recip. Seminis rutæ, anisi ana drach. 2. castorij, se-
minis hyoscyami albi ana ʒ. 5. rosarum rubearū,
balaustiarum ana drach. 3. teratur & cribelletur,
Dd 3 dosis

dosis sit ʒ. 2. cum aqua frigida. Aliud: Recip. Seminis lactucæ ʒ. 3. schedenigi ʒ. 2. s. seminis rutæ ʒ. 1. s. teratur & detur dosis ʒ. 2. cum secaniabin. Et post istos potus fiat ut infirmus utatur exercitio, donec stringatur corpus eius. Et res quæ ualent ad coitum, & faciunt ad emissionem spermatis, sunt semen urticæ, et bulbus, & est cepa campestris, & semen napi, & napi ipsi, & bauciæ, & semen earum, & mentha, & eruca, & cicer, & faba, & pisces qui dicitur multorum pedum, & grana pini, et calamethum, & radix serpentariæ. Plane quando coquitur & comeditur, & loca sunt in circuitu renum, stinci, & oua perdicum addunt in erectione, et costum etiam quando accipitur cum gelaniabin de melle, aut cum syrupo de melle, testiculi uulpis etiam, quando accipitur ex eis cochlear unum, addunt in erectione, & cepæ, & asparagi, & cerebella passerum. Isaac libro eodem: Et apostemata, & uulnera uirgæ, seu pustulae sunt ex humoribus à corpore descendentibus, quod palæ est sensui, cum hoc in propatulo sit intelligendum unde nascatur, quoniam ex infirmorum complexionibus. Et humores à corpore ad testiculos descendentes, apostema ibi facere solent, qui si sint acuti uel calidi, calor rubens uel citrinus, inde exit cum ardore, dolore,

lore & pulsatione. Si materia sit frigida, color apostematis fit talis, qualis est color corporis, & sine dolore. Si uero ex percussione uel scissura fuerit, infirmus bene manifestabit. Vulnere autem in testiculis deuenientia, si sint calida, sic sunt medicanda: Accipiaturs chimolea cum aqua, & acatia, cerusa cum oleo rosato, lithargyrum, cathmia argentea, oleum rosatum, & superponantur, & omnis crepatutura in pelliculis uentris, & testiculorum existens circumdatorijs est ex motu forti, sicut si post saturitatem graue tollatur pondus, uel fortiter tuſſiat, seu alte uociferetur, uel post saturitatem coeat, seu luctetur, uel propter lubricam humiditatem, unde & membrum lubricum fit, & sic locum suum dimittens, & alium non accipiens, unde & pellicula illius loci est fissa, scilicet, ita quod si neruus crepuerit non solidatur, sed tamen quedam crepatura est leuior altera, quæ cum incensione curatur, & ad dilatationem retardatur propter colligantiam extremi nerui seu pelliculæ, quod maximè contingit in pueris plusquàm in alijs etatibus.

Dd 4 Ex

Ex traditione autorum re/
centium.

IN membris uirorum generatiuis multæ accidunt passionēs, scilicet, paucitas coitus, uel defectus, uel effusio seminis sine delectatione & sensu, uel immoderatus appetitus. Coitus paucitas aut defectus, approximeron dici solet. Et huiusmodi passionis causa est in uirga, aut in membris spermatis, aut in mebris principalibus uel generatiuis, uel inferioribus, uel propter inflationis paruitatem in toto corpore, uel circa membra generatiua. Causa uero facta in uirga, aut est malicia suæ complexionis, aut superflua eius mollicatio. Item causa facta circa testiculos, aut est eorum siccitas immoderata, aut est frigus congelans humiditates, quare non calefit sperma, neque subtiliatur. Causa autem membrorum principalium, aut est à parte cordis, quia denegatur calor testiculis, aut uapor aëreus, aut ex parte epatis, quia non mandatur materia spermatis generanda, aut à parte cerebri, quia spiritus sensibilis, & motiuus non potest penetrare, aut propter impedimētum, quod est in uia, aut ppter id quod est in cerebro, aut propter causas exteriores, ut quādo leditur caput casu uel percussione, & cōsimilibus. Item causa est, quando

quando membra uicina nobilibus, ut propter nocu-
mentū quod est in stomacho, aut renibus, aut in dia-
phragmate. Aut causa est ab inferiorib. sicut in for-
ti dolore ani, uel propter hæmorrhoidas, uel pro-
pter concussione, uel propter constrictionē in infe-
riori parte spinæ, unde mēbra spermatis cōpatiun-
tur, & uentositas inflatiua aufertur. Item acciden-
tia animæ horribilia uirtutē coeundi debilitāt, sicut
est, dolor, sollicitudo, inhonestas coeundi, uerecun-
dia, cōuersio animæ ad intellectū, & fit obliuio ge-
nerandi sperma, sicut obliuiscitur natura generare
lac in māmillis fœminæ remouentis filiū à lacte, ut
dicit Auicēna. Priapismus autē & satyriasis passio-
nes etiam sunt membrorū generatiuorum, sed hæ
passiones inter se cōueniunt & differunt. Cōueni-
unt, quia utraq; operatur immoderatā uirgæ erecti-
onem. Differunt tamen, quia in priapismo non est
concupiscentia coitus, et non per coitū mitigatur.
In satyriasi est concupiscentia coitus, & per coitū
sedatur. Priapismus uero est passio difficilior ad
curandū, et contingit propter multitudinē grossæ
uētositatis, quæ in mēbris spermatis est inclusa, uel
supueniens ex arterijs ex superfluo & aquoso san-
guine repletis, quæ ad integritatē uirgæ conueni-
unt. Satyriasis autem magis generatur ex amore

Dd 5 alicuius

alicuius personæ desideratæ, et circa quam diu fuerit fixa intentio. Hæc enim materias mouet ad uasa spermatis, quæ per easdem uias querunt euacuari, uel etiam humiditatis spermaticæ multa collectio ex quacunque causa. Hæc ergo causa diu perseuerans, uasa spermatis perducit ad spasmum et tetanum, uel apostemata calida et uentosa, et interficit ad ultimum. Gonorrhœa autem passio fit ex abundantia humiditatis spermaticæ naturam aggrauantis et debilitantis, unde nihil potest retinere, aliquando enim ex spasmu, dindimos et uasa spermatis replente, unde similiter aggrauatur natura, aliquando fit ex paralyti lacertorum, aliquando uero ab acumine spermatis, uel nimia subtilitate, aliquando autem sua nimia liquiditate. Aliquando fit in nocte pollutio quæ quatuor habet causas, uel nimiam ciborum repletionem, ut crapulam, uel amorem nimium, et continuam delectationem supra personam mulieris dilectæ, uel decubitum longum supra spinam dorsi, quæ quidem tria sunt causæ primitiue, uel nimia humorum superabundantia, quæ est causa antecedens. Causæ primitiue ab indicio patientis cognoscuntur. Pollutionem sæpe habentes cum frigida medicina, siue cibarijs, siue unguentis curantur. Ad multiplicandum sperma, et confortandum uias spermatis, sic est processus

procedendum: Caueat ab herbis crudis, & oleribus,
& à pomis, & aqua pura, & à uino brusco. Come
dat carnes agni castrati annualis, & hœdi lacten
tis, carnes perdicum, pipionum, & porci, & oua
sorbilia, & corpus cicerum deiecto cortice, & ce
pe decoctum, & pisces fluuiales conditos cum spe
ciebus recentibus, & bibat uina declinantia ad ma
gnitudinem non nimis subtilia, nec multum limpha
ta. Comedat panem mundum à furfure. Sumat de
ista confectione omni sero quando uadit dormitū.
Recip. Auellanarum, amygdalarum dulcium ana
℥. 1. pinearum mundatarum ℥. 2. s. testiculorum
uulpis elixatorum in lacte caprino ℥. 2. fisticorum,
passularum ana ℥. s. linguae auis ℥. 1. s. been albi
& rub. zingiberis, galāgæ, sem. erucæ ana. 3. 1. s.
sacchari albi quod sufficit fiat confectio. Et utatur
pulvere isto: Recip. Cinnamomi, piperis lōgi, galan
gæ ana ℥. 1. macis, croci ana 3. 1. zingib. albi ℥. 2.
calamēthi 3. 3. & fiat puluis quo utatur cum quodā
modo decoctionis ceparum in furno, & postea tri
tarum, & postea iterum decoctarū cum istis specie
bus. Pilulæ mirabiles ad prouocandū coitū. Recip.
Eminum ceparum albarum, testiculorum uulpis,
florum palmæ, thuris albi, cerebellorū passerū ana
℥. 2. informantur pilulæ cum aqua calida in modū
ciceris,

ciceris, & dentur quinq; uel sex & non plures. Ad gonorrhoeam siue spermatis incōtinentiam fiat hoc unguentum: Recip. Succī solani, succi plantaginis, succi ungulæ pastoris ana unc. 1. unguenti populeon, olei rosarum ana unc. 3. olei nenupharis unc. 1. camphoræ unc. s. fiat unguentum & inungatur renes & pectinis partes. Sumat sero quando uadit dormitum, & aliquando mane de puluere radicū nenupharis, quantū tribus digitis potest capi cum pauco potu uini limphati. Quod si ista non sufficiant, utatur aqua destillationis plantaginis in qua bulliant semina agni casti & continuetur, & itere tur multotiens. Ad pollutionem inuoluntariam fiat tale unguentum: Recip. Olei rosati, olei nenupharis ana unc. 1. succi foliorum salicis, succi lactucæ, succi solani, aquæ portulacæ ana unc. s. coriandri, gallarum, mastiches, seminis agni casti ana drach. 1. aceti unc. 1. quæ sunt terenda terantur, & fiat unguentum pro renibus & testiculis. Emplastrum ad rupturam & herniam longæ compositionis, quod laudibus multis extollendum est: Recip. Colophonie, armoniaci, galbani ana drach. 5. s. picis naualis unc. 1. lithargyri, ceræ albæ & rubæ ana drach. 5. uisci quercini, gypsi, thuris, myrrhæ ana unc. 2. s. boli armeni, nucis cipressi ana uncia 1. s. cabala

caballini mastiches, consolidate maioris & minoris
ana unc. s. & drach. 1. Aristolochie longae & ro-
tunde ana unc. 2. et drach. 3. gallae unc. 2. et scrup.
2. terebinthinae lotae cum aceto unc. 2. & scrup. 4.
sanguinis humani unc. 4. acatiae, sanguinis draco-
nis, mumiae ana unc. s. pellis arietinae depilatae in-
cise, quae bulliant in aqua donec liquefiant, postea
addantur glutinis scriptorum, glutinis carpentari-
orum, glutinis piscatorum, glutinis licodemonum
ana unc. 1. fiat emplastrum. Hoc enim emplastrum
diligentissima compositione paratum, superexten-
dere oportet sufficienti sindoni aut corio subtili, &
rupturae applicetur, partibus demum cum bomba-
ci plumazeolum habete superligare. In primis ta-
men decem diebus continuis laboranti, & ieiuno
danda est haec mixtura: Recip. Hederae contritae
drach. 1. s. radicum consolidate maioris & minoris
recentis minutim incise, & contuse, aut siccae pul-
verizatae drach. 2. s. & conficiantur cum ovo simi-
liter, & coquantur, & administrentur omni die.
Alijs decem diebus sequentibus offeratur haec. Re-
cip. Pilorum leporis minutorum, ut pulvis sangui-
nis draconis ana drachmam unam, praeparentur
uel exhibeantur secundum eum qui dictus est mo-
dus. Modus autem condiendi cibos eius cum medi-
cinis

cinis est, ut in illis quos assumit patiens hora cœ-
næ, imponatur huiusmodi puluis: Recip. Fauces li-
cij magni separatas à carne, & combure eas in ol-
la noua cooperta in clibano, postea pulueriza, de-
inde accipe pulueris eius unc. s. & consolidæ maio-
ris & minoris ana drach. 3. millefoij, arnoglossæ
ana drach. 2. sanguinis draconis, mastiches, thuris,
uolubilis minoris ana drach. 1. s. gariophylorum,
cinnamomi, xingiberis, cardamomi ana drach. 2.
sacchari quantum uis, reducantur in puluerem, &
commisceantur omnia, de quo sumat patiens fre-
quenter cum cibis. Syrupus huic intentioni appro-
priatus: Recip. Succij iacæ nigræ, succij epaticæ ter-
restris, consolidarum omnium ana lib. 1. succij cor-
rigiolæ, succij plantaginis ana lib. s. succij rutæ uiren-
tis unc. 4. depurentur hi succi cum decoctione ha-
rum rerum in illis: Recip. Mumie, mastiches, thu-
ris, rosarum, boli armeni, sanguinis draconis ana
drach. 3. myrti, sumach, nasturcij, coralli rubei, ci-
peri ana drach. 2. nucis cupressi drach. 2. myrrhæ,
gariophylorum ana drach. 1. bulliant hæc omnia
in succis usq; ad consumptionem tertiæ partis ipso-
rum, post colantur & syrupizentur cum saccha-
ro, aut melle secundum naturam patientis, de tali
igitur & taliter constructo syrupo, decursu uigin-
tiquinq;

Etiquinque dierum, uel alicuius temporis, emplastra-
tione nequaquam prætermiffa, exhibeatur laborā-
ti. Neceffe est etiam exhibere de huiusmodi apo-
zematē: Recip. Radicum herbæ sanctæ Mariæ, ra-
dic. prouencæ, herbæ sigilli Salomonis, foliorum
graminis & radicis ana M. 2. radicis gariophila-
te M. 1. terantur & coquantur in uino optimo &
subtili, quod uinum reſeruetur, & diſtemperetur
cum eo ſyrupus in hora ſuæ exhibitionis ſecundum
notam proportionalitatem, & perduret huiusmo-
di exhibitio per ſingulos dies unius ſeptimanæ, aut
duarum ſi fuerit ægritudo inobediens & difficilia.
Pilulæ mirabiles in ruptura: Recip. Limaturæ
ferri unc. 1. pilorum leporis puluerizatorum unc.
s. nucum cipreſſi drachmas 3. mumie, ſanguinis
draconis, olibani ana drachmam unam cum ſucco
millefolij incorporentur, doſis earum eſt drach. 2.
oportet autem nocte qua porriguntur pilulæ ſuffi-
cientem portionem magnetis, leuem ſimul
& applanatam loco ſuperpone-
re patienti, emplaſtro
depoſito.

De ægri-

De ægritudinibus matricis:

Cap. III.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Stium uulvæ in muliere, ac in cæteris animalibus naturam atq; os genitale uocari uidimus, in medio tunicula utrinq; apparens, nympha & clitoris dicitur, partem interiore matricem, locosq; appellamus, qui desiderio coitus sæpe descendunt in ijs quæ acetabula sunt dicuntur, quibus per umbilicum foetus augetur. Vulva nulla uim immutandi seminis, sed cõseruatricem tantum possidet. Ex ijs acetabulis à partu menstrua profluunt, similis in maribus est, quæ in semen genitale per concoctionem uertit menstrua. Cum plurimum lunæ motu singulis mensibus profluunt, quo profluuio uirginibus uox mutatur, ut in maribus primo coitu, mammæ inde tumescunt, locorum ostium in conceptu aperitur, & exinde clauditur, nec amplius recluditur, nisi mulier superfoetet, uel fluxionibus laboret, uel si menses fluant. Os id adeo occlusum est, ut aër subire nequeat, loci ipsi posituram habent inter spinæ imæ partem, quam os sacrum uocamus, supra uescicam, contra

contra mediam positi aluum, inde paulū ad dexte-
riorem coxam conuertuntur, postea super rectum
intestinum progressi ilijs. Vulua in uirgine exigua
est, in muliere, nisi ubi grauida est, nō multo maior
quā manu comprehendi possit. Ea cordi, arterijs,
neruis, cerebro, spinæq; medullæ committitur, præ
cordijs item mammis, renibus, uentri, ilijs, coxis, pu-
bi, quæ omnia in uulue strangulationibus percipi-
untur, quibus anima subducitur, uertigines sentiūt,
capilli in uertice uel occipitio conuelli arbitrantur,
lumbos præterea, femora, inguina & stomachū do-
lent. Menses non nisi semen incoctum ab Aristote-
le appellantur, ex partibus quæ supra infraq; renes
sunt, & à lumbis minimis uenis prodeunt ad uul-
uæ acetabula, quibus foetus in utero alitur, uel à pu-
erperiō iuxta naturalium ora, ex uenis quoq; dua-
bus secundum os pubis, iuxta urinæ exitum erum-
punt, ex ea parte & foeminarum non prolificum se-
men in coitu effunditur, tanto in plerisq; impetu ut
masculorum more longius exiliat, diuersæ equidem
naturæ ab eo quod in uulue cauo prolificum restag-
nat. Ex uulua quoq; foeminis uehemens malum na-
scitur, proximeq; à stomacho uel afficitur hæc, uel
corpus afficit, interdum etiam sic exanimat, ut tan-
quā comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic

Et

casus,

casus, eò quod neq; oculi avertuntur, nec spuma profluunt, nec nerui distenduntur, sopor tantum est, idq; quibusdam foeminis crebro reuertens perpetuum est, ubi incidit, si satis uirium est, sanguis missus adiuuat. Si parum est, cucurbitulae tamen defigendae sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioquin iacere consuevit, ad mouere oportet naribus extinctum ex lucerna linimentum, uel aliud ex his quae foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemq; aquae frigidae perfusio efficit, adiunatq; ruta contrita cum melle, uel ex cyprineo ceratum, uel quodlibet calidum & humidum cataplasma naturalibus pubetenus impositum. Inter haec etiam perfricare coxas & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit circumcidendum uinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius quidem corporis, praecipue uero uentris & poplitum. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super imum uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commode uidetur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cera alba atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum uel caprinum cum rosa mixtum. Dandum potui etiam uel castoreum est, uel gub uel anethum. Si parum pura est, purgatur.

IHNCO

in unco quadrato. Si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, et recens suilla adeps, et ex ouis album misceatur, idque apponatur, uel album ex ouo cum rosa mixtum adiecto, quo facilius consistat, contrita rosa puluere. Dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae cute incisa inguinibus, uel etiam sub mamis admotae, et si maligna purgatio est, subiicienda sunt coeuntia, id faciunt etiam albae oliuae, et nigrum papauer cum melle assumptum, et gummi cum trito semine apij liquatum, et cum cyatho passi datum. Praeter haec (ut Celso placet) in omnibus uesicae doloribus idoneae potiones sunt, quae ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia similibusque. Item etiam decocta lentiscus praestat, si tamen intolerabilis dolor est, et sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut certe coxis admotae cucurbitulae cute incisa. At cum urina super potionum modum etiam sine dolore profluens, maciem et periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione et frictione, maximeque in sole uel ad ignem. Balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora, cibus comprimens. Vinum austerum, meracum, per aestatem frigidum, per hyemem gelidum, sed tantum quantum minimum sit. Infinita alius quoque uel ducenda uel lacte pur-

Ec 2

ganda

ganda est. Si crassa urina est, uehementior esse dicitur & exercitatio & frictio, longior in balneo mora, cibus opus est teneris, uinum idem. In utroq; morbo uitanda omnia sunt, quæ urinam mouere consueuerunt. Pota uero à podice sanguinem agunt cuncta urinam citantia, & erysimum & asarum cum mulso, calamus odoratus. Alumen, castorium, cicerum decoctio cum pipere & ruta. Asphodeli radix in uino decocta, glychonis in uino decocta, eryngij radice decoctio, abrotani fructus, origani, thymi, thymbrae, rutæ decoctio, crithamon, cuminū, sinapi, porri semē, balsami fructus, glycyfides fructus, daphnoidis, myrrha, cardamomum, clymenum, sagapenon, foeniculi semen, nardi spica, costus, styrax, centaurij magni radix, brathy, iris, aristolochia, cicodonorum flos & succus, lapathi radice decoctio, arthemisia, dictamum. Horum singula decocta cum uino, uel dissoluta & pota sanguinem agere creduntur, congruunt autem in quibus purgationes præpediuntur, uel strangulationes purgantur, uel musculus podicis contractus & inclinationibus, & recursibus podicis & suffocationibus.

Ex

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.

Menstrua mulieribus conueniunt cum etate. 14. annorum subeunt, sed tamen si festinauerint menstrua in. 12. hæc faciet natura, quæ sic contingunt mulieribus, sicut pollutio masculis, causa eorum est, quia corpora mulierum frigida & humida sunt, unde multos humores colligunt, qui cum ad inferiora descendunt cum mēstruis exeunt, sicut in arboribus sæpe uidemus quarum humores cum gummis egrediuntur. Cum exeunt menstrua secundum quod oportet in quantitate & tempore, purgantur humorum superfluitates, quod si fiat contra in quantitate sine tempore, uel si auferantur, diuersitates passionum generantur. Eorum ablatio aut est naturalis aut non naturalis, quæ mulieribus post quinquaginta annos contingit, alijs in quadraginta, alijs in 35. maximè multum pinguib. & carnosiss. Ablatio accidentaliter est uel ex uirtute, uel ex organis, uel ex materia. Ex uirtute, ut si membris dominantur aliquæ complexionēs malæ, scilicet naturaliter uel accidentaliter. Ex organis propter substantiam uulvæ, uel uenarum suarum. Ex substantia uulvæ, ut si sit spissa & uiscosa naturaliter uel accidentaliter. Ex uenarum substantia, si sint

Ee 3 strictæ

strictæ sicut pinguibus euenit, quibus uenarum ora sunt constricta naturaliter uel accidentaliter, sicut ex oppilatione quæ innascitur eis ex humorib. grossis & uiscosis. De materia secundum quantitatem uel qualitatem, uel ex motu suo. De quantitate si sit parua, quæ paruitas uel est ex subtili diætâ, uel ex magnis exercitijs. Rursus mulieres se exercêtes et nimium mouentes, non multum habent menstrua, sed quæ quiescunt & multum comedunt, & suauiter uiuunt, multa indigent purgatione menstruorû. Ex qualitate materiæ, uel ex grossitudine & uiscositate, uel de frigidityte & siccitate, sanguis enim ingrossatus claudit uias neq; faciliter exit, similiter infrigiditytatus uel exiccatus nō currit per uenas facile. Ex motu materiæ in alia membra se mouentis, sicut & in anum & dicitur hæmorrhoids, uel in nares, & dicitur fluxus sanguinis. Rursus si quædam mulieres multum fluxum sanguinis habuerint, & quædam ab hæmorrhoidibus, uel de pectore, uel de uenis quæ crepuerint, multû emisserunt. Hæ omnes et similes menstrua descendencia non habent. Item menstrua auferuntur & corrumpuntur ex continua tristitia, motu, gemitu, timore, ira & alijs talibus animæ passionibus. Cum uero ablatio menstruorum ab eis diu elongetur, passionē in stomacho patiuntur,

tiuntur, utpote defectionem appetitiue uirtutis, ab
ominationem, malum appetitum, sicut pulueris ter
re, carbonum, laterum, & similia. Alia adhuc pas
sio sequitur maior, sicut colli, dorsi, capitis & oculo
rum dolor. Patiuntur etiam acutas febres. Urina ea
rum pertinet nigredini & rubori. Aliquando est si
cut lauatura carnis recentis. Vniuersaliter enim ea
rum corpora morbis maximis sunt apparatus, sicut
phthysi, hydropisi, manie, morpheæ & talib. phle
botomemus ex uena media donec hora menstruor
um ablata erit maior. Fluxus autem sanguinis exia
ens cū menstruis plusq̃ oportet, uel de organis erit,
uel apertis uenis uulue, scilicet crepatis, & tūc san
guis subito, & uelociter exit rubeus & clarus, uel
ex materia cum augmētetur sua quantitas propter
multam suauitatē, & nimiam comestionē, uel pro
pter qualitātē, ut sit acuta, cholerica, uel salsa, phle
gmatica, uel ex acumine sanguinis, quem uulua reti
nere non potest & festinat ut expellat. Si materia
sit cholerica: color eius citrinus fit, si phlegmatica
albus, si sanguinea rubeus, hoc fit cum totius cor
poris corrumpitur sanguis, & descendens ad uula
uam effluit, quod non possunt compati membra cor
poris propter corruptionem sui, & malignita
tem suæ equalitatis. Si augmentatur fluxus iste,

Ec 4

neq̃

neq; cesset, patiuntur mulieres colorū mutationes, fastidia, macilentiam, hydropisim, quia epar propter hoc necesse est refrigescat & actio sua deficiat, unde oportet ut si augmentetur, et cum extinguere uelimus, mulieres in superioribus phlebotomemus, ut materiae ad superiora trahantur, hoc fit si sanguis causa fuerit. Si cholera rubea sit, catarticū dandum est, quod eam purgare debeat, et similiter in phlegmate, uel in cholericā nigra faciamus catartica sibi conuentientia, deinde redcamus ad medicinam stringentem sanguinem. Aliquando mulieres patiuntur suffocationem matricis, unde earum appetitus deficit, & corpus refrigescit, saepe mulieres inde deficiunt & subtiliantur, pulsus earū paruus adeo & ualde debilis. Aliquando ex toto auferitur. Aliquādo mulieres adeo coartantur, ut earum capita genibus implicentur. Vnde Galenus: Vidi mulierem huiusmodi patientem, quæ & flatum perdidit uerè & pulsum quasi mortua esset, neq; distulit à mortua, nisi quia parum erat in medio corporis calida, multi medicorum eam mortuam esse putabant. Quod certificare uolentes, lanam carpinae tam rarissime acceperunt & naribus apposuerunt, de cuius motu eam uiuere certificati, quia flatum habebat, omne animal flatum habens uiuit.

Causa

Causa eius passionis multitudo est spermatis, uel corruptio sui. Hæc contingunt, quia diu remotæ fuerunt à uirorum cōiunctione, unde necesse est ut augmentetur sperma & corrumpatur, & quasi uenenum efficiatur. Hanc ægritudinem uiduæ plurimum patiuntur, maxime prius maritatæ & paraturlentes sepiſſime. Similiter puellæ patiuntur cum ad ætatem ueniunt, neque cohabitent cum masculis. Sperma enim coadunatur in ipsis, quod expellere sicut & masculis necesse est, hoc enim naturæ actio expetit, cum mulier habere masculum non ualeat, adunatur in ea sperma, & ab ipso factus fumus ascendit ad diaphragma, quia diaphragma & uulua coniuncta sunt, quia uero diaphragma coniunctum est cum gula & instrumentis uocis, suffocatio inde contingit. Iterum hic morbus est ex menstruorum ablationibus. Nam si menstrua auferantur, & sperma augmentetur multo peius est, & maxime in autumno & hyeme, & primo in hac ægritudine machinandum est ut manus & pedes mulieris fricemus. Et aliquando apostemata nascuntur in uulua multiformia. Si ergo adsit cholera rubea, calidum generatur apostema, quod tamen fit de uentositate grossa, uel de percussione, uel de menstruorum ablatione. Si enim apostema

Ec 5 in

In uulua fit prora, sequitur dolor cum stranguria, si in ore uulua, umbilici & narium aderit dolor, si in eius puppe, sequitur dolor dorsi, constipatio digestionis, dolorq; sub hypochondrijs. Si apostema sit cholericum uel sanguineum, febres habet acutas, sitim & dolorem. Si de humorib. sit grossis, tumor & durities & grauitas in anchis & coxis, unde oportet succurri. In uulua uulnera generantur de acutis apostematibus, & aliquando de acutis medicamentis uel de abortu, quae certificantur ex sanie inde effluenti, & ex dolore et pulsatione in matrice. Si sit putrefacta sanies, fit ex cholera nigra cum putredine horribili & ardore nimio, unde mulieri est praecipendum, ut in uuluam ponat illa quibus uulnera mundificentur, & calor extinguatur, & dolor mitigetur. Et aliquando uulua patitur mollitiem propter humiditatem nimiam, uel in loco frigido multam sessionem, seu aquae frigidae infusionem, his enim emollitur, & suo loco egreditur, aliquando egreditur propter nimiam expressionem in partu. Auicenna: Menstrua temperata in quantitate & qualitate, & tempore suo currente secundum consuetudinem naturalem, in omni spatio sunt causa sanitatis mulieris, & mundificationis corporis eius, et faciunt ipsam acquirere castitatem & paucitatem desiderij.

desiderij. Menstruatio equalis est, ut menstruetur mulier omni mense usq; ad triginta dies, & quod est supra illud, & infra illud, scilicet quod cadit in. 15. uel. 17. est non naturale. Ex nocumento menstruorum, scilicet in euacuatione superflua peruenitur ad additionem debilitatis mulieris, & alterationem formæ illius, & paucitatem conceptionis, & multitudinem abortus, & debilitatē foetus cum nascitur. Et retentio menstruorum & paucitas eorum commouet in eis ægritudines repletionis omnes, ut apostemata, dolores capitis, tenebrositatem uisus, & cōturbationem sensuum, febres, repletiones uasorum spermatis, quare fit desiderans non casta, & non suscipiens filiū in imprægnatione propter corruptionem matricis & spermatis, & præfocationē & syncopim, & quandoq; moritur. Et de mulieribus est cuius alteratio menstruorum festinat in. 35. uel. 40. anno uitæ suæ, & de eis est in qua tardatur usq; quo ueniat ad quinquagesimum annum.

Ex traditione autorum recentium.

Matrici accidunt complexionales passionēs, instrumentales & communes. Et accidit mulieribus suffocatio matricis, ut quando matrix propter uaporē distensa, uel superius

perius eleuata comprimit diaphragma. Item acci-
dit eis præcipitatio scilicet, ut descēdat plusquàm
debeat, ut in uiris intestina. Huiusmodi autem ægri-
tudines accidunt quandoq; ex proprio uitio matri-
cis, quandoq; uitio aliorum membrorum quibus ma-
trix compatitur, inter quos morbos agitur primo
de retentione menstruorum præter naturam, quia
secundum naturam retinentur usque ad. 12. annos
uel. 14. uel post. 50. ulterius, et aliquando citius se-
cundum naturam mulierum. In tempore autem in-
termedio retinentur præter naturam, aliquando
languore, exercitio plurimo, fame, siti, & accidenti-
bus animæ, ubi nō ualet calefactio aromatum, quia
menstrua consumuntur interius per prædicta. I-
tem in tempore intermedio retinentur iterum se-
cundum naturam, ut in prægnantibus, quod medi-
cus habet considerare, ne tunc prouocans mēstrua
fiat homicida uel causa abortus. Nec semper credat
fœminam non esse imprægnatam si menstrua emit-
tat, licet hoc in paucis accadat, sicut in ualde forti-
bus quæ sunt repletæ habitudinis et complexionis,
in quibus plurimus sanguis est generatus, qui totus
non est necessarius ad foetus nutrimentum, neq; e-
tiam tunc temporis ille sanguis prouenit à matrice
cum sit uehementer clausa, sed à uenis exterioribus
orificij

orificij exterioris, quod semper est apertum. Reti-
nentur iterum menstrua propter alias causas, sicut
propter sanguinis grossitudinem, uel propter oppi-
lationem factam in uenis, uel propter constrictio-
nem quæ accidit in uijs & orificijs earum secundū
plurimam frigiditatem, uel uiscositatem, uel pro-
pter apostema factum ibi, uel in uelocis uicinis, un-
de sequitur fortis constrictio, uel ex pinguedine su-
perflua, uel ex panniculo etiam denso, qui genera-
tur in orificijs uenarum, aliquando unde prohiben-
tur menstrua currere. In omnibus his prodest aro-
matum calefactio. Retinentur etiam propter alias
causas, sicut propter debilitatem uirtutis, quia san-
guis ad alia loca deriuatur. Aliquando mulieres pa-
tiuntur nimium fluxum menstruorum, & hoc ali-
quando fit, quia orificia uenarum matricis nimis a-
periuntur & sanguinem nequeunt retinere, aliquā-
do fit quia ipse uenæ rumpuntur ex saltu, casu, per-
cussione, aliquando uero ex nimio cibo & potu &
assidua quiete, aliquando uero propter aborsum, a-
liquando ex acuitate sanguinis & nimia subtilita-
te, aliquando uero propter difficultatem partus, ali-
quando propter hæmorrhoidas in collo matricis,
unde prægnantes aliquando mingunt sanguinem,
aliquando uero ex rhagadijs, uel ulcerib. malis an-
tiquis

tiquis matricis, aliquando uero ex dominio mali humoris in corpore naturalis uel innaturalis, sicut abundat sanguis adustus, & sanguis crudus, aquosus, phlegmaticus. Est alia passio matricis quæ suffocatio nominatur, & causa istius passionis est plurima spermatis aggregatio circa testiculos mulierum, ut contingit in puellis adultis uel uiduis continentibus, cum non utuntur consueti coitu. Item ergo sperma corruptum non ualet exire, & inde uapor plurimus malus natus, matricem eleuat ad superiora. Item prouenit ex retentione menstruorum, quæ cum matrice aggregantur, & non euacuantur, in uaporem resoluta idem operantur. Prouenit etiam ex quocunque humore in matrice præter naturam collecto. In cura uero istarum ægritudinum cautè procedendum est. Et primo contra præter naturalem retentionem mēstruorum, medicinæ efficaces et remissæ ponendæ sunt. Digestiuum subtiliatiuum, aperitiuum, incisuum mēstruorum et prouocatiuum: Recipe syrupi de bizantijs, oxymellis simplicis ana. ℥. s. syrupi de absinthio ℥. i. aquarum capil. uen. & matricariæ ana. ℥. i. misce. Ventris Solutiuum, aperitiuum, subtiliatiuum, mēstruorum prouocatiuum: Recipe Aloës succotrini electi ℥. i. myrrhæ ℥. s. croci, agarici ana. ℥. i. salis gemæ, zingiberis ana. gran. i. misce

1. misce, et cū syrupo de absinthio formētur pil. 7.
 pro. 3. Subtiliatuū apitiuū mēstruorū, matricis con
 fortatiuū: Recip. Diacori 3. 6. florū roris marini 3.
 1. misce ambo simul in cōserua diacori. Subtiliatuū
 aperitiuū ut supra: Recip. Granorū pini. 3. 1. cala
 mi aromatici, casia lignee ana. 3. s. cinnamomi 3. 1.
 sem. fœniculi, galliæ muscatæ ana. 3. s. ligni aloës 3.
 1. nigellæ 3. 1. musci gran. 8. sachari albi quod suffi
 cit, et cū aqua matricariæ fiat cōfectio ut supra. An
 lia cōfectio ad idē: Recip. Amygdal. amar. 3. 1. sem.
 anisi et bauciæ et carui ana. 3. s. iuniperi 3. 2. cinna
 momi 3. 1. s. sachari albi 3. 12. pistentur omnia sub
 tiliter, deinde cū aqua capil. uen. fiat cōfectio solida
 in morsellis da 3. 3. Digestiuū ut supra: Recip. Aqua
 rū hypericonis 3. s. fœniculi et capil. uen. ana. 3. 1.
 s. cinnamomi gran. 3. sachari albi 3. 2. misce. Pulu
 læ ad idē nō solutiue: Recip. Trochiscorū de cappa
 rib. 3. 1. specierū diarrhodon abbatis 3. s. diamusci
 dulcis 3. 1. absinthij 3. 2. cuscute 3. 1. sachari albi
 3. s. cum syrupo de absinthio formentur pilulæ. 7.
 pro. 3. Ventris lenituum: Recipe oleorum de been.
 3. 6. liliorum alborum 3. 7. absinthij 3. 2. amygda
 larum dulcium 3. 1. galliæ muscatæ 3. s. fiat clyste
 re, et tota quantitas est pro duabus uicibus. Puluis:
 Recipe Croci, spicæ, trochiscorū de myrrha, rubæ
 tinctor

tingtorum ana 3. i. misce & fiat puluis pro tribus uicibus, & detur cum brodio aut uino albo. Nota quod quàmprimùm menstrua effluunt debite, tunc non ulterius medelis ad hoc utatur domina patiens. Contra fluxum menstrualem, dentur trochisci de charabe, phlebotometur basilica, uentose apponantur sub māmellis, nutriatur stipticis, supponatur uulue hoc: Recipe baldustie, olibani, gallarum, antimoni, acatie, aluminis ana. fiat puluis & misce. Femur deorsum epithemetur ex stipticis. Si fuerit ex repletionē sanguinis, fiat phlebotomia Si ex cholera, fiat cholerae euacuatio, ligentur extrema ligatura, imò & coxæ apud inguina, uentose ponantur inter duas anchas. Nutriatur uitellis ouorum sorbiliun, aqua carnis ualde nutritiua, acetosis ex succo sumach, aqua acetosæ, potibus boni odoris, ex carne bona sorbitionibus humidis, & sumach & amylo, uino grosso, nouo & dulci. Euitet uinū antiquū, subtile, cibetur omni cibo uelocis digestionis confortantis, & arnoglossa est proprium bibita & iniecta, camphora bibita & supposita, lac decoctum cum ferro ignito in quo est scoria ferri, detur in potu cū stipticis omni die acetositas citri, est enim propriū. Contra fluxum sanguinis menstruorum post abortum, aut post partum naturalem accipiat sequētia:

Recipe

Recipe pilularū de bdellio ʒ. i. trochiscorū de terra sigillata ʒ. i. misce et cum syrupo myrtini quod sufficit, fiat pilulæ. 9. pro. 3. Itē: **Recip. Trochiscorū de charabe, de terra sigillata ana.** ʒ. i. misce, & cū syrupo myrtillorum quod sufficit fiant pilulæ ut supra. 1. starum pilularum assumat ʒ. i. in aurora. Contra retentionem secundinæ: **Recip. Ellebori albi** & cum eo prouocetur sternutatio. Item aliquotiens ipsa sternutante teneat os clausum & nares, & similiter ad coxam per collum eius. Item obstetrix immitat manum oleo sesamino inunctam, deinde prouocetur sternutatio, fiat sternutatio semper tēpore quo non descendit, stomacho ieiuno tā de die quā de nocte, cum tanta quantitate ellebori albi quod prouocet sternutationem trigesies aut amplius, & sufficit insufflando in nares, & ad hoc sufficit parua quantitas. Item supponatur stercoris accipitris ʒ. s. Suffumigetur cum stercore columbino, cum radice aristol. rot. detur in potu stercoris accipitris ʒ. i. Notare debes quod omnia prouocantia aborsum educunt secundinam, & omne genus gummi, omne genus salis, omnes medicinæ calidæ in quarto, quas omnes require. 2. 1. tertij, capite de prouocatione aborsus. Item suffumigetur per embotum cum hac de coctione: **Recip. Præßij, abrotani, ana.** M. i. olei de

Ff lilio

lilio ꝯ. 2. misce omnia simul. Contra præfocationē
 matricis suppositorium: Recipe galliæ muscatæ ꝯ.
 1. supponatur ad intra uulua, ligata prius in petia,
 uel sindone rara. Aliud ad idem: Recipe ligni aloës
 ꝯ 1. musci gran. 5. ambræ, gariophil. galliæ musca-
 tæ ana ꝯ 5. contundantur grosso modo & misce, sup-
 ponatur hoc medicamen in petia ut in alio. Suffumi-
 gū ad nares: Recipe Pēnas perdicis uel phasiani ꝯ
 sufficit, his ignitis suffumigentur nares. Item cum
 assa fœtida super carbones proiecta. Item cum co-
 rio ignito ueteri. Istæ suffumigationes fiant tempo-
 re paroxysmi præfocationis, aut quādo timetur sup-
 eius aduentu proximo, incipiēdo à leuiori. Ericetur
 os uulue cū digitis tinctis in oleo liliorū alborū. Cly-
 sterc: Recipe. Maluæ, florū chamæmilæ, meliloti, florū
 anethi ana. M. 1. uitellū oui. 1. olei liliorū alborū, o-
 lei spicæ ana. ꝯ. 3. salis cōmuniꝯ ꝯ. 1. isto clysteri uta-
 tur stomacho ieiuno & ante paroxysmū, quoniā ua-
 let præuisioni à præfocatione. Item contra uentosi-
 tatem, cōtra febrem, uorsum, & uomitū, & cōtra
 tumorem membrorū solutiūū facilimū: Recipe mā-
 næ ꝯ. 2. aquæ absinthij ꝯ. 1. brodiꝯ perdicis, pulli
 uel phasiani ꝯ sufficit misce, uel loco mannæ pone
 cassiā. Ad exitū matricis uel ani, suffumigatio facta
 ex corio anguillæ salitæ ualet. Et ad idē ualet suffu-
 migatio facta ex limatura plūbi.

De

De ægritudinibus iuncturarum.

Cap. IIII.

Quemadmodum Græci & Latini tradunt.

Græci dicunt arthreticam, quem nos morbum articulare, quod αῖμα ποὺ Græci articulum uocant. Est autem morbus qui articulos infestat, nec idem est morbus articularis, et in Græco chiragra et podagra, quod luculentissime ostendit nobis Plinius naturalis historiæ lib. 26. capite, 11. dicens. Podagræ morbus rarior solebat esse, non modo patrum auorumq; memoria, unde etiam nostrâ, peregrinus & ipse. Nam si in Italia fuisset, antiquitas Latinum nomen inuenisset, cum ergo Latinum nomen non habeat, non potest esse articularis, cum etiâ hic arthreticus dicatur. Recentiores semper arthreticâ uocant, quo Serenus sic: Si uero articulos tabes inimica perhaeserit, ex ficu betas ac melle ligabis. Ennius ipse pater dum pocula siccat iniqua. Hoc uitio tales fertur meruisse dolores. Podagra pedum est dolor, ποὺς id est pes, et αἷμα atrocitas uel infirmitas. Ouid. Soluere nodosam nescit medicina podagrâ, uel ποδᾶς, id est pedes, αἷμα, id est caput. Chiragra manuum dolor est, χεὶρ enim manus est, et αἷμα dolor. Et sciatici di-

Ff 2

cuntur

cuntur, quibus in coxendice seu in coxæ uertebra,
quæ scia dicitur, dolor inest, & propterea claudi
cant. Podagra raro castratos uel pueros ante foemi
næ coitum, uel mulieres nisi quib mensura suppres
sa sunt tentant, ubi sentiri coeperunt (ut Celso pla
cet) sanguis mittendus est. Id enim inter initia sta
tim factum sæpe annuam, nonnunquam perpetuam
ualetudinem præstat. Quidam etiam cum asinino
lacte epoto se eluissent, in perpetuū hoc malum e
uascerunt. Quidam cum toto anno à uino mulso, ue
nere si temperassent, securitatem totius uitæ conse
cuti sunt, idq; utiq; post primum dolorem seruandū
est, etiam si quieuit. Coxarum morbus de genere ar
ticulari est, nisi quod insedit coxæ eius causa est mul
tus & pituitosus humor in coxa concretus. Dolor
autem languentibus est ab uertebra loco, & ingui
ne ad genu usq; in pluribus autem ad pedem usque
transit. Non sola podagricum omnemq; morbum ar
ticularem efficit imbecillitas membrorum, sed etiā
humorum contra naturam redundans multiplicatio.
Nam cum membrorum nutriendi uis subuulsa
fractaq; est ciborum affluentia, inde concoctiones
non sunt, redundatq; humor in articulos quosuis, ut
crura & pedes, manusq; neruorumq; nexus reuin
ciens dolorem suscitatur, mediaq; articulorum occu
pat

pat loca, crura media, uel coxas, uel cubitū, uel brachium. Cum autem pedes occuparit perturbans humor, podagra morbus appellatur. At cum in omnes corporis transierit artus causa, iam articularis languor dici consuevit, quo uertebrae spinæ, & scapulae, & coxendices, et omnis artus morbo subiicitur, quibusdam aures quoq; & dentes & guttur, et quādoq; iecur & lien articulari dolore oblanguet, quibus nisi celeriter succuratur, confestim imminet exitium. Redundans itaq; & affluens humor aliquando biliosus, aliquando sanguineus, aliquando melancholicus, frequenter autem pituitosus ac crudus est, ex ciborum redundantia, & incoctionibus, & ocio conflatur. In articulis nanq; inueterascens desecit, & glutinescit. Est & quandoque mixtus, ex pluribusq; constat, tum non facile dinoscitur, curaturq; difficilius aut prorsus incurabilis ægrotudo. Principium morbi frequenter labor immensus, & ualidae deambulationes excipiunt, iugisq; equitatio, ueneris intempestius usus, insuetaq; frigida potatio frigidorum, aut multarum aut noxiarum escarū usus, aut uinum multum & austerum. Principales autem causæ quæ suscitant, sunt anxietates & exitiales curæ, & uigiliæ, & reliquæ animi ægrotudines, quæ non modo admovent, sed etiam malum humorem

Ff 3 gignunt.

gignūt. Varia nimirū huius lāguoris est causa. inde humorum differentiae multifariae, biliosus igitur fluxus coloris luentis, & rufi, & calorem ingerit, acutioresq; efficit dolorem, & propter ædicitur in cutem absq; ingenti tumore, impositis calidis rebus ex acuitur, ut refrigeratibus remittitur is lāguor. Plus alijs aduenit præcipue biliosis, & in febribus frequenter aduenit in ipsis paroxysmorum accessibus, cum sitibundi sunt. Atrum uero colorem in melancholicis uideas. Album uero & aquosum in pituitosis, tardioresq; dolorem, ut turgescat, ut sanguineus color est, quibus sanguis humor redūdarit, uictum in cunctis suum esse expedit. Unguentum ad podagrā: Fabæ solidæ, lupinorum ana ℥. 4. tere simul & misce adipis suilli lib. imponitoq; ad calidā frigidum, & ad frigidā calidum. Item stercus ciconæ cum adipe porcino mixtum, podagram curat. Item acatia cum aceto inducta. Iterum raphaninum oleum cum nitro & sale mixtum & inductum curat. Itidem hyoscyami folia tenera cum axūgia et myrrha, aut cum albugine oui, nec nō sel taurinum cum aloë, mirum creditur. Stercus quoq; pavonis in aceto acerrimo dilutum, calefactum podagræ impositum, sedare mirifice creditur. Cum senseris pedes à podagra inflammari, cape allium conterere &

re & illine, ad diem permitte, ne soluas.

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.

Passio sciatica nascitur ex humoribus in neruum illum grossum descendantibus, qui scia uocatur, hæc inter lacertos est coxæ. Fit autem plurimum ex humoribus phlegmaticis & uiscosis in concauitate coxæ se adunantibus, aliquando ex humoribus sanguineis cū cholera rubea mixtis & ibidem collectis, unde patiuntur dolorem in coxis, aliquando descendit dolor usque ad crura & calcaneum, & usque ad paruum pedis digitum, aliquando est in una parte, aliquando in utraque. Si autem sit in sinistro, peior & molestior est quàm in dextra. Si ex humoribus sanguinolentis & cholemicis, sequitur nimietas doloris et cōtinuatio pulsationis, et ardor et incensio, quod maxime contingit iuuenibus. Si ex calidis certificetur esse humoribus, uena minuatur quæ saphena uocatur de calcaneo. Si passio sit in utraq; parte, phlebotomentur utraq; uenæ. Gal. dixit, tantū ualet hæc phlebotomia ut una die infirmus euadat, aliquando etiā uena in medio brachio est phlebotomāda de parte infirma, et maxime in initio hoc fiat, si nos adiuuerint tēpus, ætas, con-

Ff 4 suetudo

suetudo & regio, postea danda est pharmacia quæ
choleram rub. purgat, similiter clystere faciamus,
nutriamus cum diæta caloris extinctiua, sæpe balne
entur in aqua dulci, demus pilulas de mastiche &
aloë. Vngamus epithematibus frigidis. Podagra est
dolor calcanei, & plantæ pedis cum distensione
nerui & pulsatione sui, nascens ex malis humori-
bus ad calcaneum descendentibus. Qui si calidi
sint & acuti, dolor nimius erit, & pulsatio cōtinua
incidens calcaneum, si sint frigidi & grossi, fit gra-
uitas nimia, & extensio, & sine dolore acuto et pul-
satione, non est tumor. Apostemata autem podagri-
cæ & artheticæ passionis non sunt tumentia, quia
tumor in solis membris carnosus nascitur, & multū
sanguinis habentibus, horum membrorum humidi-
tas uiscosa & frigida est nutrimentum, etiam quia
sunt carne nuda non sunt tumentia. Plurimum na-
scitur hæc passio suauiter & quiete uiuentibus, &
exercitia negligentibus, uel purgationes & mundi-
ficationes corporis nolentibus, maximè cum multū
comedant atq; bibant. Hæ enim res in corpore cre-
ant humores. Si autem materia seu natura pedes in-
uenerit debiles, descendunt ad eos humores, mem-
bra uero cum sint debilia non possunt eos expelle-
re ex defectione sua, unde hæc passio uenit maximè
princi-

principibus & suauiter uiuentibus, & corpora hu-
mida habentibus, maxime si multo coitu utuntur, et
cibis nimis impleantur. Concatenatio membrorum
calescit cum motus ad coitum fit, & calor humo-
res sibi attrahit. Item assuefactione coitus, nerui la-
xantur & rumpuntur, plantæ pedum & calcaneū,
membra neruosa esse uidentur, unde fit ut quia non
coeunt eunuchi non patiuntur hunc morbum, & si
habuerint tamen raro, quod fit eis ex multitudine
humorum propter inordinationē diætæ. Sicut etiā
pueri nō fiunt podagrici, nisi ex inordinatione diæ-
tæ & ciborum multitudine. Mulieres uero non fiūt
podagricæ, quia non laborant in coitu sicut mascu-
li, & omni mense purgantur menstruis. Quicquid
diximus de podagricis, illud intelligendum est de
artheticis. Gal. Podagra, inquit, est passio incipiēs
in Vere, & in Aestate, sanatur in .40. diebus uel an-
tea. Si in Autūno & usq; ad Hyemem durauerit, du-
rum est eam curari, & quando oportet nos eam cu-
rare phlebotomemus eos, si multum sanguinem ha-
buerint, & maxime super manum si in eis sangui-
nis abundantia uel cholera sit causa. Quod si humo-
res sint phlegmatici, pharmacia phlegmatis purga-
tiua sunt purgādi, sicut pilulis de tapsia, uel hermo-
dactylis ut sunt istæ: Recip. Hermodactyl. myrobala

Ff 5

norum

lanorū citrinorū ana. 3. 3. turbith 3. 1. s. aloës 3. 6.
 tēpera cū succo porri. Alia: Recip. Myrobal. citrin.
 belliricorū, emblicorum, zingiberis ana. 3. 6. origa
 ni 3. 11. tapsiæ 3. 3. hermodact 3. 33. bdellij 3. 21.
 tempera cū succo solani fac pilulas. Dioscorides di
 xit: Opiū & crocū parū cū lacte temperatum, miti
 gant dolorē calidæ podagræ apostematū. Frigidis
 podagricis ualeat scordeō cum aceto temperatum,
 uuæ passæ mundatæ, & ruta insimul pistata & com
 mixta ualent, axūgia uulturis cū stercore pecudū.
 Auicenna: Cum causa est in eis materia, tūc oportet
 ut prohibeatur quod efficitur per attractionem ad
 contrarium, & per minorationem, & confortetur
 membrū ut nō suscipiat, et resoluatur quod inuectū
 est ut priuetur, & redi in omnibus illis ad canones
 uniuersales. Et facta diuersione cū phlebotomia in
 sanguinea, administra uomitū, & propriè quando
 dolor est in inferioribus, uomitus enim magis iuuat
 tius quā uentris solutio, deinde administra solu
 tiuum uentris. Et incipe à re forti si non prohibet
 priuatio maturitatis, & grossitudo materie, quā
 uis facilis sit incolumior & gradatio cōuenientior,
 deinde sequetur cū solutiuis mūdificantib. secundū
 gradationē. Et rectius est in hoc, si materia est cho
 lericā, subtilis, festinare euacuationē cū uidetur ma
 tura

turatio, & si est grossa non est malum præmittere, quod etiã subtiliet & maturet. Et si materia fuerit cõposita, fac ut solutiũ et emplastrũ sint cõposita, licet tamẽ melius sit ut blãde tractetur in principio et nõ fiat phlebotomia, facit enim phlebotomia ac crescere humores, et facit eos currere in corpus, et nõ extrahit illud quod necesse est ut abstrahatur. Epithemata uero calida et narcotica omnia sunt nociua, calida quidem propter attractionẽ, sed narcotica propter cõgelationem et cruditatẽ. Et iterũ epithemata infrigidãtia grossum faciũt crudum, & mortificãt subtile, et prolõgant ægritudinem. Et aqua calida nociua est eis, quoniam humectat iuncturas. Et semina fortia, sicut semen foeniculi quandoq; adurũt superfluitatem, & conuertunt eam in lapideitatẽ. Et caue ne in potu des in primis nisi in medicinam debilem, quoniam ipsa mouet materiam, & non facit currere aliquid de quo sit curandum, imò subtiliat fortasse materias congelatas alias, & facit eas currere ad membra. Et facta euacuatione administra prouocationem. Nam prouocatio desiccatur materiam doloris iuncturarum, & propriẽ in podagra calida. Et plures habentium dolores iuncturarum & complexionones humidas, non uiuantur cum solutione plurima, facta prouocatione

tatione & clysteri, & cum medicantur diureticis
 sanantur, extenuati uero non tolerant solutionem
 & prouocationem plurimam. Et repercussio mate-
 rie à membro, non oportet ut fiat materia existen-
 te fortis effusionis & plurimæ resumptionis, id est,
 quantitatis, quoniam illud facit duas res malas, qua-
 rum una est quod facit inobedientem materiã, qua-
 re accidit dolor magnus, & secunda est quoniã for-
 tasse conuertetur ad membra principalia, quare ac-
 cidit timor. Et cum materia non est plurima, aut
 non est magnæ effusionis, tunc non est malum re-
 pellere eam in primis, nisi in sciatica, nam repercus-
 sio in ea retinet materiam in profundo. Et nõ opor-
 tet ut approximentur ei resolutiua fortia in princi-
 pio rei ante euacuationem, quoniam facit euenire
 materias plurimas, deinde resoluet subtile earum,
 & inspissat residuum, & retinebunt ipsum. Cum i-
 gitur fortes sunt dolores, & non tolerantur, nõ est
 excusatio quin tribuantur sedantia dolores ebibita
 et linita. Et non administres stupefaciẽtia, nisi apud
 necessitatem, & mensura illud quod sedat dolorem
 & summam maliciam doloris, & utere eis cum au-
 dacia & temeritate plus. Et scias quod rectius est
 quod permutatio fiat cum medicinis, quãdoq; enim
 est medicina conferens uni membro & non alij, &
 quana

quandoq; confert in hora, deinde nocet, & mouet
dolorem. Et dimittant uinum omnino, consuetus ta-
men secundum gradationem, et utatur cum ipsum
dimittit diureticis, & syrupus de diureticis cōfert
eis. Et oportet ut deuitetur caro in eo quod frigidū
est de hac ægritudine, quod si necessaria fuerit, tūc
detur caro auis montanæ, leporis, gazeli, & omnis
caro paucarum superfluitatum. Et in hermodactylis
quidem creditur causa plurimi iuuamenti, uerū
sunt nociui stomacho, quare oportet ut misceantur
cum eis quæ sunt sicut piper & zingiber & cimi-
nūm. Et emplastratio cum stercore uaccino, est for-
tis ualde in doloribus iuncturarum & dorsi, & ie-
iunium maxime prodest. Rasis: Dolores iuncturariū
& maxime in podagra plurimum fiunt ex humo-
re crudo, cui permixtum est aliquid cholerae, & se-
cundum minus ex sanguine indigesto, & quandoq;
est cum eis caliditas uehemens, & non nominatur
podagra, nisi quia est in iuncturis pedum, quib. pro-
prium est quod apostema eorum non fit saniosum,
& non facit collectionem sanici, sicut reliqua apo-
stemata. Sed aut resoluitur, aut ingrossatur, & fit
lapis, & rumpuntur ex eo digiti, & egrediūtur ex
eis res diuersæ ex sicco & humido. Et signa dolo-
ris iuncturarum ex caliditate, sunt rubedo coloris,
loci,

loci, & caliditas tactus. Cura eius est phlebotomia ex sinistra manu si in dextro, & econuerso. Et si est in pede sinistro, ex manu dextra. Et si est in dextro ex manu sinistra, & nō oportet ut dimittatur phlebotomia in hac ægritudine, propter propinquitatem temporis phlebotomiæ. Sed oportet ut fiat cū incipit apostema, & dolor, & pulsatio cum caliditate in iuncturis, & præcipue si est apostema quantitatis magnæ & rubei coloris. Si non est magnæ quantitatis, sed est parua caliditas extrahatur sanguis minus. Serapio: Et materia ex qua fiunt istæ ægritudines, fortasse est ex caliditate aut sanguinea, aut cholericæ. Et fortasse est ex frigidityte, sicut humor crudus qui non digeritur quando aggregatur in iuncturis, & iste in essentia sua est similis saniem grossæ, & cum moratur in iuncturis tempore longo non solum ingrossatur, sed acquirit uiscositatem multam siccam. Et fortasse est causa huius ægritudinis humor melancholicus. Iuncturæ autem quas consequitur ægritudo secundum plurimum, non redit aliqua earum ad formam suam naturalem, & plurimum accidit hoc in sciatica, & duabus anchis, & podagra. Dolores autem iuncturarum reliquarum fortasse resoluantur resolutione completa, & proprie quando sunt ex superfluitate sanguinea, nā quamuis

quamuis redeant iuncturae ancharū, aut pedū in egritudine sciatica, & podagra in hora ad dispositiones suas naturales, tamen egritudo redit ex quibuslibet causis, propter præparationem illorū iuncturarum, ad recipiendum materiam uelociter.

Neotericorum de articulari morbo sententia.

Gutta passio est ex rheumatismis proueniens ad iuncturas, & habet tres species, chiram, sciaticam, & podagram. Gutta autem & arthetica apud recentiores medicos ita differunt. Arthetica iuncturarum est dolor cum tumore uel sine, à mala complexione, humore seu uentositate in ipsarum existente cōcatenatione, causatus. Membrū enim neruis seu ligamentis artatum artus dicitur, à quo arthetica nomen accepit. Gutta uero pro cuiuscunq; interdū humoris stillicidio ad quāuis nostri corporis partem defluentis accipitur, qualiter uulgares humiditatem quālibet tam ad pedus quā indifferenter ad quoduis membrū aliud defluentem, guttā uocant. Alio modo capitur gutta prout est iunctura: um dolor ab humore, in ipsarum concatenatione à membris alijs defluente causatus. Quemadmodum enim membra ad se inuicem escātrahunt, ita ad se inuicem superfluitates deponunt, ut Galenus

ut Galenus in de uirtutibus naturalibus. Sciatica uero denominatur à scia, id est, ab illo osse concauo in quo uertebrium uertitur in anchis ab utraq; parte, & generatur ab humore rheumatizante ad illam iuncturam, & imbibente ligamentum per quod illa duo ossa continuantur. Hoc ergo reuma siue descensus humoris ad istam iuncturam multis modis causatur, quia tot modis quot generantur apostemata & pluribus. Generatur ergo sciatica passio ex superfluitate humorum, & debilitate iuncturae suscipientis, quae debilitas quandoq; est à prima creatione, & quandoq; ab alio euentu, casu, percussione. Item causatur à largitate uenarum aut uiarum, & quandoq; per raritatem iuncturae, & capacitatem, quandoq; propter superfluam attractionem ibi factam, à calido acquisito per motum & fricationem, & iterum quia iuncturae ceteris membris sunt subiectae, membra enim supposita subiectis membris superfluitates frequenter expellunt, fit etiam quandoq; dolor in iunctura, unde plurimum fit attractio. Rumpitur etiam quandoq; ligamentum, sed tunc non est curabile, & aliquando laxatur & lubricat, unde resilit uertebrium à scia, & bene curatur. Causae istae sunt antecedentes corporales. Causae autem primitivae plures sunt, sicut nimia satietas, & paucitas,

ēitas, uel malicia digestiōis, & lōga trāquillitas, &
ociositas assidua, & coitus immoderatus, ebrietas,
& crapula, et cōsuetarum euacuationū dimissio, &
hæmorrhoidarum cōsuetarum retentio, omnia ista
caliditatē diminuūt innatā, sicut ligna plurima par-
uum ignē, unde sequitur superfluitatū aggregatio,
& maximè frigida cōplexione iuuante istas causas.
Causa etiam guttarum primitiua, est motus post ci-
bum, uel comestio in balneo, & potus etiam uini
puri ante cibum maximè generat guttas, quia illi-
us natura est penetrare ad totum antequam etiam
digeratur, si uias reperiāt apertas. Item impuritas
spermatis & sanguinis has accelerat passiones,
unde nominantur hæreditariæ à patribus, uel ab-
auis, sicut lepra. Labor iterum immoderatus, &
euacuationes attrahētes humores ad inferiora, cau-
sæ sunt guttarū, natura enim superflua expellit ad
uiam illam, ad quā consueuerunt declinare. Item
sunt istæ passiones per solam & simplicem quali-
tatem absq; humoris uitio, sicut dicit Alexāder, ut
per malam complexionem calidam, frigidam, sic-
cam & humidam. Sed hæc per alterantia de facili
curatur. Causæ cōiunctæ humorales aliquādo sunt
sanguineæ, aliquando phlegmaticæ, aliquando cho-
lericæ, aliquando melancholicæ, aliquando ex duā

Gg būs

bus, aliquando ex pluribus fit compositio. Sic ergo descripsimus causas primitiuas antecedentes & cōiunctas, quia coniuncta appellatur humor replens. In iuncturalibus membris diuersæ nascūtur passiōnes sicut sciatica, arthetica, apostema, spasmus, chiragra, podagra. Apostema uero fit de materia coarctata in membro carnosio. Dolor enim fit ex humiditate, uel uentositate in uno loco coarctata ad apostema. Spasmus fit ex neruorum repletionē cōtrahente membrum, & abbreviante. Sciatica uero, chiragra, podagra, quæ tria generali nomine appellantur gutta, magis fiunt ex humiditate replete ligamētum ipsum. Arthetica est dolor & tumor qui in concatenatione, aut cōcauitate membrorum est descendens, aliquādo à scia usq; ad genu, uel ad calcaneum, uel ad omnes digitos pedum. Arthetica igitur fit ex humore eodem, ut gutta ad exteriora se extendente. Vnde fit cum tumore, ut habetur ab Isaac in Pantegni. In scia uero, uel podagra non est tumor, sicut dicit Galenus super illum Aphorism. Podagricæ egritudines in 40. diebus &c. Vnde aliquando primo fit podagricus, & post artheticus cum à ligamento humiditas spargatur, cum ergo podagrici fiant, & post arthetici, non tamen impedit, quin aliquando fiat e conuerso, ut primo
fiat

fiat dolor & tumor in iunctura, & postea materia
in ligamentum profundatur, & fiat podagra. Et
quæ est comparatio podagræ ad arthriticam eadem
potest esse sciaticæ & chiragræ ad podagrâ. Idem
enim regimen esse debet chiragræ & arthriticæ. Et
licet uideatur esse eadem cura sciæ & podagræ.
Hæc in summa pauca repetamus. Dico igitur, quod
cura podagræ est per digestiua, & per laxatiua
suauiter, & per resoluentia eius quod est in iunctu-
ra imbibitum, & per completam mūdificationem,
& per confortantia iuncturas, & similiter loca ui-
cina ne recipiant amplius rheumatismū, qualia sunt
frigida & sicca, uel frigida cum pauca humidita-
te, ut si cholera acuta sit in causa. Et scias quod ul-
timo loco ad confortandum membrum mortifica-
tum, potest uti talibus mūdificatiuis cum excellen-
tijs. In principijs cōfortationibus talibus est uten-
dum aliquando, ut quando humor est in fluxu, uel
quando acutissimus est dolor, & ad dolorem mitia-
gandum, sed sic non debent esse fortia, sed quana-
tumcunque potest debilia, ne humor indigestus
induretur. Et huiusmodi patientes in abstinen-
tia uiuere debent, & uti paucis cibis & digesti-
bilibus in frigida causa. In causa uero calida
grossiori possunt uti diæta, sicut carne bouina,

Et uentribus arietum, ut uult Alexāder, quia ex his humor generatus, cum sit grossus non penetrat ad iuncturam, Et choleram uincens, non cōuertit diætā grossā in cholera adurendo, unde sic causa antecedens, uel cōiuncta non generatur. Isti tamen patientes de cholera, nunquā debēt uti uino, quod si pati non possunt, in hyeme parum bibant uinum cum aqua plurima, in uere uel æstate nullo modo. In frigida uero causa parū prodest uinum, quia subtilitate sua cito penetrat, deportans secum humores, minus tamen lædit quā si esset de materia calida. Item tales acetosa semper fugiāt, quia eorum est proprietas percutere neruos, Et iūcturas penetrare. Canones uniuersales contra sciaticā. Primus: Educātur materiæ superflue in uis ductuum. Secundus: Minoratiue soluantur materiæ propriæ doloris sciaticæ antecedentes, Et transituræ in cōiunctas. Tertius: Diuertantur materiæ antecedentes à membro, uel membris mandantibus ad sciaticā. Quartus: Digerantur paulatinè materiæ antecedentes Et cōiunctæ sciaticæ. Quintus: Eradicentur paulatinè dictæ materiæ. Sextus: Prouocentur per urinam dictæ materiæ. Septimus: Educantur euaporatiue, seu per cutis porositates dictæ materiæ. Octauus: Confortentur uirtutes membrorum

rum mittentium ad sciaticam, ne de nouo generent humores superfluos. Nonus: Confortentur ambæ sciaticæ, ne humores superfluos recipiāt. Enema reducens materias superfluas cōmunes in uis ductuum: Recip. Foliorum bliti, maluarū ana M. 1. mercurialis M. 1. s. florum chamæmilæ, meliloti, anethi ana M. 1. seminum fœnugræci, lini, cartami ana unc. s. uitellum oui 1. cassiæ fistulæ, unc. 1. benedictæ simplicis, sacchari rosati ana unc. s. olei liliorū alborum unc. 4. chamæmilæ unc. 2. salis communis 3. 2. herbæ, flores, semina bulliant simul in sufficienti quantitate aquæ pro enemate, usq; ad consumptionem tertiæ partis aquæ, deinde optimè exprimantur & colentur, ultimo de duobus cyathis dictæ colaturæ, reliqua omnia addantur & fiat clystere. Isto utatur bis in hebdomada stomacho ieiuno, & plus, & minus secundum necessitatem. Minoratiua materias proprias doloris sciatici antecedentes, & transituras in antecedentes. Fiat phlebotomia basilicæ ex manu lateris oppositi sciaticæ ægrote, ex qua extrahantur unc. 4. sanguinis usq; ad 6. & plus, & minus secundum uniuersalem repletionem, & particularem sanguinis, aut phlegmatis mixti cum eo. Ista fiant mane hora tertiarum stomacho ieiuno, facto enemate in die præcedenti

Gg 3 dictam

dictam phlebotomiā, & eodem mane prius habito
uentris beneficio, & non iteretur nisi incumbente
necessitate. Solutium minoratiuum materiā pro
prias: Recip. Cassiæ fistulæ, rheubarbari ʒ.
2. aquæ saluæ unc. 1. seri caprini unc. 2. istud assu=
mat in aurora, quarta uel quinta die post phlebo=
tomiam cum modis & ordinibus. Minorantur ma=
teriæ, propriè antecedens & coniuncta cum absti=
nencia, & exercitio secundum proportionem ipsa=
rum ad uirtutem, in omnem tamen euētum ieiunet
semel in hebdomada, in quo comedat oua, non pi=
sces, nec caseum. Solutium aliud: Recip. Foliorum
sene ʒ. 1. myrobalanorū citrinorū, & chebulorum
ana ʒ. 2. cum syrupo de absinthio ʒ. 1. aquæ iuni=
peri quod sufficit, misce & fiat potio. Si uero uolue=
rit infusionem solum quadruplicet sene, & tripli=
cet, aut duplicet myrobalanos. Diuertatur materia
cum uomitu, & fricentur brachia. Digerentia
paulatinè materias antecedentes & coniunctas:
Recip. Syrupi de eupatorio unc. 1. mellis rosati co=
lati unc. 5. pulueris aristolochiæ rotundæ ʒ. 5. aquæ
saluæ unc. 2. iuniperi unc. 1. istum syrupum debite
calidum assumat, & non tepidum in aurora, & ad
minus per nouem horas post cœnam, & post stet
ieiunus horis quatuor =uacuantia materias dictas
eradi.

eradicatiue paulatinè: Recip. Pilularum iuuamen-
ti secundum Auicennam de lapide armen. agarici
ana ʒ. i. & cum electuario indo, fiant pilule &c.

Aliud: Recip. Pilularum de hermodactyl. ʒ. 2.
foetidarum ʒ. i. misce, & cum electuario indo for-
mentur pilule. Aliud: Recip. Cimini, armeni, zingi-
beris ana grana 3. hermodactylorum ʒ. s. aloës ʒ.
2. misce, & cum succo anethi formentur pilule. Cō-
pletis duabus euacuationibus ordinarijs ex mino-
ratiuis & digestiuis, tūc per sex dies, post fiat phle-
botomia, & extrahatur ex sciatica ʒ. 3. sanguinis.
Phlebotomia tamē saphenæ fiat, si dolor est in par-
te syluestri sciaticæ, ex qua extrahatur sanguis ut
ante. Si suprascriptæ phlebotomiæ non iuuent, fiet
conuenienter tunc phlebotomia poplitis, & est me-
lior suprascriptis, siue dolor sit in parte domesti-
ca, siue syluestri sciaticæ per quā extrahantur
uncia tres sanguinis. Et hæc fiat per sex dies post
præcedentem phlebotomiam, secundum tamen te-
norem uirtutis. Euacuantia prouocantia mate-
riam antecedentem: Recip. Radicum fœniculi pe-
troselin. ana M. s. brusci, asparagi ana Manipulum
i. cicerum rub. unc. 3. misce, & tulliant in suffi-
cienti quantitate aquæ ad semidecoctionem, deinde
colètur & decoctiōe utatur cum modico sacchari.

Gg 4 Educem

Educentia materiam coniunctam à concavitate sciaticæ cum euaporantibus: Recip. Sauinæ, rutæ, ana M. 1. radicum utriusque aristolochiæ ana M. s. hyssopi siccæ M. 2. calamenti M. 1. sulphuris uiui drachmas tres, aquæ cisternæ quod sufficit, misce & bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis.

Rubificatiuum eductiuum materiæ coniunctæ à concavitate sciaticæ: Recip. Emplastri de sinapi Mesue quod sufficit ad rubificandum locum ubi est dolor fixus, pinguedinis gallinæ drachmam 1. s. radice althææ drach. 2. misce. Ceratum: Recip. Picis naualis unc. 2. sulphuris unc. s. olei, spicæ quod sufficit ad conficiendum ceratum, misce. Rubificatiuum & eductiuum ad idem: Recip. Seminis rutæ syluestris, baccarum lauri ana drachmam 1. pulpæ colocinthidis drach. s. ameos, calamenti sicci ana M. s. opopanacis, armoniaci ana drach. 2. nitri drachmam 1. s. sulphuris drach. s. picis naualis drachmam unam, olei de costo ad impingendum quod sufficit, misce pro emplastro. Euaporatiuum & est ceratum: Recip. Opopanacis drachmas 3. hyssopi siccæ M. 2. radicum aristolochiæ rotundæ unc. s. calamenti M. 1. picis naualis unc. s. olei costini quod sufficit, misce & fiat ceratum. Contra guttas & dolores earum: Recip.

Myroe

Myrobalanorum chebulorū unc. 2. s. turbith drachmam unam, zingiberis scrup. 2. seminis petroselinī drachmas 2. ameos domestici drachmas 2. s. sacchari albi ad pondus omnium puluerizentur & capiatur pro uice drachmas 4. in aurora cum uino bono calido, & facit asellare ter uel quater suauiter, & est medicina secura, nec est custodia nisi quod coena ante assumptionem sit per octo horas, ut melius operetur medicina. Contra nodositatem iuncturarum manus, & aliquantulum stuporem: Recip. Muscilaginum seminum lini, fœnugræci, muscilaginū althæe ana unc. s. pinguedinis gallinæ unc. 1. tragachanti, gummi arabici ana drachmam 1. pulparū sebesten unc. 1. pulueris calamenti unc. s. olei liliorum alborum unc. 1. terebinthinæ unc. 2. ceræ quod sufficit pro cerato, misce & fiat ceratum. Istud ceratum partibus manuum læsis apponatur, & debite ligetur, et taliter tribus diebus teneatur, deinde soluatur, & postea reiteretur applicando taliter secundum necessitatem. Si uero uult unctionem, tunc minoretur quantitas ceræ in hoc medicamine, & totum hoc redigatur in formam unguenti & ungantur loca manuum læsa stomacho ieiuno, uidelicet, per unam horam ante prandium, & ante coenam tantundem, etiam quando

Gg 5 nadit

uadit dormitum, & eo taliter utatur ad libitum
frigido & recenti, & est singularissimum.

Libri quinti Simph. Champ. De morbis
particularibus, finis.

DE AEGRI

TVDINIBVS CUTIS PER
modum supplementi, libro
præcedenti quinto
adiectum.



IMPETIGO est, quæ uulgo
uolatica dicitur, secundum alios
foedatio cutis serpens cum pru-
tu, secundum alios sicca & aspera
scabies, & prominens. Alij dffi-
niunt morbum similem scabiei squamosum corpus-
quæ dehonestantem. Cassius uero Foelix ita dicit:
Impetiginem Græci λειχήνας dicunt, Latini zer-
nas. Nascuntur ex melancholico humore rotundo,
sichemate

sichemate in superficie cutis cum ingenti pruritu, dicitur & serpiginem dici, cum serpere cœperit, & dicitur impetigo ab impetu. Vnde Samonicus: Si uero uitium est quod ducit ab impetu nomen. Hoc matutina poteris cohibere salua. Ab impetigine uenit impetiginosus, quo nomine utitur Vlpianus ff. de edi. edictorum l. Pomponius dicens. Trebatius ait: Impetiginosum morborum non esse neque uitiosum, si eo membro ubi impetigo esset, æquè ac rectè utatur.

Lepra & Psora Germani (ut uolunt) sunt morbi, ideo à Paulo Aegineta simul describuntur in hanc sententiam: Lepra & psora sunt in superficie cutis asperitates cum pruritu, & resolutione ex melancholico humore ortum habentes. Sed lepra quidem cutem profundius depascitur in orbem procedens, atque in ea quædam ueluti squamulæ resoluuntur. Psora uero magis in summo consistit, uarijsquæ modis figuratur, & furfuracea corpora abijcit. Lepra igitur apud Paulum Aeginetam, est impetigo excorticatiua. Apud Auicennam: Sicuti impetigo non excorticata, apud eundem est lichen, apud Græcos elephantia, uel elephantiasis, teste Paulq Aegineta, est cancer totum corpus occupans. Lepra, ut inquit Galenus, passio

passio solius cutis est, sed in elephātiāsi non modo cutis, sed carnes etiam atq; ossa, ut Celsus quoq; testatur, plerunq; uitiantur, illud autem admoendū, aliud morbi genus significari uerbo elephātiāsis in libris Arabum, aliud in libris Græcorū. Rasis quidem atq; Auicēna elephātiāsim accipiunt pro morbo, in quo pedes & crura super modū intumescūt. Galenus & Paulus Aegineta, omnesq; Græci antores morbum uolunt, quem Auicenna & medici iuniores lepram appellant. Elephantiasī autē, qui laborāt (ut inquit Galenus) carnem habēt nigram & tuberibus plenam, qualis est cutis elephātum, non nulli dictā existimāt ob morbi magnitudinē, q̄ nulli ferē remedio succumbit. Et Plinius differētiā inter lepram & elephātiā uidetur uelle, dum dicit lib. 28. cap. 9. Serum lactis quod schistum appellare, datur comitialibus, melācholicis, paralyticis, in lepris elephantijs, articularibus morbis. Et idem lib. 26. cap. 1. Diximus elephātiāsim ante Pompei Magni ætatem non accidisse in Italia, & ipsam à facie sæpius incipientē in nare, prima ueluti lēticula, mox inualescēte per totum corpus, maculosa uarijs coloribus &c. Inde leprosi elephantiāsi & elephantiōsi, quibus omnibus utitur, Firmicus Maternus non semel.

Vitiligo

Vitiligo totius corporis est uitium. Nam vitiliginem faciunt diuersi coloris maculae per omnia membra dispersae. Et dicitur vitiligo à uitio, uel à uitulo, propter eius membranæ candorem qua nascitur inuolutus. Iosephus libro septimo Iudaici belli: Nec enim leprosis siue vitiliginosis, & semē fluentibus, quos Gonoticos uocant, neque mulieribus menstruo cruore pollutis, neq; alijs inquinatis participare sacrificia permittebantur. Isto Iosephus siue interpreter Rufinus uidetur non multum distinguere vitiliginosum, hoc est, vitilagine infectum à leproso. At perperam legitur gonoticos apud eundem, gonorrhœos enim dicendum fuerat. Sunt enim gonorrhœi semine & genitura fluentes. Γονή enim semen humanum, & genitura dicitur, & ῥέω, id est, fluo. Alij etiam perperam gonorrhœos legunt.

Porrigo est, ubi inter pilos quædam quasi squamulae surgunt, hæc quoque à cute resoluuntur, & interdum madent, multo sæpius siccae sunt, id evenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco, huic quoque modo malo odore, modo nullo antecedente, ferèque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Et dicitur porrigo, porriginis, penultima producta à porrigendo, id est extendendo, crescendo enim extenditur, & inde porri-

porriginosus, qui porrigine infestatur.

Parotides sunt apostemata secus aures, *ωτὸς* *παρὰ* enim ad significat, *ωτὸς* aures dicuntur. Parodontides siue paruludes sunt tubercula iuxta gingiuas cum caro in gingiua excreuit.

Lentigo est macula subruffa, & interdum nigra in facie, et alibi, ad lentis similitudinem, dicuntur & lenticulae, & Græcè hypopie.

Clauus genus est ulceris, quod nonnunquam alibi, sed maxime in pedibus nascitur, doloremq; si non aliàs tamen ingredienti affert, & qui clauum habet morbosus est, ut dicit Vlpianus ff. de edi. edicto. Plinius 26. Clauos pedum extrahit ladanum cum castorio, uerbenaca ex uino, quo morbo periit Syluius italicus egregius Poëta.

Myrmeciae sunt uerrucae, siue ulcera duriuscula, quæ radices altius exigunt, & nascuntur aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedū, & sunt in lupini amplitudine, sic dictæ, quia formicæ modo pungant, quas Græci *μυρμηκας* uocant. Græci igitur quedam genera uerrucarum *μυρμηκίας*, & *ἀκροχορδόνιας* appellant. Sunt autem acrochordones amplitudine fabæ. Verruca autem est tuberculum caroq; dura & callosa sine pruritu, porrus uulgo dicta. Serenus: Interdum existit turpi uerruca

pi uerruca papilla. Inde uerrucosus uerrucis plenus, & uerrucaria herba à Latinis dicitur, quæ uerrucam tollit.

Fistula est ulcus altum, angustum, & callosum in corpore, siue ex uulnere sit, siue ex uitio orto, quod ad suppurationem uenerit, cuius meminit Iurisc. ff. de uarijs & extraord. cog. dicens. Medicos accipiet forsitan qui alicuius partis &c. ut puta auricularius, si fistulæ, si dentiũ. Inde Auricularius medicus, et Dentarius, q̄ aures uel dentes curat.

Scrophula uel scrophula dicitur esse tumor sub aure, de quo ita refert Perottus Sipontinus: Est tumor in quo subtus concretæ, quedam ex ex pure et sanguine quasi glādulæ oriuntur, et à scrophis, quoniam eo morbo afficiuntur nomen accepit.

Gemursa morbus est inter pedum digitos gemitum inducens, de quo Plinius lib. 26. in Prologo.

Sacer ignis, est morbus quem sancti Antonij ignem uocant. Dicitur & pruna, et ignis Persicus, & carbo. Et à Dioscoride uocatur Erysipelas. Alij formicam miliarem uocant. Dicitur item Antrax. Magna tamen apud Arabes & medicos recentiores de pruna & igne persico, uel sacro ambiguitas. Alij prunam atq; carbonem nō idem malū, sed diuersa existimant, cum tamen quod ab Auicenna
pruna

pruna dicitur, à Galeno carbo Latine uocatur, & Græcè ἀνθραξ. Alij quamuis idem significant Græcè antrax quod carbo Latine, differre tamen uolunt, sed de his modis & scrupulis nihil ad me. De carbunculo ita loquitur Plinius libro 26. capite primo: Carbunculus morbus est, qui nascitur in occultissimis corporum partibus, & plerunque sub lingua duritia rubens, rarius modo, sed nigricans capite, aliàs liuido corpus incendens, neque tumescens sine dolore. Et Celsus in sexto: Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris &c. Inde carbunculantes dicuntur à Plinio, qui carbunculum patiuntur.

Fungus, est ulcus in sede simile fungo terrestri, quem morbum recentiores putant esse ficum, sed Ficus uel σῦκορ, uel σῦκωσις Græcè quod est idem (ut uult Celsus, & Græci) in barba, & capillo est, hoc est, germina quædam cum ulcere rotunda cum rubore, quæ dolor sequitur. Et dicitur ficus, quia fici similitudine caro excrescit. Marisce uero tubercula quædam cum ulcere ex turpi confricatione circa sedem nata.

Condyloma morbus est, qui nascitur circa coronam podicis, tuberculū, uidelicet, sanabile, et nascitur ex quadam

ex quadam inflammatione, iuniores medici uocant eminentes tumores, nūc molles, nunc duros figura rotunda nihil eminentes.

Cancrena caro est mortua, ex ulcere, uel inflammatione & rubore albescens, cum uero nigricans insensibilis fit, & fit maximè inter ungues & alas & inguina, & senibus ferè, atque his quorum corpus mali habitus est.

Furunculus est tuberculum acutum cum inflammatione ac dolore in carnosissimis maximè partibus, de quo Serenus: Cum sanguis nimius puro commixtus atroci aestuat, & papulas alte sustollit acutas. Resina misces et saxi ordea fracta, dictus sic quasi fur noceat.

Ozena, ut Cornelius tradit, est cum ulcera circa nares sunt, pluresuè crustæ, & odorem foedum habent, cui malo uix mederi potest.

Polypus est humor præter naturam in naribus consistens à similitudine Polypi marini piscis cognominatus, quod eius carni similis sit. In hoc autem morbo, caro interiora nasi occupat intumescens, agitq; radices plurimas, quæ tanquàm pedes sunt. In de polyposus qui patitur polypum, cuius meminit Vlpianus. ff. de edil. edic. dicens eum esse morbum, ibidem in glosa. Accursius Poletarius grammaticus

H h

uariam

uariam & falsam differentiam refert, quoad quantitatem inter polypum piscem & morbum dicens: Polipus est piscis, polypus lesio carnis.

Carcinoma est cancer morbus, fit maximè in superioribus partibus circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum, & in iecore, aut splene hic nascitur, color eius rubor est, curationibus irritatur. Cuius tres species ponit Celsus in quinto. Primum cacoëthes cum ulcus quidem pressum est, sed quæ circa sunt intumescunt. Secundum sine ulcere. Tertium quod thymium uocant. Et cancer canceris dicitur, pro morbo enim generis neutri, et cācer cancri apud Catonem in masculino reperitur, ineptit, ut alibi, in hoc uocabulo græcismus.

Pterygium, secundum Celsum, est quando recedit ab ungue caro cum magno dolore, uideturq; diminutium esse à τῆς πτερύγος, id est ala quam tūc maximè efficere uidetur caro ab ungulis discedēs. Pterygium, in oculis uocatur membranula quædam nervosa, quæ oriens ab angulo nonnunquam ad pupilam uenit, ei quoq; officit, ut dicit Celsus in septimo. Pterygium uero in digitis apud Paulum Aeginetā, est cum caro excrescit partem illam contegēs, quæ est in ungue. Pterygium, inquit, appellatur, quod uertium ex paronychia ferè nascitur.

Alope-

Alopecia morbus est in capite humano & barba quæ fit ex uitio humorum, cum profluvio capillorum proueniens, dicta à uulpe quæ Græcè ἀλώπηξ dicitur, quod ea crebro id genus morbi patiatur.

Genera morborum quæ in pudibundis circa testiculos oriuntur sunt, teste Celso in septimo medicinarum: Enterocela quæ dicitur cum intestina dilabuntur in scrotum. Epiplocela, cum omentum in scrotum descendit, Hydrocela, cum in alterum ex testibus humor confluit. Has omnes species generali uocabulo (quoniã specialia apud Latinos non habent) nostri uocant hernias à duricie pellis, quæ fit post intestinorum descensum, hernium enim durum & asperum lingua Sabinorum dicitur. Inde herniosus, ut dicitur Leuitici 21.

Ramex uero has habet species. Procelam, quæ est cum ex abscessu aliquo circa scrotum materia subduruit. Sarocelam, cum in ipso scroto concreuit caro. Cirsocelam, cum uenæ intumescunt tunicis testium integris, uel in ipso scroto, uel cum bubonocela dicitur in inguine. Plinius tamen enterocelam dixit ramicen. Inde Græcè κηληκοί, à nostris ramicosi & herniosi dicuntur. Est etiam, ut obiter tangam, scrotum pellis, quæ testiculos continet, Græcè ὄσχεον dicitur teste Celso.

Hh 2

Planci

Planci appellantur, qui supra modum pedibus plani sunt. Scauri uero sunt, qui extantes talos habent. Pansæ, quorum pedes incurui.

Pernio est morbus pedum ex nimio frigore proueniens, & calcaneum infestans, cuius diminutiui perniunculas.

Hæc sunt quæ tumultuaria tantum lectione de morborum nominibus collegi, col lecturus plura in posterum.

DE AEGRI

TVDINIBVS CVTIS.

LIBER.



IMPETIGO & serpigo de genere sunt scabierum, & sunt de materia calida & sicca, multum ignita & superincensa. Impetigo tamen magis fit de materia magis ignita, & impetuosa magis quam serpigo, unde perambulat locum in circuitu sursum & deorsum occupans. Serpigo uero fit de materia magis grossa & minus incensa, unde nec ita mouetur sursum sicut prima, sed magis deorsum in gyrum occupat locum

cum

cum. Impetigo duobus modis fit, uel enim est aqua-
lis in superficie corporis, & fit de cholera nigra et
fece sanguinis, aliquando cum prurigine, uel super-
fici tenus combusta, cuius color est citrinus, uel ru-
bori continuus siue contiguus, & est fursurea, fissi-
a & pruriginosa, nascens de materia melancholica
uel cholericā, nimis incensa. Prima species, ut uult
Isaac, medicabitur cum phlebotomia & pharma-
cia, humores incensos medicantibus. Secunda cum
medicina cholerae nigrae purgatiua, balneum aquae
dulcis assuescat, lauetur cum fursure, farina fabae,
ungatur oleo frumenti, aceto, pomi citri, carui, pista-
ta fursure cum aceto, cinere cum foeminino lacte, el-
lebori nigri cum aceto, & acatiae ℥. 7. gummi ara-
bici ℥. 6. cum aceto, unde post lauetur cum aqua dul-
ci, & ungatur cum oleo rosaceo, & lapatium acu-
tum mixtum cum aceto, omnia extirpat. Differt au-
tem à lepra & morphea, quia tales fiunt de mate-
ria frigida & sicca incinerata. Ista uero de calida,
unde locus uritur cum pruritu & asperitate cutis.
Contra scabiem: Sumat patiens decem uicibus seruū
caprinum cum isto puluere, quantum capi potest
tribus digitis: Recipe folliculorum senae ℥. 2. cin-
namomi, seminis anisi ana. ℥. 2. postquam sumpse-
rit hoc sumat ℥. s. confectionis hamec maioris sectū

Hh 3 dum

dum Mesue, distemperetur cum aqua calida. Deinde de tertio in tertium diem sumat unc. s. huius mixtionis mane ante diem cum aqua calida: Recipe diacatholiconis unc. 2. confectionis hamech prædictæ unc. 1. misceantur. Facta purgatione lauet crura et brachia cum aqua extinctionis ferri & æris, in qua bullierint radices lapatij acuti ieiuno stomacho. Unguentum pro scabie, facta purgatione: Recipe succi lapatij acuti, succi spatulæ foetidæ, succi scabiosæ, succi fumiterre omnium ana. ʒ. 3. axungie porcine uetustæ ʒ. 2. s. auripigmenti, ellebori albi, sulphuris uiui, thuris, mastiches, lithargyri ana. ʒ. 2. argenti uiui extincti ʒ. 1. s. liquefiat axungia et misceatur cum succis prædictis, deinde ponantur omnia subtilissime puluerizata, & incorporentur simul, postea addatur aceti, et parum olei. Ad scabiem grossam balneum: Recipe sulphuris, aluminis ana. lib. s. fumiterre, chamomilæ ana. M. 3. aquæ scabiosæ ubi extinguitur ferrum, amphoram unam, & sumatur de alia aqua quantum sufficit & balneum fiat in tina.

Lepa ab Auicenna sic describitur. Lepa est infirmitas mala proueniens ex dispositione malæ complexionis in toto corpore, quare corrumpitur complexio & forma & figura ipsius, & forsitan soluitur in fine continuitas ita ut scindantur membra

bra & ulcerentur, & cadant pili, & est quasi can-
cer communis toti corpori, aliquando tamen ulce-
rantur membra, sicut in illa quæ fit de phlegmate,
siue de melancholia phlegmatica. Et est quædam
lepra quæ tardè augmentatur, ut est phlegmatica
uel melancholica. Alia quæ cito augmentatur et cō-
firmatur, sicut cholERICA & sanguinea. Est autem
lepra secundum Isaac in uatico quadrifaria, uel e-
nim est de corruptione sanguinis & uocatur alope-
cia, altera de cholera rubea, & dicitur leonina, alia
de cholera nigra, & dicitur elephantia, quarta de
phlegmate, & dicitur tyria. De corruptione san-
guinis, rubet cutis & pulrida est nimis, tumet san-
guis, & sanies inde fluit, de cholera rubea est pe-
ctus siccum, fissuræ manuum & pedum, contractio
& macilentia, huius calor si augmentetur magis
quàm siccitas, articuli separantur & cadunt. Si de
cholera nigra sit, cholera erit niger, & putrescit &
grossefcit, grauescunt sensus, scinduntur manus &
pedes, contrahuntur digiti. Si de phlegmate hume-
fcit corpus, glandes nascuntur, color est albus, ocu-
lorum fluxus. Oportet autem, cum medicari di-
spofuerimus, incipiamus à purgandis humori-
bus illis corruptis. Galenus: Diuturnum mor-
bum medicaturi incipiant à medicāda sua materia,

Hb 4

& à

Et à corpore expellenda, quod si de corruptione sit sanguinis, phlebotomemus de uena mediana. Quod faciendum erit cum materia intra uasa sit, si enim sit extra uasa phlebotomia erit cauenda, cum multum ei noceat. Intelligitur extra uenas esse de corruptione figuræ infirmi, Et pustulis in facie Et putredine in toto corpore, unde dimittenda phlebotomia, Et accipienda pharmacia. Nutriamus eū diæta subtili, non conuertibili neq; corruptibili. Galenus in quadam sui particula, ubi de melancholia loquitur, inquit, secundum quod expertus sum, si quis uoluerit purgare hanc materiam, Et mundificare corpus, inde fortissima medicina incipiat, Et ita forsā ne augmentetur materia prohibetur, Et si fuerit cancer, idem oportet nos facere, si medicina nostra corpori proficiat, Et color melioretur morbusq; declinet, Et infirmus confortetur. Medicinam hoc facientem assuefaciamus, Et cum magis medicaminib. adiuuemus, sicut hieralogodiō, Et apozemate de epithymo, sero cum epithymo utatur, in intermissione, Et cum non sit tempus dare catarticum, demus theriacam magnam factam cum pinguedine Et carne tyri. Galenus nunquam, inquit, uidi in uita mea hominem hac infirmitate plenarie liberatum, nisi qui biberit uinum in quo tyrus cecide-

cecidere, & ibi computruerit, hunc enim uidi exco-
riari, & cute expoliari, cum uinū illud ebiberit. Un-
de certificaui cum testimonio usuali quod dixerunt
antiqui de carne tyri, uel de pinguedine, et sui iuua-
menti magnitudine, in hac & omni dura passione.
Purgato autē corpore supradicto medicamine, de-
bemus seligere theriacam & similia corpus custo-
dientia, putredinem mundificantia, præcipiatur ut
balneetur, sed non tamen aquis dulcibus. Iterum iu-
uat incensio & dietæ obseruatio, & cibi paruitas,
interrogatus autem Galenus, quæ medicina summa
habeatur, inquit: Abstinencia.

Morphea mutatio interpretatur, quando color
naturalis cutis mutatur in calorem nō naturalem,
& est corruptio sanguinis, unde nutritur corporis
cutis sine macula intercutanea carnis, cuius causa
est uniuersalis defectio uirtutis digestiue, quæ cum
defecerit sanguinem corrumpit, & ad cutem ueni-
ens eam nutrit, si autem eius qualitas sit phlegmati-
ca, alba fit morphea, si de cholera nigra, nigra erit
morphea. Est autem morphea triplex, uel enim est
liuidi coloris, nascens de cholera & sanguine, uel
nigra, nascens de sanguine melancholico, uel alba,
& est de phlegmate salso, in quibus tribus generi-
bus sanguis non est minuendus, sed oportet ut fore

Hh 5

ti pur-

ti purgetur medicamine, sicut hierapicra, hieralogion, & similia. Vomitus detur semel in mense. Abstineant à cibis malos chimos generantibus & dure digestilibus, sæpe balneentur. Galenus morpheam medicari præcepit post mundificationem corporis, ungatur autem corpus cum calce & anacardo & tapsia, aloë, lithargyro, acatia, sulphure, elleboro albo. Item Galenus: Apij sylvestris succus ualet cum lacte ficuum mixtus, sulphur & tragachantum idem faciunt, sanguis leporinus ualet, capparis radix ualet similiter cum aceto, bibat autem de hoc antidoto: Recipe myrobal. citrinorū, chebulorū, belliricorū, emblicorū ana. 3. 15. puluerizentur hierapicra 3. 18. siseleos 3. 15. sumiterra 3. 30. senæ 3. 20. agarici, turbith. ana. 3. 30. tapsiæ, acori ana. 3. 8. fac puluerem adde mel quod sufficit dans 3. 2. uel. 3. Vnguentum morpheæ ualens omnis coloris: Recipe tapsiæ, condisi, rubeæ, sinapis, nigellæ, radicis pyrethri ana. 3. 3. colocyntidis, ellebori nigri, capparis radicis, rutæ, aluminis, staphisagriæ, nitri ana. 3. 1. s. euphorbij, scamoniij, salis armoniaci, sandarachæ, ameos ana. 3. 2. fac puluerem, tempera cum aceto, unge.

Scrophulæ & glādulæ morbi sunt cōsimiles, tamen differunt in materia, quia glandulæ fiunt de materia

materia in qua phlegma dominatur. Scrophulæ uero magis fiunt à dominio melancholiæ, fiunt autem huiusmodi apostemata siue passionēs, frequentius in collo & sub ascellis & inguine. Scrophulæ semper plures reperiuntur, glandula quandoq; una sola apparet. Glandulæ sunt molles, scrophulæ uero duræ & solidæ in modum lapidis secundum isaac in uiatiko: Scrophulæ sunt dura apostemata in molli carne nascētia, quæ sunt medicāda unguentis emollientibus, & emolliuia sunt superponenda putridæ carnis corrosiua. Deinde alia medicamina desiccatiua & claudentia. Dioscorides: Ireos cocta & cataplasmata ualet, quia humectat. Similiter ficus nō maturæ & coctæ, yreos cum aristolochia & dialtheca mixta. Ad mundificandas scrophulas ualet, farina lupini cum aqua temperata. Item elacterij radix pistata cum rhamno ualet, capparis radix cocta & pistata ualet. Nitrum & frumentum emolliunt. Cōfectio ualens apostemati in collo et scrophulis: Recipe aristolochiæ ʒ. i. zingiberis ʒ. i. s. tēpera cum aqua & desuper pone. Aliud: Recip. Eruginis æris ʒ. ʒ. armoniaci ʒ. ʒ. sarcocol. ʒ. i. s. fac puluerem, temperans cum melle & cum licinio impone. Item cineris uitis, picis usualis ana. ʒ. ʒ. 10. olei quod sufficit fac unguentum.

Gutta

Gutta rosacea fit de sanguine uel cholera adusta,
 uel melancholia innaturali. Hæc autē materia sem-
 per est grossa & dura & sicca, unde remollitiuis
 indiget & dissolutiuis, uel digestiuis, postea debet
 sequi euacuatio materie peccantis cōueniēter, præ-
 cedente tamē phlebotomia uel uentosa sub mento,
 si uideris expedire, deinde sequantur localia aliquā-
 tulum calida, quia frigida non dissoluunt. Fiant er-
 go trochisci tales: Recipe boracis 3. 3. farine cice-
 rum rub. 3. 2. farine fabarum 3. 1. camphoræ 3. 1.
 Hæc omnia trita cum succo cepæ distemperentur,
 & cum melle rub. dispumato trochisci informētur
 & desiccentur in umbra, cum opus fuerit cum eo-
 dem succo distemperentur, uel cum melle, & inde
 facies ungatur. Deinde modo prædicto abluatur. I-
 saac in uiatiko dicit. Si in facie pustulæ nascūtur du-
 re, siccæ atq; parue, alumen, gummi, lentes pulueri-
 zentur, & inde facies lauetur. Similiter gummi ara-
 bicum & nitrū cum aceto tempera, faciem de re
 omni mundificat. Aliud secundum eundem: Recipe
 cathmie argenteæ exagium. 1. chimoleæ, boli, ter-
 ræ armenicæ ana. 3. 1. sandarachæ 3. 2. tēpera cum
 aqua rosarum, & lini faciem, chimolea, id est terra
 sub mola fabri, uel terræ Hyspaniæ, quam aliqui ap-
 pellant cretam, sandarachæ, id est auripigmenti ru-
 bei. Vne

bei. Unguentum per me pluries expertum in pustulis faciei: Recipe sulphuris uiui ℥. 1. camphoræ ℥. 3. axungie porci. ℥. 2. misceatur & fiat unguentum, liniatur facies dum uadit dormitum, & in mane lauet faciem cum aqua rosarum.

Cōtra uestigia siue sint rubea, citrina, liuida, uel nigra: Recipe farinarii, cicerū, fabarum ana. ℥. 1. amyli ℥. 2. medullæ seminis melonum ℥. 1. tragachanti, gummi arabici ana. ℥. 1. albuminis oui conuassati ℥. 1. ceræ rubæ lotæ pluries cum aqua pluuiali ℥. 1. decoctionis ultimæ carniū abstractarum quod sufficit pro linimento misce, & fiat linimentum, hoc linimento ungatur locus uestigiorū in nocte, in die uero lauetur cum ista decoctione: Recipe medullæ melonis contusæ grosso modo ℥. s. uiol. M. 2. misce & decoquantur. Item: Recipe amyli ℥. 3. tragachanti ℥. 1. cerusæ lotæ ut supra ℥. 1. s. lactis cuiuslibet, sed melius asinæ quod sufficit pro linimento, cum his similiter liniatur locus ut supra. Si uero locus est tumefactus, retineatur aliquibus noctibus lamina plumbi subtilis ligata, compressa super dicto loco, prius tamen alternatim ad libitum. Mollitium cōsumptiuū, & aliquantulum dealbati: Recipe muscilaginū seminis althææ, lini ana. ℥. 1. s. foenugræci, seminis communium maiorum frigidorum ℥. 3. s. are

3.3. sarcocol. cerusæ lotæ pluries cum aqua angu-
rie batecæ 3. 1. pinguedinis gallinæ 3. 3. olei lilio-
rum alborum 3. 1. ceræ albæ quod sufficit pro un-
guento molli, misce & fiat unguentum, hoc unguē-
to ungatur, ut supra.

Aliquando (ut uult Rasis) exeunt in corpore ue-
sicæ, inter quas est aqua subtilis similis eis quæ acci-
dunt ex adustione ignis, & eius cura est phleboto-
mia si corpus est plenum, & detur ægro assidue æ-
qua prunorum & aqua granatorum acetosorum et
taxil, & omnia quæ extinguunt sanguinem, & rum-
pantur uesicæ, & currat ex eis totum quod est in
eis, & liniatur cum cerusa plumbi, lithargyro, myr-
to cum aqua rosarum, & aqua myrti humida.

Exeunt in corpore bothor parue, una aut plu-
res numero, & apostematur locus apostemate par-
uo, & quandoq; scinditur, & incipit uulnerari, &
uadit de loco ad locum. Cuius cura est cum eis quæ
educunt choleram, & linire ipsam cum luto arme-
no dissoluto cum aceto, aut cum epithemate erysi-
pilæ cum aceto.

Herpes estiomenus cum accidit ab ulcere malo,
aut bothor nigra, aut uiridi, aut ea quæ habet colo-
rem pauonis, incipiens ambulare & dilatari ueloci-
ter, tunc oportet ut festinetur ad cauterizandum
ipsum,

ipsum, aut proijciatur super ipsum medicamen acutum & liniatur in circuitu eius cum luto & aceto. Cum ergo denigratur & mollescit nigredo, tunc ponatur super ipsum sulphur contritum confectum cum butyro una uice post aliam, donec cadat caro corrosa mala tota, deinde abluatur cum aceto & aqua, & curetur cum medicamine generatiuo carnis, & non sit negligentia in ipso, quia occupabit ex corpore locum plurimum.

Aduſtioni ignis confert unguentum de calce, & unguentum cerusæ, & magis ultimum, quod expertus est Rasis ad hoc, est unguentum album, & cum est res magna & plurima, indiget phlebotomia ex latere diuerso, aut opposito, deinde curetur cū unguento albo, uolo quod intelligatur per unguentū album, illud quod est factum de cerusa & oleo rosato & cera, & non de pluribus.

In panaritijs confert ut igniatur oleum ne aduratur taliter & imprimatur in ipso. Si ergo sedatur pulsatio, & sanatur, tunc illud sufficit, & si non, tunc ponatur super ipsum quod saniei faciat collectionem. Cum ergo colligitur sanies & maturatur, perforetur foramine paruo & exprimatur, deinde curetur illud, ut non capiat radicem unguis totius, & curetur cum medicamine generatiuo

tiuo carnis, & quandoq; confert ei in principio ut liniatur cum erugine ferri & aceto, & ponatur in niue usq; quo obstupefcatur.

Ad alopetiam: Recipe spumæ maris ℥. 10. baumrach, sulphuris, gumme, rutæ agrestis, euphorbij ana ℥. 2. staphisagrie & cantharidū ana. ℥. 1. terantur omnia, deinde fricetur caput cum cepe donec rubeat, & quando mordicat inungatur cum adipe urfi, & liniatur cum oleo antiquo, & liniatur cum hoc medicamine duabus uicibus aut tribus cum uino ueteri post fricationem cum cepe donec rubeat, & quando mordicat inungatur cum adipe urfi, deinde iteretur.

Ad sabaphati recentem & in corporibus teneris epithema: Recip. Alcāne, aristol. lithargyri, corticis grana ana. terantur & cribrentur & liniantur cum aceto uini & oleo rosato. Confectio autem epithematis ad sabaphati antiquam: Recipe salis & atramenti, adusti sulphuris, argenti uiui, gallæ, lithargyri, aristolochiæ ana. teratur totum & administretur sicut primum.

Ad clarificandam faciem, medicinæ: Recipe amygdalarum dulcium, tragachanti, farine ciceris & fabarum, & conficiantur cum aqua hordei & liniatur in nocte, & abluatur in mane cum aqua fursuris.

ris.

ris. Medicina alia clarificans faciem & rubifi-
cans eam experta: Recip. Croci, rubeæ, thuris, myr-
rhæ, mastiches ana, aggregentur cum aqua bulbi,
& liniantur, & fiant collyria, & liniantur cum a-
qua, & dimittatur tribus horis, deinde lauentur
cum aqua calida, et multum utatur mane cicerum,
& aqua ciceris etiam, & sumant pondus drach.
2. pulueris hyssopi, & tertiâ drach. 1. de croco ali
quot diebus. Confectio rubificans faciem: Re-
cip. Sinapis albi, arsenici rubei, conterantur simul
cum lacte, & liniatur facies cum eis septem die-
bus, & uocatur Gamera Rasis.

Ad botium gulæ puluis: Recip. Piperis longi,
zingiberis, nucis moschatæ, gariophylorum, aristo-
lochia, pyrethri ana drach. 2. piperis nigri, cinna-
momi, aluminis, salis gemmæ, spongiæ combustæ
ana drach. s. sacchari albi uncias tres, fiat puluis,
& deglutiatur paulatim detentus in ore. Ad idem:
Recip. Spongiæ marinæ, gallæ marinæ adustæ,
ana unc. s. ossium sepiæ, pyrethri, zingiberis, mele-
getæ, cubebæ, cinnamomi, galangæ, salis gem-
mæ, pumicis ana scrup. 2. limaturæ acuum cōmer-
cij combusti ana drachmam 1. gallarum, cypressi
numero 1. cochleæ marinæ 3. s. seminis aspara-
gi, brusci ana drach. 1. mellis lib. 1. uini boni &

li clari

clari lib. 1. fiat loch. Ad idem: Recip. Spongiam nouam et incide in frusta, et assetur in testa terrea noua multum calefacta, & sic assata pistetur, & puluerizetur, et isto puluere utatur in ferculis per multum tempus.

Ad rubedinem faciei ex sanguine melancholico grosso: Recip. Succo lupini depurati, aquæ endiuie, aqua buglossæ ana lib. 5. follicul. senæ unc. 2. polypodij quercini unc. 1. 5. santali albi et rubei ana drach. 2. spodij drachmani 1. ponantur in infusione per diem & noctem, & bulliant leni ebullitione, deinde coletur, & cum saccharo uncis 8. fiat iulep, utatur bis aut ter in hebdomada, secundum quod uidebitur sufficere ad laxandum.

Ad tineam capitis cum ulceribus capitalibus: Recip. Succo ceræ folij, succo bliti, succo chelidonie ana lib. 5. mellis lib. 1. lardonis porci uncias tres, saponis unc. 2. bulliant omnia simul, & commiscantur ad ignem, & ex eo lauetur caput frequenter pluribus diebus, & post hoc lauet sibi caput ex hoc: Recip. Mellis lib. 1. lixiuij boni lib. 1. 5. bulliant simul, & capite loto aspergatur super ipsum puluis thuris adusti. Emplastrum ad tineam: Recip. Succo chelidonie, lardonis ana partes æquales, & sit lardo liquefactus, deinde mittatur tantundem

tundem de oleo terreo, qui condensetur ad modum
unius emplastri, & ponatur in die bis super capite
raso, & de tertio in tertium emolliatur caput in ra-
sione cum succo chelidoniae, & continuetur empla-
strum usque ad finem curae, & signum liberationis
est, quando crustae sunt albae, siue loca earum, &
signum optimum est rubedo. Ad idem: Recip.
Gallarum non perforatarum drachmam 1. urinae
pueri, aceti ana unum cyathum, coquatur donec in-
spissetur. Ad idem: Recip. Seminis bomba-
cis uncia 1. aquae rosarum, aceti a-
na unc. 1. s. misceantur si-
mul, & lauetur
caput.

Finis Libri de aegritudinibus cutis.

li 2 Simph:

SIMPHO-

RIANI CHAMPERII LVG-
dunensis, De generibus febrü & no-
minibus ueris, ex traditione Græco-
rum, Latinorum, Pœnorum,
Arabum, & nouitio-
rum autorum.

Diffinitio febris. Cap. I.

Ex traditione Græcorum et Latinorum.



FEBRIS est calor contra natu-
ram cordis & arteriarum, uitalē
firmitudinem offendens, planeq;
deiciens, sublata ē profundo, &
acuta, & uellicās, tactui incidēs,
præcipue in thoraca, & ubi arteriæ explicatæ sunt
magnæ. Ad huiusmodi uero caliditatē, inæqualitas
quædam & ordinis immutatio specie ipsa febris
pulsibus aduenit. Empedocles, & Zenon, nec non
pleriq; Hippocratei febrem ita diffiniuerūt. Febris
est contra naturam caliditas ē corde sumens initi-
um, ex eoq; procedens per arterias & uenas, in to-
tū corpus, et naturales sensus offendit ac actiones.

Febris

Febris à fervore dicta est, sicut πυρετός Græca di-
 ctione ab incendio. Hinc λυεπυρετός medicamen-
 finiens febres. Aristoteles in probleumatibus: To-
 tius, inquit, corporis excedens caliditas, est febris.
 Alij à morbi feritate deducunt. Tria itaq; sunt fe-
 brium genera: Quotidianarū unum, humidorū ta-
 bidorum alterum, tertium hecticarum. Primum ita-
 que quotidianarū tractemus: Fiunt ergo huiusmodi
 febres citra humorum tabem solo constāte spiritu,
 & ob hoc quotidianæ uocitantur. Suum autem &
 inseparabile signum quotidianarū febrium est, per
 urinas concoctio in prima die, & caloris specie.
 Post quietem uero paroxysmi, certiorē firmioremq;
 cognitionem habebis, nam arteriarum motus omni-
 fariam sanis assimilatur, quod in nulla alia febre
 inuenias. Languentis autem affluentia ipsa quoq;
 signum maximum erit liberationis, & urinæ multo
 meliores post paroxysmum, qui à principio febris
 fuit, apparebūt, ac si lotis ipsis, neq; horror aliquis
 insuetus fuerit, neq; quæpiam alia molestia, & se
 post ablutionem, inde affluentia maneat cōfidens,
 suggerito eis cibum, præbeasq; potādum intrepide
 uinum quantum ipsorum pascere natura uideatur.
 Facile autem his febribus capi possunt, quibus mea-
 tus corporis non euaporosi, sed acutum quiddā &
 li 3 fumosum

fumosum habent, et perinde si unq̄ cohibuerint ag-
gregatum ex ipsis calorem conflagratio efficitur.
Præcipue horum sunt causæ, labores, frigora, uigiliae,
curæ, mœrores animi, irritationes in irâ, rigor,
æstus, inconcoctio, & cutis densitas, ut difficilime
possit erūpere spiritus. At quoniā in diffinitione fe-
bris dictū est caliditatē ipsam esse contra naturam,
par erit primo quid sit naturalis aperire, quidq; cō-
tra naturam caliditas, genere nanq; manifesto, for-
tassis etiam cuius sit genus non ignorabitur. Natura
lis itaq; est caliditas, talis inq̄ est & insitus calor,
cuius natura est animalis principium, cum animali
nanq; nascitur, & ob hoc dicitur naturalis, instru-
mentū existens in totū animalis potētiae. Neq; enim
possibile est animā citra huiusmodi calorem, in ali-
quod agendi munus descendere. Omne nempe in-
strumentū proportionale cum eo, cuius instrumen-
tum esse necesse est. Id mirū fuerit, si secus frustra
instrumentum, atq; ita in auribus per se aliquid fru-
stra coniectum fuerit. Oportet ergo & insitam ca-
liditatem animæ esse instrumentum, ac indissolubi-
lem simplicemq; habet cōplexionem. Cæterum sub-
lata in animæ potentias, & in earum opera etiam
illis erit proportionalis, & perinde re mixta frigi-
do & humido, & arido, et tēperata, & moderata
iureq;

hucq; ob id fuerit appellata naturalis, & insita cōplexio, sed magis ob ea naturalis & insita complexio dicta fuerit caliditas. Hæc ipsa ob id in rationū complexione caliditas cæteras superat, exceditq; qualitates. Animalia nanq; calida perhibentur ob eam quæ in ipsis excedit caliditatē, reliquas uincen-tem qualitates, hoc nimirum ob eam quæ in ipsis excedens est caliditatem, reliquas superantem qualitates, idq; quod omnium aliarum qualitatum caliditas sit efficacissima, nulla siquidem ei uicina, ipsam qualitas committant, ut ea ipsa aliās, hæc igitur naturalis atque insita caliditas. Quæ contra naturam est, ea ex aliqua extrinseca causa, quæ sit, neque familiaris naturæ, neque ab ipsa capiens principium corpori adueniens non proportionale existens instrumentum naturalium potestatum, neq; custodiens ad congrua opera rationem hæc acquisiticia, & aliena est, quæ porrò sua distemperantia menti q; conseruans ad potentias & opera proportionem, eiusmodi etiam diceretur, contra naturam complexio ad maiorem calorem declinante iuxta eam rationem qua insita cognataq; caliditas. Nos autem ne prætereat quod quemadmodum insitam, ita & aduenticiam dicimus caliditatem, nec tamen ut aduenticiam asciticiamque, ita

Et cognata dicimus frigiditatē, cuius omnino causa non simpliciter, ac per se frigiditas naturæ opus induit, sicut et caliditas, extrarium enim et corruptorium animatorum, et in primis animalium frigiditas atque incōmobilitatis potius quàm motus causa, nam quamuis naturam comitari quodāmodo uideatur, non utique per se, sed per accidens. Ex eis igitur quæ dicta sunt, non dubium quin naturalis, et insita caliditas ab ea quæ contra naturam differat, primo quidem causis, de in bono temperie, ac mala temperie, ac omnino ut extremum medio. Nam quemadmodum uirtus ad uitium, hinc quoque consequenter specie, ac forma tanquam sanum ab ægroto corpore differt. Nempe ambo circa idem subiectum ueluti contrarijs esse consuevit, siue flatus, siue humor, siue aliqua portio fuerit in qua inter se inuicem faciant, et patiuntur sicut uirtus uitiumque, huiusmodi, itaque naturalis et contra naturam caliditas talibus inter se inuicem differentijs differunt.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.



Ebris est calor præter naturam in initio petens cor per mediocritatem articularum, deinde subito se diuidens cum naturali calore per totam corpus naturali nocet actioni.

actioni. Extraneo enim calore ad cor accedente, naturalis egreditur à suo temperamento. Cumq; ipse per totius corporis membra diuiditur, ut eis uitam tribuat, quia egressus est à suo temperamento, necesse est ut eum membra recipiant in ea qualitate in qua est, unde calefacit & urit ea, generatq; toti corpori febrem actioni naturali subito nocentem. Palàm ergo est quod febris nihil aliud est, nisi calor extra naturam prius naturali nocens actioni. Sed cum absolute dicimus calorem, intelligitur tam de calore febrili quàm naturali, quàm etiam de extraneo, sicut solis, ignis, & balneorum, & his similibus. Alij autem, diffiniunt febrem ita: Febris est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritu, & sanguine per arterias, & uenas in totum corpus, & inflàmatur in eo inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus, non sicut caliditas iræ & laboris cum non ultimatur, & impedit operationem ita ut retineatur. Et est duplex: Vna est febris ægitudinalis. Alia febris accidens. Ægitudinalis febris est illa inter quam & causam, quæ non est ægritudo, non est medium sicut febris putredinis. Putredo enim est causa eius absque medio, & non est putredo in seipsa ægritudo, imò est causa ægitudinis. Febris

II 5 uero

vero accidens est febris apostematis existens, dum
est sequens ipsum apostema, & apostema est ægri-
tudo in seipso. Cūq; dicimus calorem extra natu-
ram, diuersum dicimus esse eum à naturali calore,
quia calor naturalis semper est ab animalibus inse-
parabilis, & calor febris est extraneus et ab eis se-
parabilis. Ergo cum diuiditur per totū corpus, licet
naturali noceat actioni, differt tamē à naturali &
ab alijs caloribus, sicut à calore solis, balnei, & his
similibus. Horum enim calor quāuis sit extra naturā
insimul tamen interiora & exteriora non calefas-
cit, nec actioni nocet naturali, & quanq̃ ei noceat,
tamen lesio non est primitiua, quia primum muta-
tur ad febrem, deinde febris nocet actioni. Illud er-
go nocumentum est propter febrem, & non pro-
pter solis calorem. Cum naturalem dicimus actio-
nem, intelligenda sunt cibi appetitio, somnus, & ui-
gilia, ambulatio, et alia his similia. Hæc enim omnia
deficiunt & mutantur propter febrem. Ideoq; fe-
bris cæteris morbis est molestior, eiusq; disputatio
dignior, quia omnes morbi, præter febrem, uni tan-
tum membro eueniunt, & permanent aliquo tem-
poris interuallo, nec subito actioni nocent natura-
li, sicut sciatica, hydropisis, phthisis, & his similia.
Nam unaquęq; harum ægritudinum uni corporis
membro

membro accidit, & non omnibus. Febris autem
ē conuerso est, quoniam per eam corpus intus &
extra patitur. Nocet etiam spiritibus & uirtutibus
animatis actionibusq; naturalibus. Et licet dica-
mus actionibus naturalibus esse nocitiuam, non ta-
men eas destruit. Actio enim naturalis nunquā de-
struitur, nisi cum fit separatio animæ & corporis.

Oportet nos ergo dicere sigillatim de unaquaq;
febre. Incipiendum igitur est ab ephimera, quæ fit
in spiritu, sed erit eius disputatio breuis, quia eius
significatio & cura ad aliarum febrium compara-
tionē facilima est & planissima. Caret enim mate-
ria, spiritus enim nō habet materiā, per q̄ calor per-
maneant. Anicēna: Homines uelocius cadētes in fe-
bres ephimeras sunt calidi et sicci, deinde calidi et
humidi, deinde calidi tantū, deinde sicci tantū. Cau-
sæ enim omnium specierū febriū ephimerarū sunt
primitiue calefacientes essentialiter, aut per acci-
dens. Et de eis sunt ex oppilationibus factæ in
qua causa non est primitiua. Causæ enim primi-
tiue plerunq; mouent antecedentes. Et istæ qui-
dem febres plerunq; recedunt in die uno, & raro
pertranseunt tertium diem, nam si pertranseunt
æstimatur de esse earum quod ipse permutantur.

Et

Et hæc quidem febris est facilis curationis, & difficilis cognitionis, & similiter principium ethicæ, & est eius inflammatio non mordicativa aspera, imò bona, sicut caliditas laborantis & ebrij. Et cum est in prima die urina digesta, & pulsus bonus, tunc iudica quod est febris ephimera. Et non festinat in ea pulsus plus quàm naturalis, nisi raro & uelocitate pauca. Plurimum eradicationis eius est per sudorem similem sudori naturali, & non humoroso in quantitate simili naturali. Euacuatione autem non indiget aliquis eorum, nisi habens oppilationem, repletionem, & nauseatiuam satietatem, & habens ephimeram ex soliditate cuius corpus est repletum. Et in febribus ephimeris sunt quæ omnino comparantur ad dispositiones animales, & de eis sunt quæ comparantur ad dispositiones corporcas, & de eis sunt, quæ comparantur ad res quæ eueniunt de foris. Exemplum primi, ut illa quæ fit ex angustia, tristitia, æstimatione, cogitatione, ira, uigilijs, somno, tranquillitate, timore, & gaudio. Exemplum secundi, de eis quæ sunt actiones & motus, & est illa quæ fit ex labore, tranquillitate, euacuatione, dolore, syncope, fame, siti. Et de eis quæ non sunt actiones & motus, sunt illa quæ fit ex oppilatione nauseatiua satietate,

satietate, apostemate, soliditate. Exemplum tertij, scilicet, de eis quæ adueniunt de foris sunt, sicut illa quæ fit ex adustione, frigore, soliditate, ablu-
tione, & similibus.

Ex traditione recentium
autorum.

Imana corpora tribus sunt modis com-
posita, membris, uidelicet, solidis, spiri-
tu, & humoribus. Cunque sint ex tribus
composita, necesse est ut genus eius febris triplex
sit: Vnum in solidis membris, sicut carne, pinguedi-
ne, uenis, neruis, cartilagine, & his similibus. Aliud
in humoribus quemadmodum in sanguine, phleg-
mate, & utraq; cholera. Tertium in spiritibus, sci-
licet, in uitali, qui est fundamentum caloris natura-
lis, & in spiritali, qui est fundamentum sensus &
motus uoluntarij, & in naturali, qui est fundamen-
tum quatuor naturalium uirtutum, scilicet, appeti-
tiuæ, contentiuæ, digestiuæ, & expulsiuæ. Vnum
quodq; corporis membrum has quatuor habet, sed
tamen stomachus & epas fortius has habent uirtu-
tes. Nam sunt eis familiares plus quàm cæteris mem-
bris. Quia licet cum eis operentur propter nutri-
enda semetipsa. Nam tamen faciunt operationem
propter omnia corporis mēbra. Quapropter qui-
dame

dam antiqui naturā stulto & iniusto Regi assimilauerunt dicētes. Quædam enim membra facere delectari alia membra, & quædā laborantia causa inuandī alia. Ipsi etiam arbitrati sunt stomachum & epar duas et diuersas habere actiones. Quarū una sit propria ad eorum nutrimentum. Alia sit cōmunis omnibus corporis mēbris. Fecerunt etiam augmentum de harum actionum diuersitate, & de remotio-
ne earum non in uno tēpore uenientium. Dicūt enim stomachū in initio uniuersalē facere actionem, & cibum mutare in chimū quasi ptisanā. Deinde suam particulariter operans actionē, cū proprietate quā habet, & digerens cibum, & cōuertit eum ad nutriendū suam essentiā. Hac de causa autumāt cum duas habere actiones, propriā, uidelicet, & communem. Quorum intētio sic est destruenda, quia argumentum eorū duobus modis est corruptū: Vno, si enim duas uirtutes digestiuas, propriā, uidelicet, et cōmunem, prout asserūt, stomachus habet, necesse est, ut sint remotæ ac diuersæ. Vnā, scilicet, in uno operās tēpore, & alterā in alio, aut sint cōmixtæ, ut utraq; in una hora suas faciāt actiones, quod si unus actio ab alterius differret operatione, & tamen utraq; in uno fuerit loco, atq; uno mēbro, impossibile est nō mutari cibū secundū illius mēbri naturam.

Conuer-

Cōuertitur enim & assimilatur essentiæ illius mem-
 bri. Quēadmodum uidemus cibū omnibus corporis
 mēbris assimilari. Naturalis enim actio nihil aliud
 in omnibus mēbris uidetur operari, nisi cōuvertere
 ad eorum essentiā illud quod eis fuerit simile. Sto-
 machus ergo quoniā est unum mēbrum, unam uir-
 tutem necesse est habet digestiuā. Quod illæ duæ
 uirtutes propria, uidelicet, & cōmunis duo stoma-
 chi loca habuerint, necesse est ut illæ stomachi par-
 tes cibū per totum corpus digerentes permancant
 absq; nutrimento, propria enim indigēt uirtute, quæ
 cibis digeri possit, & immutari ad eorū similitudi-
 nem, quoniā omnia mēbra propriā habēt uirtutem,
 per quā cibis cōuertatur ad eorū essentiā, unde nu-
 triuntur, regūtur, & augmentātur. Rursus si fueri-
 mus interrogati, utrum uirtus digestiua unius sit na-
 turæ calidæ, uidelicet, & humidæ, an diuersæ, ut in
 quibusdam membris calidæ & siccæ sit complexio-
 nis, & quibusdam frigida & siccæ, alijs frigida et
 humidæ. Respondebimus uirtus digestiua in omni
 corporis membro calidæ & humidæ est naturæ,
 sed tamen ab unoquoq; membro quandā sumit pro-
 prietatem per quam cibum mutat ad eorum simile.
 Quia si aliter esset, omnia corporis mēbra fuissent
 equalia in forma & substantia, ossa, scilicet essent
 caro

caro, & caro ossa, & sic cetera. Iterum si dixerint
quomodo sensualiter actionem stomachi uidemus
diuersam esse, cum sit una. Nam modo conspiciamus
cibum in stomacho in ptisanū mutari, & postea ui-
demus cum cōueri in essentiam stomachi. Respōde-
tur sic: Quāq̃ actio uirtutis digestiue in stomacho
uideatur esse diuersa, una tamen & eadē est, quo-
niā digestio cibū in stomacho mutās in ptisanū quæ
dam est præparatio, cibum postea commutans sto-
macho simile, deinde finita digestionē, quādam ac-
cipit partē quæ est ei similis & nutritur ex ea. Cæ-
terū autē quod ex cibo restat desinit abire, quia est
sibi contrarium & superfluum, quod ideo dimittit
ut alia nutriat membra, sed quoniā stomachum ag-
grauat, nequit ab eo teneri. Vnde Gal. Causa inquā
nutrimēti fit quinq; modis: Prima est causa secūda,
secunda tertiæ, sic & aliæ. Prima enim, est inanitio
humiditatis membrorum, & dissolutio eius quæ fit
per corporis poros. Secunda, est naturale deside-
rium in omnibus membris consistens, quod cogit
membra ut appetant cibum. Tertia, est conculca-
tio substantiæ stomachi, ac intestinorum propter
misericas eam sugentes. Quarta, est sensualiz-
tas cibi inanitionem sentiens. Quinta, est quæ-
dam uirtus appetitum faciens, quæ fit propter
cholera

cholera nigram à splene ad os stomachi ascendē-
tem, quia ipsa os stomachi mordicante fit appeti-
tus. Quod si dixerint, cur non dixistis quod cum ap-
petitus sit inanitio, & paupertas cibi in stomacho
existens, quemadmodum dixeratis sensum mem-
brorum inanitionem cibi sentientem esse causam e-
uacuandi uenas, et uenarum euacuationem esse cau-
sam præmendi stomachum. Fames similiter quare
non est causa stomachum constringens? Respondē-
dum est: si appetitus sit in stomacho propter uena-
rum & membrorum euacuationem, necesse est eius
actio non sit naturaliter sed materialiter, quia cum
actio eius fiat propter aliud & desideret aliquid lō-
gè ab eo remotum, necesse est sit cum ratione. Quā-
rem si possibile est fieri in una qualitate, necesse est
fiat in omnibus. Oportet ergo ut ignis non ardeat,
nisi cum uolumus aliquid urere. Cuius quæstionis
falsitas palam patet intellectui. Hoc testatur Hippo-
crates, cum dicit: Omne digestionis complementū
fit cum attractione rei attrahendæ & eius mutatio-
ne eiusdem, & causa omnis attractionis est deside-
rum, omnis etiam desiderij causa est paupertas, &
eius rei indigentia quā desiderat. Cuius sermonis
intentio talis est: Virtus digestiua non digerit nisi
prius opereatur uirtus appetitiua, quia appetitiua

Kk

semper

semper est ante digestiuam. Similiter appetitiua nihil operatur, nisi prius sit inanitio cibi. Appetitio ergo, cibi inanitio & sensibilitas non sunt in stomacho nisi ut nutriant se. Nunc ad febrem unde digressi sumus uidendum est. Febris fit propter aliquod accidens, humores & spiritum calefaciens, et eos exire faciens temperamentum, quae tribus modis fit. Est enim causa generans febrem, est & alia custodiens eam, est et causa qua febris augetur & augmentatur. Causa uero febris generatiua, est fortis & nimia corporis & animae ratio, & putredo atque humorum ebullitio. Causa autem qua febris custoditur ut non dissoluatur, corporis est oppilatio, & pororum constipatio per quos fumus clauditur in corporum interioribus. Causa uero eam augmentans, calida sunt cibaria, & calida medicina. Febris causa generaliter est triplex, scilicet generatiua, custodiua, et augmentatiua. Sed generatiua duobus modis fit, aut est praesens, aut praeterita. Praesens sicut causa extrinsecus corpus percutiens, quae tripliciter diuiditur. Vna nimius est feruor, sicut solis et ignis. Secunda, est nimia frigiditas, sicut nix et similia. Tertia, putridus & horribilis & corruptibilis odor, sicut cadaueris bestiarum, reptilium et his similibus. Praeterita quemadmodum aegritudo quae fit propter

pter angustia et tristitia, et humoru copia ad putredinem preparatoru, sicut diximus de actione nature, quia natura non inueniens cibum omnino laudabile, et humano corpori simile, illam cibi partem que corpori est inconueniens ac dissimilis, separata simili congrua, et claudit eam in quibusdam locis corporis. Pars uero que est mundificata et corpori utilis, nutrit totum corpus. Superfluitate cibi augmentata, ac in loco quo clausa fuerat multiplicata, egreditur foras implens locum cum sua multitudine, que a natura dimittitur nec ab ea regitur. Quia cum fuerat in loco quo natura eam posuerit, rexit et custodiuit eam, egressa uero inde, odio tenetur nature, nec ab ea regitur sed permanet in aliqua membrorum concavitate, unde cum aliquod euenit accidens sicut mutatio temporu, uel regionis, aut loci, uel aeris et his similiu, illa superfluitas mutatur, et putrescens morbos generat. Et quia in hoc loco nostre disputationis est finis, et nostra absolute compleuimus disputationem, oportet nos ergo de unaquaque febre aliquid dicere. Incipiendum est ergo ab ephimera, que fit in spiritu, sed de ipsa pauca, quia eius disputatio et significatio ad aliarum febrium comparationem, facilima est, et eius curatio leuissima. Ipsa tamen est quandoque causa aliarum febrium, et nulla alia est causa ipsius.

Kk 2

tamen

tamen non transit unū diē, & raro ad quarrū diem accedit, possibile tamē est ut causa ephimere in corpore diu manātis, uratur sanguis et febris nascatur cōtinua, & aliquando mutatur etiā in Causon. Causa eius fit multis modis, de quibus dictum est paulō ante. Habet tamen tres significationes, quibus à febribus putredinum differt. Vna, quia calor ephimeræ est lenis & suavis, quæ cum ad statum uenerit, nullam facit angustiam aut laborem naturæ. caret enim materia in qua natura laboraret ad digerendum & expellendum. Secūda, quia urina habentiū ephimeram, est quasi sanorum, in colore, liquore, hypostasi, quæ licet inter se differant, modica tamen erit discordia eorum in colore & rubore. Tertia, quia pulsus ephimeræ nō differt à sanorum pulsu, nisi in dilationibus, uelocitate, & constrictionis tarditate. Tarditas enim constrictionis pulsus significat materiam in corpore partem arteriarum constringentem, ut illa exterius expellatur, uelocitas uero pulsus acutam & calidam innuit qualitatem, unde necesse est ut natura organorum partem uelociter dilatet, ut multam aëris quātitatem attrahat, per quā illius qualitatis acumen refrigeretur. Ephimera enim febris, quia fit ex sola qualitate, id est calore sine materia, non est sibi necesse ut constringat ue-

gat uelociter partē organorū, quia non habet quod expellat, proinde fit motus pulsus in dilatione ad attrahendā aëris subtilitatē, qua calor refrigeratur plus & uelocius, quā cum pulsus constrictione.

De febribus tabidis, quas recentiores putridas uocant. Cap. II.

Quemadmodum tradunt Græci & Latini.

I Abes mutatio est in corruptionem præsentis essentiae tabidi corporis, à contrā naturam calore producta. Causa uero cōtinuarum febrium est, quod humores extra uasa nō excidant, aut copia, aut crassitudo, aut ipsorum tenacitas. Quemadmodum igitur aliqua inanimata corpora contabescunt, antequā eijciamus ab ipsis quantum iam contabuit, inde reliquum diu custodimus in aëre frigido flatus refrigerantes meditati, eodem modo medebimur tabi in humanis corporibus, quod iam corruptum est exinaniendo quoquo modo. Reliquum uero gestantibus mediocribus, & difflationibus refrigerantibus in integram & naturalem mediocritatem, reducendo curamus. Quare primum trademus de febribus neutiquā deficientibus, inde ex ordine reliquas prosequamur. Continuæ febres eiusdem sunt cuius etiam deficientes, generis. Eiusdem equidem uoco tertianæ quidem in

Kk 3

tegra,

tegræ, integrum Causon, amphemerino autē quoti-
dianum, paroxysmum non cessantem in non ferui-
dum æstum. Nam cum sincerus causus cunctas alias
custodiens integræ tertianæ depræhensiones. Solū
uero neq; in rigores se immittit, neq; ad non feruidū
æstum cessat, ab illa distat, quæ quotidie paroxys-
mum exuscitat. Similiter cunctæ habent depræhen-
siones, ac integræ amphemerinæ. Quod uero in
non feruidum æstum cessat, eiusdem cum eis est ge-
neris. Hæc autem ratione, quæ ex quartæ febris
est exuscitata, ad non feruidum uero æstum neuti-
quàm cessans, eiusdem generis est cum quartana.
Certum autem est rigorem paroxysmos non ante eis
re, neq; sudorem consequi, sicut ne quidem causum
in singulis paroxysmis. In causo nanque rigore ad-
uentante soluitur ægritudo. Differt autem Causus
ab intabe synocho, quod ille in putrido sanguine cō-
sistit, & à principio absolutionis usq; in finem unū
habent paroxysmum. Causus uero in flaua bile
tabidus conflagrat, & tertio exuscitatus habet æ-
stus in minutionem quandam, & ueluti remissio-
nem, at synochus consimilis sibi est quo ad resolu-
tur. Est igitur in flaua bile tabida succensa conti-
nua febris ætuosissima, quæ neq; medicis, neq; lan-
guentib. seriem tenens. In his namq; lingua arida et
nigra,

nigra, à primordio, uellicatio uentris ingens, & si
tis intolerabilis, atque uigilia, & quandoque deliri
um. Primum igitur ipsi consolando & suadendo o-
portet inhaerere. Cum uero ad urinae peruentum
fuerit signa & concoctionis, & pubescit ægritudo,
tum demum est contentiose instandum, & ad frigi
de aquæ potum perueniendum est, nisi ex eis quæ
dicta à Galeno sunt, aliqua prohibeant, quo minus
aqua frigida præbeatur. Prima causo ardentium
sunt auxilia, declinatio ex locis refrigerantibus, be-
ne spirantibus, aëre puro respirantibus, stratumq;
molle, & densum recenter instructum, circundu-
ctiones continuæ, permutatæ, & satis tenues, &
non sordidæ, latitudinem largam habentes, ut ali-
as atque alias primitus calefactis membra transdu-
cantur, flabello continue dimoueatur aër, sed epi-
themata ipsis conueniunt in pectore, stomachoq;
imposita, diffundantur circa ægrotum folia saliz-
cum, & in hac & in biliosa omni febre, circumuo-
luantur aut herbis frigidis singulis micæ panis, uel
farinæ. In uehementissimis autem causis etiam ace-
tum paucum circumfundere non crit alienum, erit
nanq; efficax, uictus autem admouendus causo de-
tentis ex humidissimis cibis, nihilq; acutum habenti-
bus, ut caulis lactucarum decoctus cum oxycrato

Kk 4 aquoso,

aquoso, uel exhibeatur ptisanæ succus tenuior absque sale, aut altera mixtione. Vbi cōfidimus nos ali quod intestinum non oblesuros, sinceram, puramq; frigidam aquam damus, in quibus autem metus aliquis etiam perexiguus impedimento est. Primam utiq; potionem proferemus potū, inquam, frigidū quassatum. Quatitur autem ac frangitur, si quis eu crati calidi cyathum unum cum quinq; misceat intē perati frigidi sinceri liquoris. Hoc nanq; corpori bus apponitur ualde suspectis. Quod si neq; remedia prodesse possunt, neq; quicquā humanum, ad naturæ Deum, qui cuncta produxit tollendus animus est, illius unicum semper est auxilium. Is nanq; cum præstat, & uult, & potest optimus usq; quaq; bonis succurrere mortalibus.

Pœnorum & Arabum traditio.



Auson est febris magnum corpori præstans incendium, cuius signa sunt hæc: Sitis nimia & continua, dolor incensiuus, molestissimus naturæ, repugnatius et ab initio corruptius, propter acumen materiæ unde generatur, materia enim acuta est & ignea & cholericæ in concauitate uenarum, quæ cordi uicinæ sunt, adu nata maxime in uenis oris stomachi & concauitate epatis

epatis & pulmonis. Isaac filius Salomonis. Differt
causon à tertiana quæ est intra uenas, quia tertianæ
cholera est in uenis à corde remotis. Sed Causon
cholera de qua generatur, magis est in concavita-
te uenarū quæ sunt in corde uel sibi uicinantes, hoc
testatur duritia febris, furiositas suiq; acumen, &
fortitudo, & continuatio sitis. Causa uero fortitudi-
nis & acuminis et continuitatis febris est hæc, quia
materia est in uenis quæ sunt in ore stomachi & in
epate. Quod est duobus modis: Vno, quia est acutis-
sima & feruentissima, sua enim materia cholera ru-
bea est cum nulla humiditate mixta. Est et alia quæ
non est tanti feruoris, quia materia sua est cholera
citrina cum quadam portiuncula phlegmatis, scili-
cet commixta, proinde antiqui uocauerunt primam
Causon propter suam uestionem. Eius enim materia
est de pura cholera ardentissima. Secundam uero
nominauerunt acutam absolute, quia materia eius
est aliquantulum sanguinolenta. Auicenna: Causon
est de genere continuæ, quoniam differentia inter
eius uehementiam & eius teporem est insensata,
& accidentia eius sunt uehementia. Et causa in eo
est acuitas materiei, et multitudo eius, cum eius cau-
sus sit circa cor, & in uenis oris stomachi, aut in
partibus epatis propriè, & ad summum in mēbris

Kk 5 nobilibus

nobilibus uicinis cordi. In tertiana uero periodica cholera est in carne, & ad partes cutis, & in continua cholera est sparsa in uenis corporis quæ elongatur à corde. Rasis: Causon de genere est tertianæ, ea tamen fortior existit, & maioris caloris. Quæ quidem una die fit ualidior, alia uero minus calida. A corpore tamen non separatur, neq; horripilatio cum ea accidit, neq; sudor nisi cum recedit. Alia autem tertianæ accidentia sunt cum ea, uehementiora tamen & firmitiora. Lingua præterea ac labia citrina fiunt, aut denigrantur, aut absq; dubio exasperantur, si febris non ualde fuerit fortis. Asperitas uero linguæ cum panno lineo fricetur, deinde psyllij muscilagine cum saccharo lambendo hauriat. Nucleus quoq; pruni parum adhuc carnositatis retinens, in ore retinendus detur, & panni aqua rosacea infusa epati ac cordi in pluribus superponantur horis. Serapio: Differentia inter tertianam assiduam & comburentem est, quod tertiana assidua fit ex inflammatione cholerae, & eius ebullitione in eis, & in omnibus instrumentis, & in reliquo corpore æqualiter. Et in comburentem est inflammatio, propriè in instrumentis quæ sunt in circuitu cordis. Et quandoque accidit causon sicut dicitur in libro subuenientium ægritudinum, ex phlegmate salso.

Ex

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.

Dicitur Causon febris incensua, insultum
& impetum magnum faciens secundum
naturam, quia fit de cholera ignea acu-
tissima, pura in uenis cordi propinquis. Et habet
quædam accidentia inseparabilia & propria, per
quæ ab alijs febribus distinguitur. Habet & accide-
tia & alia contingentia sibi, & alijs febribus perti-
nentia. Propria autem & inseparabilia sunt accide-
tia, uehementia acuminis in calore, fortitudo & du-
ritia intolerabilis, adustio corporis, & nimia sitis
quæ in statu uehementissime sunt incensa. Acciden-
tia uero inseparabilia ei & alijs febribus cõmunia
duobus modis sunt, aut sunt signa significatiua salu-
tis, aut timoris, aut deperditionis, aut desperatio-
nis, quæ Isaac in libro febrium continuat ordinate.
Signa autem salutis his uersibus comprehenduntur.

Vis, leuitas, sensus, mens, somnus, spiritus, ieiunium,

Appetit, & calor est equalis, coctio fluxus.

Accidētia uero timoris significatiua sunt duob. mo-
dis. Quædā enim solū timorē significant, quædā ue-
ro perditionem manifestam. Signa solum timorem
significantia his uersibus possunt notari.

Aestuat atq; sitit, uigilat, stupet, est febris ingēs.

Et

Et calor est uarius, uomitus, fex ignea, crudus
Est liquor, & limus in dentibus, & cruor exit,
Insanit, sudat, febris acrior, & sitis instat.

Signa uero perditionis hæc sunt:
Virtus pulmonis, cordis, stomachi, cadit, hæret.
Anxius, insanit, sudore, cruore fluente
Naribus absq; crisi, riget, icterus, alget, & absens.
Est sitis, osq; sonat, plorat, decoctio cessat,
Liuor in extremis apparet, fronte citrina,
Est urina minor egestio cruda liuescit.

In Causone fit diæta tenuis, quia cito uenit ægri-
tudo ad statum, & attendatur uirtus ægrotantis.
Detur ergo mica panis bis uel ter lota in aqua cum
sacharo, & bibat ptisanam colatam, deturq; etiam
succus granatorum acetosorum, quia feruorem ca-
loris reprimit, sitim mitigat, materiam digerit, &
detur syrupus de aqua melonis palestini factus. Sit
domus lata, habens Septētrionales portas. Spargā-
tur ibi frigida herbæ, ut mirrhæ, uiolæ, frondes sali-
cis & arundinis, fiat ibi cursus aquarū cum aliquo
instrumento. Indumenta sint leuia, & non phlebo-
tometur nisi forte carnosī, & qui sanguine fuerint
pleni, post septimum diem adiūgatur rheumbarba-
rum syrupis infrigidantibus ʒ. 2. uel ʒ. 1. & ponā-
tur sero in aqua endiuie & in aurora coletur, &

cumb

cum syrupis conuenientibus offeratur. Purgentur cum decoctione uiolarum & prunorum, casiae fistulae & thamarindorum, & si fortis fuerit aeger, purgetur cum decoctione myrobalanorum citrinorum. Consuevit superuenire phrenesis, ideoq; si alienare coeperit, radatur caput & lauetur cum succo apij & aceto, fricentur extrema, & fiant auxilia phreneticorum quae superius diximus capitulo de phrenesi. Et si post materiei digestionem aqua frigida in multa quantitate bibatur, consuevit prodesse. Nam & calorem mitigat, & uomitum prouocat. In tertiana continua eadem est curatio, ut in Causone, nisi quod in tertiana continua mitius frigidis expedit uti. Dentur clysteria lenitiua ut: Recipe maluae, uiolarum ana. M. i. aquae fluuiialis lib. i. s. fiat decoctio ad consumptionem tertiae partis, cui addantur olei uiolati ℥. 3. casiae fistulae nouiter extractae ℥. i. salis ℥. s. fiat clystere. Statim ergo cum occurris infirmo in febre acuta, fac lenitiuum clystere ad utilitates multas, etiam ut intestina praeparantur solutioni, fienda in crastinum per solutiuum. Lenitiuum per superius potest dari. Nam aliquando clysteria plus ledunt, quam lenitiua per os, ut saepe uidi. Recip. Casiae fistulae nouiter extractae ℥. 10. aut ℥. i. aquae hordei ℥. 4. cum aqua dicta Casia extrahatur. Item aliud: Recipe

cipe manne ℥. 1. syrupi uiolati ℥. 3. aque hordei ℥. 2. Minoratiuum commune quod dicitur tale, quoniam materias communes, siue in uis communibus existentes, ut sunt stomachus & intestina, euacuat: Recipe thamarindorū ℥. 5. uel loco illorū tantūdem prunorū, decoquantur in ℥. 10. aque usq; ad consumptionem tertiæ partis, & coletur et fortiter exprimatur, de qua colatura: Recip. ℥. 4. & adde manne ℥. 1. uel casie tantundem si manna careres, & hoc magis respicit cholera. Et si uolueris sanguinem à cholera mundificare, pone thamarindos in decoctione, quod si phlegma & cholera, sed principaliter phlegma, adde agaricū in dicta decoctione, & cum thamarindis bulliant ℥. 2. agarici nō pistati, sed incisi non multum subtiliter. Minoratiuum proprium cholerae, & maxime respiciens cholera tanquā peccantem materiam: Recipe decoctionis supradictæ thamarindorum ℥. 4. aut. 5. manne ℥. 1. uel casie tantundem, succi rosarum ℥. 2. uel loco succi rheubarbari electi ℥. 1. quod si fuerit phlegma: Recip. casie ℥. 1. electuarij Indi ℥. 1. s. extrahatur cum decoctione lupulorum, sebesten & thamarindorū. Ponitur aut hic (ne uacuis recedas) digestiū et extinctiū febris acutæ: Recip. Oxyzacchar simplicis ℥. 4. succi arāciōrū ℥. 4. seminū commu-
nium

niū frigidorū maiorū mundatorū ℥. 2. seminis endiuiæ, lactuce, ana. 3. 2. aquarū endiuiæ, lupulorū ana. 3. 3. acetosæ ℥ 3. nenupharis unc. 3. uiolearū, rosarū ana. unc. 2. pistanda pistentur, deinde omnia misce & leniter ebulliant, deinde aromatizentur cum pauco santalorū rubeorū & corallorū ana. & omnia sic ad colatoriū ponantur, quo digestiuo uti debet febriens usque ad statum inclusiue, dando de eo unc. 1. in aurora ordinate, & frigidis temporibus calidis, & calidis temporibus frigidis, et infra diem & noctem pluries ac abunde ut uoluerit.

Tertianæ synceræ cognitio.

Cap. III.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Gignitur tertiana ex flaua bile putrida, & commota & extra uasa delata. A principio statim rigor non segnis insertur, qui à quartanæ rigore differt, quod in tertianis compungere uideatur, corpusq; sauciare. Nam in quartanis iniectio in frigiditatem euadit magnā, & magis ad intima penetrat, at amphemerinum rigor frequenter præcedit, at magis refrigerantur. Est etiam in tertianis febril. series integra, pulsus & æqualitas, suscitatur aut in ascensionib. paroxysmorū pulsus in uehementiā ac magnitudinē, et densitatē, sitimq;

sitimq; fert homini præsertim in uigore et ardore,
ut enudentur & abijciat languens pallia, & multū
& spisse respiret, & sufflet tanquā flāma aliqua,
frigidamq; aquam bibere concupiscat, et paulò post
calor æqualiter per uniuersum corpus extenditur,
& si in thorace manum ponas, prima quidem inie-
ctione cuncta calore multo & acuto concalescunt,
& tanquā uapore quodam sublata. Tum demum
languenti iam bibendi tempus est, quo potante con-
festim uis multa penetrat uaporis calidi per cutē,
sudores pronūcians uomitus apparet bilis, & aliū
subducitur. Urinæ his biliosæ & subrutilæ et flauæ,
& mediocriter crassæ, & aliquanto post, uel nebu-
læ albam uel eleuamen bonum efficiunt. Si urinæ
fuerint ignitæ, nec aliquod affuerit eleuamen, neq;
nebula in prima periodo ambituq; appareat, ægritu-
do ad septem usq; periodos extendetur, at sincera
tertiana primo die in urinis pronūciabit hyposta-
sim albam, & lenem & æqualem, neq; tertiam ex-
cedet periodum. Hæc febris in non æstuantem fer-
uorem desinit ad paroxysmum, totum tempus paro-
xysmi faciendo horis non pluribus duodecim. Hæc
demum sincera tertiana nominetur. Qui uero diu
turniore tempore, quā quod diximus, in paroxys-
mo oblanguerit, hanc protensam appellamus ter-
tianiā

tertianam, sin autem quotidie paroxysmus insurgat cum rigore ingenti, cunctaq; secum iam cognita febrat in pulsibus atque urinis, reliquoq; corpore, hoc duplicem tertianam nuncupamus. Id euenit ob multitudinem & crassitudinem, & bilis partium inæqualitatem, ut facile est intueri. Syncera autem tertiana in biliosis natura corporibus frequentissime consistit, & in florida ætate, præcipue æstatis tempore, & in calidis, aridisq; temperamento locis, & statu circumfusi nobis æris, cum uita in laboribus, in curis, & uigilijs, in æstibus, in uino austero minime diluto poto, in paucissimo nutrimento, eodemq; calido & arido, cæterum dulcium & calefacientium & arefacientium potuum, ac medicaminum usus immoderatus, facillime tertianam inuehit febrem. Abstinendum uero cum primum occupat febris, à dulcibus et acutis omnibus, et salsis et odoratis odore aromatico, edulijs et potibus, necnon ueteri et natura calido uino, his inquã tanquã à toxico abstinendum. Cibi sunt tradendi qui humectet, et refrigerent, ij nanq; synceris tertianis utiles, quãtitas autem erit quanta ab ipsis concoqui potuerit. Holerum autem congrua erunt triplex, blitum & malua et lactuca et buglossa et ptisane succus, ex piscibus saxatiles uolucrũ quæ mollis fuerint carnis,

Et gallorum testiculi, et porcorum pedes, et cerebrum, et ouorum uitelli absorbendi, fructus dentur minimè concoctu difficiles, uuae præmaturæ succus, pruna damascena. Huic feбри usq; quaq; syrupus acidus potu conuenit, syrupus uiolaceus, aqua ex hordeo cocta, aqua quoq; frigida, ut stomachi tamen ratio habeatur, aqua ex tertia uini parte cocta. At in non synceris tertianis, quæ plurimum calefaciunt, et arefaciunt, præcipuè uero aspersione absinthij uti licebit continuè post diem septimum, et oxymel potum multis profuit, aliquidq; purgationis adhibendū concoctione in urinis bona appacente. At in cibis uomitus prouocetur in huiusmodi lōgis febris languoribus, quibus feruntur à præstantissimis medicis multi plerunq; liberati, neq; statim à principio lauari bonum est, sed cum iam signa concoctionis apparuerint. Quies eis confert, et consoueantur eorum hypochondria, sorbitionesq; bene concoquantur, clysmata inferni uentris non admodum mollia. Cæterum etiam aliquid secantis admittatur, utpote crassiorem subiectam bilem, nec admodum calidiorem, præcipuè congruet ipsis ptisanæ succus iniecto pipere, et hyssopo quandoq; uel origano coquendo cum mellicrato dato potionē, aliāq; quæ urinam moueant.

Ex

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.

tertiana febris aut de re naturali, aut de re extra naturā nascitur. De naturali cū calida & sicca est natura infirmi, cui cholera dominatur rubea. Aetas est iuuenilis, tempus anni, ætas, aër calidus & siccus. De non naturali, cum infirmus antequā ceciderit, calidum aut siccum comederit, & habet tristitiam, angustiam, uigilias, laborem nimium, longi temporis ieiunium, ars eius ferraria, aut fornacina. Quæ omnia corpus calefaciunt & desiccant, & cholera rubeam generant. De re extra naturam, quia quædam febris cum calore est fortis, & sicut cuspis acus pungibilis, quod ex cholera rubea est acumine, calor eius in tactu fortis & acutus atq; pungituius, pulsus in initio periodi paruus & defectus atq; rarus, sed tamen non permanens nisi per paruum tempus, & in magnitudinem & diuersitatem mutatur. Magnitudo eius quia cholera rubea est leuis, nec grauat uirtutem, & item ex magna necessitate refrigerandi calorem. Urina eius est ignea, & est cum siti nimia. Angustia cum uomitu cholera rubea, & nimio sudore propter subtilitatem materiae, aliquādo succedit digestio cholera rubea, & cum has significa-

Ll 2

tiones

tiones inuenias, aut eorum plurimas, iudicanda est esse uera tertiana. Auicenna: Pura tertiana est subtilis, leuis, cuius paroxysmus cōsumitur à quatuor horis usq; ad duodecim, & non addit super eas multum, & si addit additione multa, tunc non est pura, & est secundum plurimum perueniens ad horas septem. Et calefit corpus in ea uelociter, & uides caliditatem procedere ex corde, & extremitates adhuc sunt frigide. Pura non addit cum non accidit error super septem periodos, & quandoq; cōsumitur propter subtilitatem suæ materiæ in paroxysmo uno in quo accidit uomitus, aut uentris solutio mundificans. Apparet digestio in urina prima die, aut tertio, aut quarto, aut septimo. Et cū uides principium cum rigore, & statum cum sudore exuberante, tunc non dubites quin ipsa sit pura. Et cum non pura inuenitur grauitas plurima in capite, & extensio, et prolongatur rigor donec perueniat ad horas. 23. aut. 30. usq; ad horam suam, & tepescit donec complentur. 48. horæ. Et per quantitatem additionis paroxysmi super duodecim horas, est eius elongatio à puritate. Et in tertiana quidem non pura tardatur apparitio digestionis, & non apparet in forma obfuscatio, neq; extenuatio, & accidētia sua minorantur in ea. Serapio: Et oportet ut inquiras

quiratur etiam de cholera citrina, et cholera nigra, quomodo est possibile ut putrefiant cum ipsæ sint sicca. Et causa dicitur esse in hoc, quoniam illa quæ dicuntur sicca, aut sunt sicca in corporibus suis, diuersa in complexionibus suis, sicut lapides & ferarum, & quæ sunt illis similia, aut sunt sicca complexionibus suis, humida in corporibus suis resoluta, sicut mel & uinum & cholera citrina, & cholera nigra quæ putrescunt propter humiditatem corporum suorum & eorum resolutionem, non propter complexionem suam & uirtutes. In febre autem tertiana pura ea quæ fiunt sunt due res, scilicet malitia complexionis materie, & multitudo eius, ergo cogeris adhibere contraria eis simul. Quod est, quia tu contraria adhibes malitiæ complexionis calidæ & siccæ, per illud quod infrigidat & humectat. Et adhibes contraria multitudini materie per euacuationem. Rasis: Si æger fuerit debilis aut delitiosus, & tempus fuerit æstas, circa unamquamque noctem pōdus 3. 10. thamarindorum, & pruna sicca, & grossa. 20. sumantur, & in duabus libris aquæ usq; quo sint dissoluta coquantur, deinde manibus fricata colentur & misceantur, huic colaturæ sachari taberzet 3. 10. & in potu antequam dormiat sumatur, cumq; mane factum fuerit, & sol eleuari cœperit,

ex aqua ordeï secundum magnam quantitatem bibat, & in loco bene quieto uel olente moretur, donec cibus digeratur, deinde ex oleribus frigidis in quibus non est amaritudo nutriatur.

Ex traditione autorum recentium.



Ausa putridæ febris calor est extra naturam operans in fece chimorum, quæ fit de tertia digestionem in omnibus membris facta. Quæ fex ideo est, quod accipimus siue sit potus uel cibus, uon sunt omnino laudabilia, unde cibi uenientes ad stomachum, & facti quasi ptisanum, e par trahit colamentum eius ad se, quod digestum & in sanguinem conuersum, mandatur membris ut ex eo nutriantur quod suæ conuenit, complexioni. Fex autem quia non conuenit, per poros in fumo & sudore expellitur. Quod si membra sint defecta ad expellendum fecem propter mutationem suarum uel complexionum uel compositionum, uel propter oppilationem pororum, uel propter grauitatem materiæ si fuerit multa in quantitate, aut grossa, aut uiscosa, fex permanet in concauitate membrorum & raritate eorum, sicut pulmonis

nis & splenis & concavitate uenarum stomachi et
similium. Quæ si mouetur in quibusdam temporib.
aut propter mala cibaria eius qualitatem augmen-
tantia, aut propter æris mutationem & similia,
odio tenetur à natura propter sui corruptionem,
nec regit eam, quæ sine regimine permanens, cale-
fit in interiore corpore calore suo & fumositate,
proinde bullit & calefit & putrefit sicut humores
cadaueris bullientes corrumpuntur & putrescunt,
cum naturalem perdiderint calorem & regimen
naturæ. Quæ putrefacta, generat febrem secundum
suam complexionem unde naturam accipit à suo e-
lemento. Si enim materia sit cholericæ, ueram ter-
tianam generat duodecim horas tenens, & trigin-
ta sex requiescens. Si sit phlegmatica, amphemer-
nam facit, & octodecim horis mouetur & .6. quie-
scit, quod si sit melancholica, quartanâ generat quæ
24. horis mouetur et affligit, et .48. quiescit. Causa
diuersitatis harum grauitas uel leuitas est materiæ ad
putredinem conuenientis uel inconuenientis, sicut
dicitur de synocha, quæ fit ex putredine sanguinis.
Omnis enim putrefactio non fit nisi cum calore &
humiditate. Quæcunque igitur materia huius
fuerit complexionis aut ei uicina, fit facilius ad
putrefactionem, contraria uero contrariæ.

Vnde quartana quia materia eius frigida est & sic
ca, & causa putredinis calida & humida, re-
pugnat putredini cum utraq; qualitate. Dimissio e-
ius est. 48. horis, & motio. 24. necesse est enim ut
calor extraneus. 24. horas habeat in mutanda illa
una qualitate, necesse etiam sunt alie. 24. in mutan-
da alia qualitate. Quod si aliqui nos reprehendat
dicentes, quare iste terminus non est maior uel mi-
nor. 24. horis. Respondemus: Quia omne quod ge-
neratur sub lunari circulo, est ex quatuor elementis
adinuicem compositis. Destruere enim est conuer-
sio unius in aliud. Verbi gratia. Item cum destrui-
tur corpus, humores reuertuntur in aquam, spiri-
tus in aërem, ossa in terram. Actio enim elementor-
um adinuicem facta fuit propter motum solis &
lune, & stellarum motum habentium. Sol quoque
est causa ceterorum, & dominator, & cursus eius
ab ortu suo exiens & usq; ad eundem rediens, non
manet enim nisi uigintiquatuor horis, unde si mate-
ria in aliqua parte putredini obediat, fit tempus a-
ctionis eius certius. Ideo tertiana, quia calida et sic-
ca est materia, & cum una qualitate, id est, calore
conuenit putredini, & cum alia non, necessario ca-
lor extraneus moratur in tertiana. 26. horis in mu-
tanda siccitate in putredinem. Vnde si querant alij
cur

cur calor extraneus in quartana. 24. moratur ad
unam qualitatem, scilicet siccitatem, et in tertiana ad
eandem siccitatem moretur. 36. horis. Respondeo,
quia siccitas corporis duobus modis fit. & ut cum ca-
lore, aut cum frigiditate. Calor autem desiccet cor-
pus, quia illud rarificat, & humores desiccet, frigi-
ditas uero materiam coadunat & congelat, unde
humor in ea clauditur, ad quem calore extraneo ac-
cedente constipata aperitur materia, & humor e-
ius defluit, putredini obediens. In ea autem quæ
propter calorem est desiccata, quia humores non
sunt in ea clausi, nec coagulati, necessario calor
extraneus tardatur in ea liquefacienda & diuiden-
da. Similiter si opposuerint de amphimerino,
cur amphimerinus sit facilius putredini quam ter-
tiana, cur etiam repugnet putredini cum una quali-
tate, id est frigiditate? Respondeo: Phlegma esse san-
guinem secundo coctum, & in albedinem & frigi-
ditatem mutatum, uel ut alij uolunt esse sanguinem
diminute coctum, uidemus enim naturam mutare
menstruum sanguinem in lac in mamillis, & in sper-
ma in testiculis. Ideo natura mandauit phlegma cum
sanguine per totum corpus, nec clausit illud in ali-
quo loco, sicut utranque choleram. Quia aliquando
corpus ex eo nutritur, cum paupertatem sanguinis

LI 5 habue-

habuerit, ergo phlegma erit continuatim obediens putredini sicut sanguis, nisi propter paruitatem sue frigiditatis, in qua calor extraneus aliquanto tempore moratur in mutando illius qualitatem in putredinem. Propterea dicimus febrem tertianam de choleric humore & putrido nasci, propter id quod diximus. Quia cholera cum dominatur corpori, aut putrescit, aut non. Quæ non putrescit, aut est in toto corpore, aut in uno membro. Si sit in toto corpore, icteritiam generat sine febre. Quæ autem est in quibusdam membris, facit tyriam. Putrefacta autem aut est in toto corpore, aut in uno membro. Si sit in uno membro generat apostema, quod dicitur erysipelas. Si sit in toto corpore, aut est intra uasa, aut extra. Si sit intra uasa, tertianam sine rigore generat aut causon. Si sit extra uasa faciet tertianam interpolatam. Ea enim materia quæ est intra uasa non facit rigorem, eò quod est in uasis clausa, non potest transire per loca sensibilia & pungere ea. Rigor enim non est aliud nisi materia pungens membra sensibilia. Sed hæc febris licet sit cum interpolatione, in die tamen dimissionis non quiescit, sicut ea quæ est extra uasa, quia materia eius est mixta cum sanguine, &
cum

cum eo mouetur, sed tamen in die illa tranquilla mitigatur aliquantulum, unde à die exacerbationis differt. Et mouetur cholera de tertio in tertium, phlegma omni die, & melancholia de quarto in quartum. Et causa est hæc, uidelicet quedam proportio inter ipsam naturam & ipsos humores. Et prout natura propinquior est ipsi humori, & humor ipsi naturæ. Et quantum inter eos maior concordantia & conuenientia & amicabilitas consistit, & minor mutabilitas, tantum natura citius ad ipsum mouetur, & ideo citius mouetur ad sanguinem, secundo ad phlegma, tertio ad choleram, quarto ad melancholiam. Sufficit quantum diximus de signis tertianæ. Oportet nos plane dicere, quare & quomodo cholera rubea recipit putredinem, cum eius natura calida sit & sicca, quia diximus quod putredo non est nisi caliditatis & humiditatis. Iterum diximus quod quedam sunt naturaliter sicca, & substantia eorum est liquida sicut mel, uinum, cholera rubea, aqua salsa & similia. Sunt etiam quedam in natura humida, & in substantia sicca, sicut piper longum, zingiber cicer & similia. Sunt & alia in natura sicca & dura, & etiam in substantia, sicut ferrum, lapis & similia. Quod ergo in substantia est siccum, & in natura humidum, recipit putredinem, quia calor extraneus

neus humiditatem in eo inueniens, dilatat eam faci-
ens eam fluere. Item dicitur quod omnis ebullitio
& perturbatio quæ sunt extra actionem naturæ, fa-
ciunt putredinem. Quod etiam in natura est siccū,
& in substantia liquidum suscipit putrefactionem,
quia calor extraneus inueniēs liquorem in eius sub-
stantia dilatat, & facit eam fluere. Quod autem in
natura et in substantia siccum est, nunquā recipit
putredinem. Nam ex utraq; parte siccum est, proin-
de calor extraneus nullam in eo inueniens humidi-
tatem, fit causa eam sicciolem & duriolem facere.
Palām ergo intelligimus, quia quod in suo corpore
fuerit humidum, suscipit putredinem, licet natura-
liter siccum sit, unde cholera rubea, licet in substan-
tia sit liquida, in natura tamen est sicca, recipit er-
go putredinem. Similiter & cholera nigra: Palām
ergo est quod cholera rubea & nigra non recipiūt
putredinem, propter earum complexionem & na-
turam, sed propter substantialem humiditatem illa-
rum atq; liquorem. Et quia cōpleuimus causam pu-
tredinis cholerae rubeae absolute, oportet nos diffi-
nire speciem cholerae quæ recipit putredinem, &
quæ non. Vnde dicimus choleram rubeam diuersis
modis esse. Est enim naturalis, & non naturalis.
Naturalis est rufa habitans in felle, et uirtus eius in
epate.

epate. Non naturalis est in stomacho. Est autem diuersa, quia quedam est uitellina, quedam crocea, alia prassina, & alia eruginosa. Vitellina & crocea minoris sunt coloris & siccitatis quam rufa, quæ est naturalis. Prassina autem & æruginosa maiorem habent calorem & siccitatem quam naturalis. Causa, quia naturalis cholera est ad stomachum ueniens, miscetur cum humoribus in stomacho existentibus, quod si fuerint laudabiles & temperati sicut humores qui oriuntur de pane bene fermentato, agno annuali, hœdulo lac adhuc sugente, conuertitur cholera rubea in croceam naturali uicinantem. Quod si humores quibus cholera est mixta, fuerint ad humiditatem & frigiditatem pertinentes, sicut ei qui nutritur de piscibus, mutatur cholera in uitellinam, ideoq; uitellina minus est calida & sicca quam crocea, & crocea minus quam rufa. Quod si inuenerint humores in stomacho calidos et acutos, sicut ij qui generantur ex pipere, sinapi, porris, alijs, & similibus augmentatur calor, & cholera fit prassij coloris. Si autem illa cholera in suo permanserit acumine, & calefacit eam calor extraneus, aut caliditas temporis, & aliarum rerum intenditur fitq; æruginosa. Crocea uero aliquando nascitur in epate, cū sanguis sit humidior q̄ decet, proinde naturalis cholera

cholera in iuuenibus est rufa, si in iuuenibus uero & pueris est crocea, senioribus uitellina, prassina autem impossibile est ut generetur in epate, nec transit à stomacho, nec generat febrem, quia non tanto tempore in corpore permanet ut putrescat & febrem generet. Natura enim semper se adiuvat, ut eam à corpore expellat propter eius malignitatem, quod si natura defecerit eam expellere nequies, incenditur corpus, & homo moritur. Ergo si talia de prassina accidunt, quanto maiora & sicciora de æruginea eueniunt. Neceffe est ergo ut rufa, crocea & uitellina, recipiant putredinem & febrem generent. Sed si materia febris fuerit uera cholera, id est rufa, generatur caufon. Si fuerit crocea, generatur tertiana. Si est uitellina, nascitur hemitriteus. Febris tertiana molestior est cæteris putridis febribus, propter acumen eius materiae, & quia est caufon uitellina. Quæ cum fuerit uera fit eius crisis in septem periodis, sicut Hippocrates dixit. Si non sit uera, transit hunc terminum & secundam materiam cum qua miscetur, fit longitudo sue determinationis. Quæ aliquando incipit in autumno & dimittit in uere. Solet autem patientibus in nocte euenire antequam accessio ueniat, angustia & uigilia, ueniente autem accessione, accedunt parua frigiditas, sitis &

tis & calor, unde oportet medicum in hac febre si-
bi cauere ab initio ut non det infirmo rem calefaci-
entem, ne materia calefacta cum sui acumine ad ca-
put saliat, & phrenesim generet fiantq; timor &
molestatio peiores. Cholerae enim rubrae acumen
& uelocitas non sustinent medici stultitiam & ige-
norantiam infirmi. Cura tertianae uerae, si mate-
ria est in stomacho, in principio detur syrupus ace-
tosus cum calida, aut uinum malorum granatorum
acetosorum coctum cum saccharo usque ad spissitu-
dinem, propinetur ieiunus cum calida. Dieta sit
panis & aqua lactis, scariola, malua, atriplex, spina-
chia, malagranata acetosa, pruna damascena, &
detur decoctio uiolarum & prunorum. Pro dolo-
re capitis, ungatur frons & tempora de oleo rosa-
rum et aceto uel populeon. Contra sitim et linguae
siccitatem, indigemus assiduatione in ore & guttu-
re patientis rebus prohibetibus exiccationem: Reci-
pe quatuor seminum frigidorum minorum, seminis
psilij, seminis citoniorum fortiter conquassatorum
ana. drach. 2. seminis bombacis mundati drach. 1.
succu liquiritiae unciam unam, fiant parui saccelli in
forma amygdalarum in latitudine tenues ligati,
qui saccelli madesiant in muscilagine, quarum
recepta sequitur: Recipe seminum immedia-
te di-

te dictorum ana. 3. 2. conquassata fortiter infundatur per horam in aquis nenupharis, capil. ueneris, cucurbitæ, cucumeris, et alijs similibus omnibus, uel quas habere poteris, & postquam aquæ & semina simul per horam steterint, uidebis supernatare muscilaginem, quam collige et post ibidem tempera sacellos dictos & pone unum in ore patientis, postquam ibidem parum steterit, abijce & remitte ut temperetur quousq; os sufficienter humectetur. Clysteria quoq; fiant quæ in capitulo de causone docuimus. Si materia est in ore stomachi, uomitus prouocetur cum decoctione atriplicum, seminis raphani aut cum syrupo acetoso. Quod si non sustinent uomitum, purgentur cum decoctione uiolarum, prunorum, thamarindorum addita casia fistula. Si non, cum decoctione myrobalanorum & infusione rhei barbari. Fomententur autem manus & pedes cum aqua ubi cocta sit malua, atriplex, uiolæ, rosæ & papauer. Et si materia est in epate, & urina sit spissa, phlebotometur de uena basilica, maxime si sanguis abundet, & fac minutionem post duas uel tres accessiones. Aër quoq; artificialiter sit frigidus, & equipar epithemetur si in eo est materia multum calida, fiat cataplasma de santalis albis & rubeis cum oleo uiolarum & rosis & spodio. Contingit quandoq;

doq; ut nimio uomitu ac uentris solutione molesten-
tur, ad uomitum itaq; compescendum spongia in a-
ceto infusa bulliente, & cum pulvere mastiches sto-
macho apponatur. Ad fluxum uentris comprimen-
dum fiat fomentum de plantagine, mirrha, corrigio-
la, roß. in aqua pluuiali. Utantur coctanis coctis. Fa-
cta purgatione si dolor capitis perseverat, detur ru-
bea in sero cum aqua tepida. In tertiana notha eis-
dem ferè curis uti debemus, nisi quod minus frigi-
da sunt danda. Quandoq; admiscenda sunt calida,
atq; in diebus quietis utantur uino aqua multa dilu-
to. Pullis, ouis sorbilibus, pedibus porcorum, & si-
milibus utantur, ptisana in qua bullierint carica, u-
uæ passæ, hyssopus, pulegiū. Ad materiei incisionē
et diuisionem, syrup. acetos. & oxyzaccara, & oxy-
mel. Ad purgationem aut eisdem decoctionibus uti-
mur, sed addimus polypodium, sem. anisi, maratri,
purgamus cum trisera saracenica, benedicta, picra
Galen. rheumbarbaro, post purgationem non solū
rubeam, sed & triseram magnam, aut auream, aut
methridatum administramus. Sed nunc aliqua po-
nenda sunt remedia magis specialia, tam in cura
tertianæ ueræ quàm nothæ. Syrupus magistralis in
tertiana uera: Recipe florum boraginis, buglossæ,
roß. ana. M. s. uiol. lactucæ, papaueris albi, endiuicæ,
M m scariolæ,

scariole ana. M. 1. sem. endiuie, lactuce ana. unc. s. sem. quatuor frig. ana. 3. 6. decoquantur, de qua decoctione: Recipe lib. 1. sachari 3. 3. aceti unc. 2. uini granatorum unc. 1. fiat syrupus, quod si uolueris facere longum, dabis de eo unc. 4. loco digestiui. Si brevis fuerit, siue debite coctus da 3. 2. cum aqua endiuie unc. 3. uel: Recip syrupi acetosi simpl. unc. 1. oxyzaccharae unc. s. aquae endiuie unc. 2. aceti 3. 1. et sic de alijs. Syrupus sancti Ambrosij facies sudare mirabiliter, et sitim extinguit: Recip. milij excorticati quantitate conueniente, et fac eum decoqui usque ad eius aperturam. Deinde: Recip. unc. 5. uel circa eius brodij ebullientis, et infunde uini albi odoriferi unc. 2. Et sic calidum da patienti, et bene eum tunc cooperias, sudabit mirabiliter, curabunt sic Mediolanenses, Et adhuc eo utuntur. Emplastrum factum ex fuligine, sale, apio aquatico super uolas manuum et plantas pedum positum ante accessionem per tres horas tolit illam. Item dicitur quod 3. 1. radices gentiane bibita cum uino ante paroxysmum tollit illum. Similiter succus hypericonis. Ista tamen sunt empirica, quibus non assentio satis, sed à Nicolo scripta inueni, Et propterea hic apposui. Solutiuum: Recip. Casie extractae cum aqua endiuie Et absinthij unc. 1. rheubarbari electi 3. 1. s. spicae uel squinanti grana. 4. misce. Da omni ho-

ra diarrhodon Abbatis. Ex expertis in febre tertia
na pura, est succus corrigiolæ tepidus bibitus ante
paroxysmū per horam, dosis. unc. 5. prohibet enim
paroxysmum in ea euenire. Idem operatur succus
uue acerbæ, si nouem diebus mane sic bibatur. Idem
succus cichorij Et tu hæc confice cum saccharo uel
iulep aliquo. Et si dantur unc. 4. uini granatorum
mizorum, uel acetosorum cum unc. 2. aquæ endi-
uiæ per horas duas ante accessionem paroxysmi, ip-
sum tollit aut minuit, maxime si cōtinuetur aliquib.
diebus. Tu tamen in hoc considera stomachi disposi-
tionem, & da deinde sequenti die euacuatium. Et
quando mixtio est ex cholera & phlegmate tenui
& cholera citrina: Recipe aquarum endiuie, scario-
læ, cichorij ana. unc. 1. s. absinthij, sceniculi ana. un-
cia 1. syrupi acetosi simplicis, mellis rosati colati a-
na. unc. 1. s. misce, uel si uis magistralē: Recipe endi-
uiæ, scariolæ, lactucæ, adianthos, hyssopi, cichorij
ana. M. 1. radicū sceniculi unc. 2. s. radicis apij 3. 1.
seminū endiuie, scariolæ ana 3. s. sachari q. sufficit,
aceti unc. 4. & fac longū aut breuē ut placebit, &
aromatiza cū cinnamomo. Ex solutiuis da casia ex-
tractæ 3. 1. cū 3. 1. s. turbith præparati, extrahatur
cū aqua absinthij & endiuie ana: Recip. electuarij
indi 3. 1. electuarij de succo rosarū 3. 1. s. cū aqua

M m 2 endi

endiuiæ, absinthij ana. ʒ. i. Confectiones & electua-
 ria compone ex calidis & frigidis, ut: Recipe spe-
 cierum aromatici rosati descriptione Gabrielis ʒ.
 i. s. specierum tria santalorū ʒ. 2. quia cholera ui-
 cit in uigore, sachari taberzet ʒ. 10. fiat confectio
 solida. Ex trochiscis conueniunt trochisci rosati mi-
 nores, maxime post dies. 14. Si fuerit ex cholera ui-
 tellina, consimiliter dic de simplicibus. Ex compo-
 sitis uero: Recipe syrupi acetosi simplicis ʒ. i. s. mel-
 lis rosati colati ʒ. s. aque endiuiæ, fœniculi ana. ʒ.
 2. Ex magistralibus: Recipe radicū fœniculi, aspa-
 ragi ana. ʒ. i. scolopendriæ, endiuiæ, scariolæ, asa-
 ri ana. ʒ. s. fiat decoctio & cum lib. i. s. sachari &
 ʒ. 4. aceti, uel si magis uis incidere aceti scyllitici,
 fiat syrupus longus aut breuis, & detur ut supra
 cum aliquibus ex appropriatis aquis aut sine aquis.
 Ex solutiuis cōuenit: Recipe diaphœniconis uel ele-
 ctuarij indi. ʒ. i. s. electuarij succi rosarum ʒ. i. Etia
 conuenit agarici ʒ. 2. uel turbith, manna pariter et
 casia secundum tenorem uirtutis. Et in hoc capitu-
 lo laudat Auicenna turbith, agaricum & scamoni-
 um, ualet & rheum barbarum & in substantia &
 in infusione datum. Et bene commendes memorie
 propter ægritudinem chronicam te oportere de de-
 bili ad forte procedere & sæpe replicare. Ex tro-
 chiscis

chiscis commendantur de eupatorio. Ex confectio-
nibus conueniunt diarrhodon, triasantalum, aroma-
ticum rosatum, de gemmis simul mixtis & cum sa-
charo fiat electuarium ut decet, et de ipsis plus aut
minus pone secundum quod uidebis. Et si fuerit nō
pura per admixtionem melancholiæ in se genitæ
per adustionem, tunc simplicia uideantur quæ con-
ferūt cholerae puræ & melācholiæ, et ex illis aggre-
ga, ut uerbi gratia magistraliter: Recipe florum uio-
larum, boraginis, buglossæ, rosarum rub. endiuie,
scariolæ, lactucæ ana. M. 1. sem^l. frigidorum maio-
rum, scolopendriæ, succi boraginis, succi pomorum
redolentium acetosorum ana. ℥. 3. succi fumiterræ
℥. 2. s. bulliant in lib. 6. aquæ ad consumptionē ter-
tiæ partis, & cū lib. 2. sacchari fiat syrupus cum ℥.
3. aceti scyllitici & clarificetur & detur de eo
plus uel minus, uel: Recipe ex compositis syrupis
uiol. 1. syrupi de fumoterræ ℥. 5. aquæ buglossæ ℥. 2.
aquæ fumiterræ unc. 1. misce. Ex solutiuis: Recipe
rheumbarbari electi ℥. 1. s. spicæ grana. 5. infunde
in aqua lactis, & modico uini albi, stetq; per horas
octo in infusione, deinde exprime, cui expressioni
addatur casia uel manna ℥. 1. extrahatur casia cū
aqua fumiterræ, boraginis, endiuie. ana. Confectio-
nes & electuaria fabrica, ut uerbi gratia: Recipe

Mm 3

specie

specierum electuarij de gemmis 3. 1. tria santalorū
 uel diarrhodō 3. 2. s. sachari albi unc. 10. Quod si
 fuerit non naturalis per admixtionē cholerae nigrae
 ab extra uenientis, cōsimiliter operare ex parte sim-
 pliciū, ut uerbi gratia: Recipe melissae, scolopēdriae,
 endiuiae, scariolae, florū boraginis, buglossae, uiolarū
 ana. M. 1. radicū fœniculi, petroselini ana. 3. 1. s. li-
 quiritiæ, rosarū, passularū ana. unc. 1. fiat decoctio,
 & cū lib. 1. decoctionis ponatur unc. 3. sacchari, &
 unc. 2. aceti, & fiat syrupus lōgus aut breuis, ut di-
 ctū est. Vel: Recipe syrupi uiolati acetosati unc. 1.
 de fumo terrae unc. 5. aquarū scolopendriae, buglos-
 sae ana. unc. 1. 5. De solutiuo: Recipe casiae aut man-
 nae unc. 1. diasenae unc. 5. uel electuarij hamech 3. 1.
 s. cum aquis conuenientibus, & da ut supra.

Amphemerini febris cognitio, à no-
 stris quotidiana appellata.

Cap. IIII.

Quemadmodum Græci & Latini tradunt.



Amphemerinon febris uocitata est, quod
 dici noctisq; spatia aliqua obtineat, in na-
 turis magis pituitosis residet, & hyber-
 no tem-

no tempore, & in statibus humidioribus et frigidioribus, senesq; & pueros magis infestat propter eadacitatē, et præcipue in humidis frigidisq; locis degentibus, & uitis segnibus cum saturitate, et n. agis cum in cibis continue sese lauerint, ac multo magis cum ipsa cibaria natura suapte sunt magis pituitosa, & manifesto inordinata. Febris igitur non cum rigore statim primo die inuadit, sed frigiditate circumcepti magis difficilem calorem habent. In pulsibus autem manifesta inordinatio, et inæqualitas cōsidet in paroxysmi inuasionē, præsertim motus crassitudo, & ipsis non est uehementia, neq; languētes hæc exurit febris, neq; in densum cogit respirare, neq; sufflare, seu frigus exquirere. Verū huiusmodi febres neutiquā siticulosæ sunt, sed uomētib. pituitosæ, & quæcūq; uentrē ipsis infernē exinaniuntur, frigidiora et pallidiora sunt crudiora, & magis aquosa ferè sese proferūt primis diebus. Hi neutiquā sudant, neq; ad pfectā à conflagratione immunitatē perueniūt, eorum color albus, urinæ albæ et tenues primis eminguntur dieb. post tū crassæ, tū turbidæ, is humor quotidie paroxysmū suscitāt. Conquiescit aut à cōflagratione immunis ppetuo horis decē & octo, nec multo secus, et p inde am̄ hemerinō est uocitata, quod diei noctisq; spatia aliqua obtineat. Cu

M m 4

rantes

rantes amphemerinum, oxymelle utimur post primos dies, & qui possunt bene urinas aduertere, & uniuersa uictus species sit secabilior. Prouidendum autem est uentri circa uigorem, præcipuè ori uentris cauendum, deinde euomendum à cibis & radiculis, & pituitam exhaurientibus utendum adminiculis. Cætera uero uictus sunt ad communes reijcienda intentiones, uictu, ut utamur tenuanti, & medicaminibus secantibus.

Pœnorum & Arabum
traditio.

Quia febris phlegmatica de materia nascitur frigida & humida. Nam phlegma naturaliter est frigidum & humidum, necesse est ut hæc febris curetur cum rebus grossorū humorum attenuatiuis. Sed tamen quia phlegma diuerso modo est, quia quædam species phlegmatis est grossior & frigidior naturali, & quædam calidior, necesse est cum materia est frigidior dari plus eam attenuantia, quàm cum fuerit calidior. Vnde medicum oportet inuestigare, ut certissime cognoscat quomodo eam debeat curare, & faciat hoc secundum oppositionem qualitatum. Res enim subtiliantes & attenuantes diuerso sunt modo in qualitate, quia est phlegma frigidum & humidū, & hæc species

Species est naturalis, quæ est de colamenti sanguinis aquositate, proinde sanguis nõ perfecte coctus, uel digestus, est phlegma. Est & phlegma frigidius & grossius quod dicitur acetosum, quod significat frigiditatem sanguini dominantem. Est & aliud calidius & leuius sicut salsum, quod ostendit calorẽ aquositati sanguinis dominari. Similiter attenuatiua diuersa sunt, quia quedam cum nimio calore & incensione sunt attenuatiua, sicut radices origani, calamethi, zingiber & similia. Sunt & quedam quæ attenuant absq; calore frigore, quemadmodũ maratrum, lupinum, apium & similia. Sunt & alia attenuatiua & acutum calorem extinguentia, sicut ptisanum, oxyzacchara, & his similia. Auicenna: Febris phlegmatica non est ex materia quæ faciat pũctionem, ita ut sit causa rigoris in uia expressionis, eius namq; putredo est rei lenis. In febre phlegmatica ex uitreo humore fit frigus propter illud quod non putruit, & horripilatio propter illud quod iam putruit, & maius eius frigus et ipsius rigor in sunt periodis status. Et multotiens incipit cũ syncope, et fit scilicet syncopis propter debilitatẽ oris stomachi, & casum appetitus & priuationẽ istimbæ, id est digestionis, quæ est fundamentũ materie nutrimenti & uirtutis. Illam autem quæ fit ex phleg-

M m S

mate

mate falso sequitur horripilatio, & nō fit uehemēs frigus eius. In hac febre diuersificatur eius passio à caliditate, scilicet in sensu tactus, sicut accidit in reliquis uiscosis cum bulliunt, ipsa enim disrumpuntur in quibusdam locis, & in quibusdam non. Et febres quidem phlegmatis sunt multæ oppilationis, & sudoris pauci, & cum sudare facit est res non exuberans. Et sitis quidem minoratur in febribus phlegmaticis propter causam falsedinis. Et significant eā ut sit paroxysmus eius decem & octo horis, & dimissio eius. 6. horis, & non est dimissio eius munda, quoniam materia cum multitudine & uiscositate est multa. Minor horarum sui principij secundum plurimum est decem & octo dierum, & eius eradicatio in pluribus est in traquadraginta quatuor dies, aliqui habent intra sexagintaquatuor. Saluior earum est illa, quæ est mundorum temporum, & præcipue illa quæ est multi sudoris, significat enim subtilitatem materiei & paucitatem eius & raritatem corporis. Rasis: Accidit autem hæc febris sæpius pueris, & mulieribus, & cunuchis, & corpora habentibus humida, & eis qui multum comedunt, & parum euacuantur, & parum exercitantur, & in temporibus, & in regionibus frigidis & humidis. Vrina uero in

ro in hac febre alba est & subtilis, aut rubea &
spissa & turbida. Et secundum maius in principio
est in prima dispositione, sed postea succedente tē-
pore in aliam mutatur dispositionem. Eiusq; inter-
polatio in pluribus in recessione diei contingit, &
iuxta noctem. Neq; cum sudore separatur, & præci-
pue in primis diebus. Sudor & si cum ea fuerit, erit
paucus & uiscosus. De uomitu uero ita sit ut res se
habuerit. Aeger uero non est fatigandus, ut hoc mo-
do omnino mundificetur, & ut prorsus inuestige-
tur. Ex medicamine quod fit ex turbith, quaq; no-
cte est ei dandum, quod: Recipit turbith fricati
& cribellati cum panno sericino drachmas 10.
mastiches, zingiberis, amborum ana. drachmā 1.
sacchari quantum de omnibus. Ex hoc quaq; no-
cte pondus aurei unius in potu detur, nisi uenter à
natura bis aut amplius inter diem & noctem solu-
uatur. Nutriendus uero est aeger ex aceto & oleo
abluto, & sacharo, & pauca mentha, & ex o-
leribus huic similibus. Quod si ægri uirtus debilia-
tata fuerit, pulli assati, & præparati in patella
dentur, & separentur à iure & micis. Et obser-
uandum est ne aquam frigidam patiens in hac febre
bibat, neque aliquid eorum quæ ei similia sunt, ex
rebus

rebus frigidis. Et hoc si neglexerit, febris fiet longissima. Constantinus: Significatio quotidianæ febris, aut de re naturali, aut non naturali, aut extra naturam est. De re naturali sicut si complexio infirmi frigida & humida sit, et sibi dominetur phlegma. Aetas eius, aut pueritia, aut senium. Pueritia, propter gulositatem. Senium, propter multitudinem phlegmatis in corpore eorum. De non naturali, cum infirmus in sanitate sua gulosus, multū quiescens, piger, sæpe balneans post cibum. De re extranaturā, cum infirmus sentit dolorem in ore stomachi & humiditatem in lingua, inflationem in latere mutato colore, sitis parua, rigorem & frigus nimium habet in extremitate corporis & diu. Cum autem tangas corpus in hora accessionis, non apparet calor nisi cum moratur manus. Habet enim calor humiditatem propter phlegma, parum acutus est propter putredinem, aliquando sudans parum, aliquando non.

Ex traditione autorum recentium.



Febris amphimerina, quæ quotidiana dicitur, de putredine humorum phlegmaticorum nascitur. Phlegma enim complexioni corporis dominetur, aut putrefit, aut non. Nā putre-

putrefactum aut est in toto corpore, aut in parte. Si fuerit in toto corpore, generat aut hyposarcam, aut frigiditatem continuam sine febre. Causa huius diuersitatis est fortitudo & defectio membrorum, quia membra cum fuerint fortia, expellunt paulatim illud phlegma, nec dimittunt illud coadunari ut hyposarca generetur. Quod si fuerint defecta, coadunatur in corpore, unde hyposarca nascitur. Si autem fuerit in uno loco, facit humidum apostema, quod zimia nuncupatur. Si autem fuerit putrefactum, aut est in toto corpore, aut in uno membro. Si est in uno membro, generat uulnera aut pustulas, de quibus humores saniosi fluunt & aquosi. Si fuerit in toto corpore, aut est intra uasa, aut extra. Si est intrinsecus, generat quotidianam continuam sine rigore. Si est extrinsecus, generat quotidianam cum interpolatione. Quam tribus modis intelligimus ut superius dictum est autoritate Constantini, sicut etiam de tertiana dicitur, scilicet re naturali, non naturali, & re extra naturam. Res naturalis, est ætas, cōplexio. Non naturalis, est tempus, regio, aër, & artificium infirmi. Res extra naturam, sunt accidentia quæ ex hac febre generantur, quæ sunt infirmo accidentia, medico uero significationes. Habet etiam hæc febris proprietates quæ sunt ab ea inseparas

parabiles, scilicet dolor stomachi, & splenis. Sed tamen maior est in stomacho. Proinde patiens euomit phlegma & facies eius fit tumida, & mutatur in liuidum aut plumbeum colorem. Os eius semper est humidum & insipidum, nec ullam patiuntur sitim, & si in statu sitierunt, fit modica, quæ sitis non est propter phlegmaticam materiam, sed accidentaliter propter calorem phlegma putrefacientē, sicut eis qui pisces & melones comederūt, hæc enim cibaria si calorem esse in stomacho accumulatum inuenerint, cito in eius naturam conuertuntur, & si tim generant, quia naturaliter sunt conuertibilia. Quod si ultimitas caloris in unaqua; febre uenerit, mutatur eius facies in citrinitatē, urina fit rubea et pulsus fortis. Hæc sunt propter calorem phlegma putrefacientē, cessante quasi calore cōuertitur facies eius in plumbeū & albū calorem, & urina in albedinē & cruditatē. Causa, quia materia est cruda, pulsus eius fit latus, tardus, diuersus & debilis. Latitudo propter abundantia & humiditatē materiæ. Defectio & tarditas propter paruitatem caloris naturalis. Diuersitas eius, quia natura aliquando materiæ dominatur, unde pulsum facit fortem, & aliquando materia naturæ dominatur, unde pulsus fit debilis. Veniente autem morbo ad finem & materia die

ria digesta, sit urina digesta & rubea & turbida,
& significat propinquitatem crisis. Quod si aliqui
nos reprehēderint dicentes: si natura febris est ca-
lida & sicca, & phlegma est frigidū & humidum,
quomodo ex eo phlegmate febris nascitur: Respon-
deo: quod nō dicimus febrē de phlegmate generari
secundū suam naturā propriam existentem, sed dici-
mus quod omnis materia phlegmatica, aut choleri-
ca, aut melancholica cū putrefit bullit & calefit, un-
de febris generatur, quæ si nō putrefit, febrē nullo
modo facit, licet naturaliter sit calida. Hoc uero te-
stificatur per ictericiā, quæ nascitur de cholera ru-
bea mixta cū sanguine per totū corpus, & tamē pa-
tiens nullā febrem patitur, quia cholera nō est putre-
facta. Palā ergo intelligimus quod phlegma nō ge-
nerat febrē naturaliter, sed propter sui bullitionē
de putredine procedentē, uerbi gratia, aqua calida
incendit, nō propter sui naturā, sed propter calorē
quē ab igne suscipit. Veniēdo igitur ad curā si phle-
gma intelligitur esse frigidius & grossius, medice-
tur cū calida & humectatiua medicina. Si uero phle-
gma fuerit calidius & lenius, curetur in initio cum
extenuatiuis & refrigeratiuis. Febre autem mitiga-
ri incipiente, patiens curetur cum re extenuatiua,
& non calefactiua, aut aliquanti caloris actiua,
quia

quia si data fuerint refrigeratiua calore febris de-
crescente, timemus ne materia induretur & ingros-
setur. Phlegma enim licet calefiat accidētaliter, na-
turaliter tamen recipit cito frigiditatem & humidi-
tatem. Item si calidas medicinas assuefaciamus, aug-
mentatur materia plusquā fuerat prius, quia si ca-
lorem consumat, frigidum suscipit, quanto magis
est paratum ad suscipiendum calorem cum acciden-
taliter sit calidū, proinde necesse est ut sit medici-
na mediocris, id est attenuās sine calore, aut cū mo-
dico calore, & hoc fiat ab initio, usq; dum materia
fuerit digesta. Cūq; signum coctionis in urina alijs-
ue locis apparuerit, festinari oportet ad expellen-
dum materiā extrinsecus, hoc enim si neglexerit, ti-
mendum est ne materia ingrossetur & induretur,
quia sicca est eius natura. Signū etiā coctionis si non
apparuerit in urina, quemadmodum si cruda appa-
reat, et alia signa monstrent motam esse materiam,
ne credatur urinæ. Possibile enim est ut cruditas u-
rinæ fiat ex cibi & potus inordinatione, unde nec
tuam actionem dimittas propter urinam, sed purga
materiā cū uentris solutiōe post digestionē secundū
q; oportet. Ex cōpositis usualib. in febre phlegmati-
ca ex phlegmate dulci: Recipe syrupi acetosi sim-
plicis ℥. i. aquæ fluuiialis coctæ unc. 3. sacchari ℥. i. s.

Transeō

Transco ad fortius, da oxymellis unc. 1. aquæ fœ-
niculi unc. 3. Item ulterius ad fortius: Da acetosi
de duabus radicibus cum aqua fœniculi, ut dictum
est. Et ad fortius: Da syrupum acetosum de quinq;
radicibus, uel syrupum de bizantijs cum aqua eu-
patorii, & cum aqua absinthij, & huiusmodi, ita
quod semper à debili ad forte, et sic procedas dan-
do ipsa digestiua de quinq; uel sex diebus in sex di-
es, & aliquando intercipe tempus ut natura quie-
scat à grauamine medicaminū, & ut uideatur quid
operabitur natura non impedita ab ipsis medici-
nis. Sicupis digestiuum magistrale fac sic: Rec p.
Eupatorii, absinthij, bedeguarana unc. 1. radicum
fœniculi, apij, liquiritiæ, passularum ana unc. s. ro-
sarum, ameos ana drach. 3. seminis endiuie, fœni-
culi ana drach. 2. bulliāt in libris quatuor aquæ us-
que ad cōsumptionem medietatis, & cum libra una
mellis despumati fiat syrupus, & maxime in hye-
me, æstate fac cum saccharo albo. Et hic attende,
quod ipsum est forte & conueniens in fine, mate-
ria digesta: Recip. Agarici, turbith ana ʒ 1. spi-
cæ, salis gemmæ ana grana quatuor, zingiberis ʒ.
s. infundatur in aqua mellis deinde sufficienter ex-
primantur, in qua aqua dissolue cassiæ, aut mannæ
hinc. 1. Ordinatur cōfectio de turbith hoc modo in

Nn cassiæ

casu commendata: Recip. Zingiberis 3. 3. galan-
ge, piperis longi ana scrup. 2. macis, croci ana 3.
1. turbith gummosi & electi drach 12. sacchari al-
bissimi librā unam, & cum aqua absinthij, & pau-
co uino citoniorum fiat confectio solida, de qua ca-
piat morsellum, dosis drach. 3. Ex confectioibus
conueniunt: Recip. Specierum aromatici rosati 3.
1. diarrhodon Abbatis drach. 5. specierum electu-
arij de gemmis scrup. 2. sacchari albissimi unc. 5.
fiat confectio solida cum aqua absinthij, de qua ca-
piat morsellum unum per horam ante pastum ma-
ne & sero. Electuarium ordina sic: Recip. Saccha-
ri boraginati, buglossati, uiolati ana unc. 4. pul-
ueris anthos drach. 1. specierum aromatici rosati
drach. 1. 5. diarrhodon drach. 1. specierum electua-
rij de gemmis drach. 5. cōfice & de auro de quo da-
bis ut de confectioe dictum est. Ex trochiscis spe-
cierum: Recip. Diarrhodon, cinnamomi electi ana
drach. 2. incorporētur cum succo eupatorij, et quia
puluerizati non sunt in usu, da eos in forma pilula-
rum, & ex eisdem potes cum saccharo confectioē
facere Laudātur etiam trochisci de rosis, quoniam
sunt stomachi confortatiui. Ad extra stomachum
inunge, ut. Recip. Olei mastiches unc. 1. nardini si-
ue de spica unc. 5. de absinthio unc. 1. pulueris ga-
riophy

riophylorum drach. s. ligni aloës 3. 2. corallorum
rubeorum drach. 1. coriandrorum preparatorum
drach. s. pulueris rosarum scrup. 1. aceti nigri pa-
rum, & cum cera fac unguentum. Ex expertis pul-
uis unus folij pentaphilon cum uno grano pipe-
ris, cum uino potanti datum ante accessionem per
horam, quod tempus semper intellige de similibus
datis. Sinapi tritum cum hydromelle datum quoti-
dianam tollit, materiam in fumum conuertendo.

Idem operatur Theriaca cum aqua calida exhi-
bita ante horā accessionis per horas duas, & hoc
de quarto in quartū præcedētibus euacuationibus.
Alchif contra febrem de phlegmate dulci uel natu-
rali: Recip. Succum fumiterre unc. 1. agarici drach.
s. succi foeniculi unc. 1. detur ante accessionem per
tres horas, & liberabitur æger. Si autem fuerit
quotidiana periodica ex phlegmate salso, fac quæ
sequuntur. Ex digestiuis magistralibus: Recip.
Endiuie, scariolæ, buglossæ ana Manipulū unum,
radicum foeniculi, apij ana Manipul. s. florum bu-
glossæ, uiolarum, boraginis ana Manipul. 1. semin.
frigidorum unc. 1. liquiritiæ, passularum ana unc.
3. anisi, foeniculi ana unc. 2. fiat decoctio in lib. 4.
aquæ usque ad consumptionem medietatis, deinde
cū lib. 1. sacchari albi, & media mellis fiat syrupus,
Nn 2 de quo

de quo dabis ʒ. 1. cum aqua endiuie unc. 1. s. buglosse unc. 1. Ex solutiuis: Recip. Violarum M. s. passularum unc. s. radicū foeniculi ʒ. 2. fiat ex his decoctio cum aqua, cum qua extrahes cassie unc. s. diaphœniconis, uel electuarij Indi ʒ. 1. uel cum dicta decoctione da diaphœniconis ʒ. 3. uel rheumbarbari, aut turbith ʒ. 2. zingiberis, spicæ ana ʒ. s. & infunde rheumbarbarum in uino subtili per noctem cum ipsa spica, & cum decoctione præcedenti, & cassie unc. 1. & electuarij de succo rosarum ʒ. 2. da. Ex confectionibus, conueniunt manus Christi perlatum cum modico santalorum factum. Item: Recip. Corallorum rubeorum ʒ. 1. cinnamomi ʒ. 4. margaritarum ʒ. s. santalorum rubeorū ʒ. 1. ligni aloës, macis ana ʒ. s. sacchari albißimi unc. 8. fiat cōfectio in morsellis, cum aqua rosata, de qua accipiat ut in præcedenti rubrica, uel ex speciebus diarrhodon Abbatis, & electuarij de gemmis, aut aromatici rosati fiat confectio. Electuariū fiat ex saccharo rosato, uiolato, buglossato ana unc. 2. s. manus Christi perlato, diarrhodō Abbatis ana ʒ. 10. specierum electuarij de gemmis unc. s. de auretetur. Ex trochiscis qui tamen non sunt multū in usu: Recip. Trochiscorum de eupatorio, trochiscorū de spodio ana, confice cum iulep uiolato, & da ut in præce-

precedenti rubrica. De cura phlegmaticæ periodicæ ex phlegmate muscilaginoso, & uitreo, & aquoso. Ex compositis usualibus digestiuis in tali febre: Recip. Mellis rosati colati unc. i. syrupi acetosi simplicis unc. s. aquarum foeniculi, buglossæ ana unc. i. s. Et ex isto transeas ad fortius gradando, ut prædictum est. Magistrale: Recip. Radicum asparagi, brusci, foeniculi ana unc. i. mellissæ, buglossæ ana M. i. seminis anisi, foeniculi ana unc. i. ameos unc. s. passularum unc. 4. & cum quatuor libris aquæ, fiat decoctio ad cōsumptionem medietatis, deinde cum lib. i. mellis, & unc. 4. aceti, fiat syrupus in hyeme, in æstate cum saccharo, & fac acetosius, et minus ut uideatur, & ualet iam digesta materia. In principio fac cum minus aperitiuis, unde uide conditiones digestiui in hac materia attēdendas in primis capitulis superius adductis. Ex solutiuis habes pilulas, & alia ut per te scire debes. Ex magistralibus: Recip. Pulueris hieræpicæ 3. 2. agari ci, turbith ana 3. i. spicæ, zingiberis, salis gēme ana grana 6. informentur cum oxymelle, & in hoc casu agaricus est medicina propria. Et confectio- nes conueniunt ut in phlegmate dulci dictum est, quæ adhuc eleuabis in gradu caliditatis magis, quoniam phlegma uitreum est frigidius dulci. De un-
guentis

guentis uide per teipsum. De cura phlegmaticæ
 periodicæ permixtæ. Secundū compositionē humo
 ris cōpone simplicia. Vnde ex usualibus digestiuis:
 Recip. Mellis rosati colati unc. 1. syrupi acetosi sim
 plicis ℥. s. aquæ saccharatæ ℥. 1. aquæ fœniculi ℥.
 2. Ex solutiuis: Recip. Cassiæ ℥. 1. turbith ℥. 1. ex
 trahatur cum decoctione thamarindorū, capillorū
 ueneris, passularū, & liquiritiæ. Et confectiōe or
 dina: Recip. Cinnamomi ℥. 2. santali rubei ℥. 1. s.
 margaritarum ℥. s. sacchari lb. 1. fac cum aqua bu
 glossæ, boraginis, & fœniculi ana. Electuarium or
 dina: Recip. Sacchari boraginis, manus Christi per
 lati ana ℥. 2. specierum electuarij de gemmis ℥. s.
 corallorū rub. ℥. s. syrupi de citro quantum sufficit
 & deaura. Ex trochiscis & alijs ordina, ut de
 phlegmate salso. Digestiū usuale saltem in princi
 pio: Recip. Oxymellis simplicis ℥. 1. s. mellis rosati
 colati ℥. s. aquæ buglossæ, aquæ fœniculi, aquæ sac
 charatæ ana ℥. 1. solutium: Recip. Pilularū Inda
 rum ℥. s. pilularum de turbith ℥. 1. incorporentur
 cum oxymelle simplici, & da usq; ad 5. Trāseras
 te deinde ad syrupū fortiorem Et si uis magistra
 lem: Recip. Radicū quinq; ana ℥. 2. capillorum ue
 neris, hyssopi ana ℥. 1. scolopēdræ, endiuie, cicho
 rij, buglossæ ana ℥. 2. fiat decoctio et in fine adde
 ephymē

epithymi ℥. 2. sed cola, deinde cum saccharo syrupo
piza & aromatiza cum cinnamomo, & maxime in
estate, hyeme uero potes syrupū cum melle facere.
Solutiūū magistrāle: Recip. Liquiritiæ, passularum,
capil. ueneris, polypodij, thimi, epithymi, fiat deco
ctio, & cum aqua extrahatur ℥. 6. cassiæ aut mānæ,
quibus addas agarici ℥. 1. turbiti ℥. 5. zingib. 3.
s. salis gēme gran. 6. Ex cōfectionibus cōuenit: Re
cip. Specierū diarrhodon Abbatis ℥. 1. specierū ele
ctuarij de gēmis 3. 2. sacchari ℥. 10. fiat cum aqua
fœniculi, buglossæ ana. Electuariū, uidelicet, de gē
mis: Recip. sacchari buglossati, borag ana ℥. 4. spe
cierū cōfectionis de gēmis, uel diamusci, uel aroma
tici rosati ℥. 1. s. diarrhodon Abbatis 3. s. de auro.

De hemitritæo. Cap. v.

Ex traditione Græcorum et Latinorum.

A Tubi id genus tertianæ est, quod hemi
tritæon medici appellant, magna cura
opus est, ne id fallat. Habet enim (ut
Celso placet) plerunq; frequētiore accessiones de
cessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit, por
rigitq; febris inter horas uigintiquatuor, & trigin
ta sex, ut quod idem est, non idem esse uideatur.
Febris hæc mixta est tabida, putridaque pituita

Nn 4 cum

cum amara bili tabida composita ex utrisq;. Amphemerino quidē cum frigiditate ingrediente, tertiana uero cum rigore mixta ex utraque horrorem incutit, rigorem quidem minus aliquatenus habente. Maius autem circumingruente frigore, quibus mixtis, nihil est extremum maximumq;. Eius autem ortus modus est duplex, uel cōuenientibus duobus in unum paroxysmis statim à principio mixtis inuicem ambobus, uel singulis per se. Cum igitur tertiana dominatur horridior est febris, tametsi rigoris significationem admittit, statim autē hæc calidior, & bilis uomitu, uel separatione leuatur. At pituita affluente, dominatur extremis frigiditas. Exigui autem horrores, neque sitibundi sunt, neq; æstuosi, cum autem magnitudine pares extiterint, cum deficiat tertiana & cōtinua amphemerina, inuasio paroxysmi cum horrore efficitur. Cum uero pituitæ tempus imperium exhibet, sistolæ fiunt, & horrores. Cum bilis dominatur cōglobatim cōcalescunt, atq; is est syncerus hemitritæus ex imbecilli temperamento duarum factus febriū, tertiana deficiente, & amphemerina continua, at non integer hemitritæus, uel biliosum humorē multum possidet, uel pituitosum. Ex ambobus itaq; iam dictis humoribus cum febris hemitritæus cōstet, mixtam caliditatem habeat

habeat opus est, proinde cura erit cōposita ex iam dicta tertiana & amphemerino.

Secundum Poenorum & Arabum doctrinam.

Hemitritæus nascitur de materia cholerica extra uasa existente, & phlegmatica intra uasa, quæ utraq; in qualitate est æqualis, unde Hippocrates in primo libro epidimie: Hemitritæus incipit, non dimittit, quod bene dixit, quia una suarum materierum est intra uasa. Materia enim cum fuerit intra uasa, nō quiescit patiens, quia non habet interpolationem, quāuis fuerint interpolatæ naturaliter, et hæc febris de duabus nascitur extraneis materijs, scilicet, phlegmate et cholera, fit in die tertianæ accidentis significatio commixta, & molestatio, febris ualida, quia molestatio est duabus febribus cōtrarijs. In die autem amphemerini signa simplicia apparent, & molestatio febris mollior & lenior, quia unius febris est. Aui-cenna. Hemitritæus est febris composita cum duabus febribus, quarum una est tertiana, & altera est phlegmatica, & fit in die uno paroxysmus tertianæ & quotidianæ simul, aut secūdam semitam cōalternationis, aut cōmunitatis, aut introitus, & prima est difficilior ad cognoscendū, deinde secunda.

Nb 5 Et

Et fortasse extenditur hemitritæus longo tempore, scilicet, usq; ad septem menses, & supra. Et quandoq; est de febribus magis interficientibus, quoniam perducit ad æthicam & ægritudines chronicas difficiles. Et ex hac quæ eius hemitritæus corpus nõ mundificatur integre. Absinthium iuuat ad rectificandum materiam & maturandum ipsam, & succurrendum nocuentis eius post septem, & apparitionem digestionis, et cum festinatur cum eo mouet humores, & non euacuat eos. Cum sumitur, scilicet ante, facit accidere angustiam, et tristitiam, & nauseam, deinde reuertitur super eos cum sua caliditate, & exiccat eos, & cum sua stipticitate facit eos pigros. Ponit hic Auicenna de eo qui cõrãdixit Galeno, quia Galenus dabat in cura hemitritæi aquam hordei cum pipere, & reprehendit eum. Serapio: Hemitritæus est triũ specierum. Quod est, quia aut uincit super eam cholera citrina pura, aut phlegma, aut sunt cum æqualitate. Et hæc quidẽ febris est in die prima uehemẽs, & in secũda est quies. Et causa in illo est, quia sunt in die primo due febres, scilicet, illa quæ est ex cholera citrina, & illa quæ est ex phlegmate, & in secunda illa quæ sit ex phlegmate tãtum. Et curatio huius febris est secundum quantitatem humoris uincẽtis in ea. Quod si uincant

cant ipsum duo humores facientes cum simul cum
equalitate.

Ex traditione recentium autorum.

Hemitritæus omnis fit ex cholera putrefa-
cta intra uel extra, uel ex alio humore,
ut ex phlegmate, uel melancholia. Sunt
autem hemitritæi tres: minor, medius, maior. Mi-
nor fit ex cholera putrefacta intus, cum phlegma-
te extra. Medius ex phlegmate intus, & cholera
extra. Maior de cholera intra, & melancholia ex-
tra. In omni namq; hemitritæo ille humor putrefit
extra uasa, qui est materia illius interpolate, cui cō-
iungitur. Inde est quod in minori hemitritæo qui
quotidianæ assimilatur, phlegma putrefit extra, un-
de quotidie fit paroxysmus & cum typo. In me-
dio qui assimilatur tertianæ putrefit cholera ex-
tra. In maiori qui quartanæ coniungitur, putre-
fit melancholia extra. Quod si quidam nos re-
prehenderit & dicant: Si hemitritæus est de
duabus composita febribus, id est, amphimeri-
no & tertiana, & amphimerinus palam in ea ap-
paret, eiusq; significationes apparent, quare ac-
cepit nomen à tertiana, & non amphimerino.
Respōdeo: quia amphimerinus aperte apparet sen-
sui, non est sibi necessitas ut ei nomen impendatur.

Sed

Sed tertiana quia est omnino occulta si nomine careret, & ipsa omnimodo negaretur. Sed si iterum dixerint: Quomodo possumus cognoscere tertianā materiam utrum sit extra uasa, & amphimerinum intra uasa. Dicimus: quia si frigiditas, quæ sola erat in amphimerino uenire, non apparet, & rigor tertianæ apparet, intelligitur materia amphimerini intra uasa. Præterea cum hæc febris quotidie accidat, cognoscimus eam phlegmaticam habere materiam, quæ frigore caret, & rigorem habet, noscimus ei cholicam materiam esse commixtam. Hemitritæus qui de cholerica materia et phlegmatica est, necesse est ut sit curatio eius mediocris inter rem calefactiuam & refrigeratiuā. Et quia omnis commixtio, aut est in potestate, aut in actu æqualis, aut una est fortior altera, oportet utraq; huius hemitritæi materia aut sit æqualis, aut inæqualis. Si sit æqualis, uera hemitritæi curatio fit cum rebus attenuantibus & dissoluentibus, nullum calorem aut frigiditatem facientibus, sicut lupulo, maratri succo, manna, uiol. saccharo, ptisano cum oxymelle. Quod si cholera fuerit maior fit faciliior & leuior, quam curare decet cum rebus mundificatiuis & modicum refrigeratiuis, sicut endiuia, maratro, uiolæ, saccharo, manna, prunis, ptisano cum oxyfac-

oxysaccharo. Si autem phlegma uidetur dominari,
fit hemitritæus molestior, tunc medicinetur cum
mundificatiuis, & dissolutiuis, & aliquantulum ca-
lefactiuis, quemadmodum mellicratum cum aqua
calida, syrupo absinthij, ptisano, in quo cocta fue-
rint radices apij, maratri, anethum, calamentum.
Oxymel accipiant, & trochiscos de ros. & trochi-
scos de herbis omnia cum succo maratri, & oxy-
melle sumat, uel rosa cū mastiche, aniso, maratro,
& aqua calida. Si uideris materiam attenuari &
moueri ut egrediatur, & signum coctionis in uri-
na apparuerit, dabis pharmaciam suauiter solutio-
nem facientem. Et bonum est si post cibum uomitus
prouocetur, & diuretica tribuentur, sicut tro-
chisci de absinthio, & de lacca cum succo maratri,
endiuiæ, & apij. Ex solutiuis conueniunt tales pilu-
læ: Recip. Hieræ picræ, calamenthi ana drach. 5.
anisi, maratri, apij ana drach. 3. succi eupatorii, suc-
ci absinthij ana drach. 2. tempera cum succo fumia-
terre, & fac pilulas: Da potui 3. 2. cum aqua ca-
lida. Aliæ ad idem ualentes: Recip. Calamenthi 3.
3. hieræ picræ 3. 5. apij, anisi, maratri ana 3. 1. 5.
fac puluerem, tempera cum succo apij, da 3. 2. cum
tepidâ aqua. Tetratæus seu maior hemitritæus
de chimo nascitur melancholico. Cuius materia est
aut

aut putrefacta, aut non putrefacta. Non putrefacta, aut est in toto corpore, aut in uno membro. Si fuerit in toto corpore, nigram generat ictericiam, quæ sit ex defectione splenis sanguinis fecem ab epate trahere nequeuntis. Quod si fuerit in uno membro, generat apostema durum quod uocatur scirros. Si fuerit putrefacta, aut est in toto corpore, aut in uno membro. Si fuerit in uno membro, facit cancrum membra corrodens. Si est in toto corpore, aut est intra uasa, aut extra. Si est intrinsecus, facit quartanam sine rigore, nec interpolatur. Si fuerit extrinsecus, est cum interpolatione & facit quartanam febrem, de qua dicetur loco suo.

De quartanæ integræ cognitione. Cap. VI.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.



Quartana febris longè diuturnior tertianis est, tum quia minus bilis habens æstum afferentis, tum quia corpus amplius refrigerat, quod ab atra bile id superantis materie proficiscitur, ac difficulter euellitur. Nam cum ea inter omnes corporis humores lentissima

tissima & glutinosissima sit, diuturniores sedes
 constituit. Quod autem febres quartanæ atræ bi-
 lis participes sint, hac re tibi patebit, quod homi-
 nes autumnali potissimum tempore, & in ætate ui-
 ginti quinque annorum usque ad quadragesimum
 quintum annum, quæ ex omnibus ætatibus maxi-
 mè atræ bile detinetur, corripuntur quartanis, qui-
 bus autumnus inter alia omnia anni tempora expo-
 sitissimus est. Quis igitur ultra citràue id tempus,
 ac eam ætatem quartana accesserit, pro compera-
 to habere debes hanc febrem minimè diuturnam
 fore, nisi quid aliud homini officiat. Hæc autem
 febris ut plurimum non statim à primo cum rigo-
 re inuadit, sed quandoque ex alijs ex hoc lapsus est
 ab errantibus, & quæ sine ordine dicuntur, in hæc
 procedenti autem gignitur rigor. Sensus au-
 tem languentibus non est compuncta & uellica-
 ta cute, sicut fit in tertianis, sed refrigeratis, & ue-
 hementer perturbatis ad ossa usq; ita nanq; audias,
 q̄ ab ea teneantur febri dicere, ut ossa quati, et caro
 tota uideatur, pulsus aut exigui et hebetes, et tardi,
 & rari in significationū sunt primordijs. ut in nul-
 la alia affectiōe, accessu nanq; quartanæ ligata tibi
 uidebitur arteria, et interius rapi et impediri, quo
 minus exurgat, quare tætsi iuuenis fuerit ægrotus
 senectus

senectutis extremæ motum tamen imitatur arteriæ.
Nam si species ægrotatis naturalem pulsum, uel in
altero morbo in principio paroxysmi aliud non ex-
pectabis, quo affirmes quartanam esse, quæ tamen
primum inuasit febris, non antea nanq; uisa, pulsus
mutatio apparebit in raritatē, & tarditatem. Uri-
na autem his in principio quidem alba, ac tenuis, et
aquosa, utpote penetrans per materiæ crassitudi-
nem, procedēte autem morbo iuxta proportionem
coloratio efficitur, hypostasimq; crassam habet, su-
dorumq; consequitur multitudo iuxta uigoris ac-
cessum ipsius paroxysmi. Ex consuetudine quar-
tana febricitatibus profero, inquit Archigenes, &
bituminis, & trifolij quantum sit drachma semis in
cyathis quatuor mellicrati, miro quodammodo, i-
psos etiam iuuat iudaicum bitumē potum lene cum
uino mixtum quantitate drachmæ, medicamine mi-
nimè molesto, quo aqua intercus lauatur, hederæ co-
rymbitæ folia quinq; cum myrrha troglodytica fa-
bæ magnitudine dissoluta, in acetabulo mellicrati
dulcioris dantur, & castorium potum rigores mi-
tigat, & morbosum carnis absomit, & concoctio-
nibus quæ in uenis oppitulatur, segnesq; motus di-
mouet. Alexandri remedium tale est. Feruefactio
scorpiuri, siue scorpioidis herbæ mirifice prodest.

Facit

Facit propemodum ad omnes pota ante febris significationem. Iuuat non solum ratione naturali, sed etiam per uentrem, & per uomitum educendo materiam. Ferunt etiam si quis à mento hirci pilos subtrahat, & eis languentem uinciat, miro modo curatum iri. Aliud quo se usum ait Aëtius ipsius Asclepiadis somnum faciens: Piperis longi, myrrhæ, troglodyticæ, succi papaueris, castorei æque ex omnibus cōpinge, & utitor præbens obolum uel dimidium cum melle horis duabus ante significationē. Ex Rufo: Quæ primordiū à splene capiunt quartanæ febres sunt longiores, colore autem dinoscuntur, atq; in cōcoctionib. quodq; non facile aluus deijciatur, splenisq; tumore, exq; sinistra magis iudicatur, periculumq; est ne diuturnitate homo in aqua inter cutem incidat. Cum autem ex iecoris inflammatione est titillatio, uel dolor in dextro latere, suntq; albi coloris & aquosi toto corpore languentes, & urinae, quæ sandarachæ faciem habent, & subrusæ, cumq; succendūtur tumor succedit dextri hypochondrij, hæ sunt molestiores splenicis, & succumbunt, & infestè terminatæ magis periculosos morbos aqua intercute incidunt.

○○

Secun

Secundum Pœnos &
Arabes.

Ebris quartana de putrida cholera nigra nascitur, quæ si sit intra uasa, generatur sine rigore quartana, quæ uocatur continua. Si extra uasa, generatur interpolata. Vera autem quartana 24. horis tenet, & intermitit. 48. Quædam quartana de pura nascitur cholera nigra, quæ frigida est & sicca. Et iterum alia est de cholera nigra, quæ de incensionibus & aliorum humorum, sicut sang. & cholera rub. & phlegmatis, oportet uero suis proprietatibus unamquamque discerni, ut medicina sua singulis ordinetur. Auicenna: Et plurimum quidem quartana accidit in successionem febrium putridarum, propter diuersitatem humorum ex quibus generatur. Et plurimum quartana est periodica, et minoratur casus quartana inseparabilis. Et saluior quartana est illa quæ non accidit ab apostemate aut alijs, & cum qua non est apostema splenis, nam hoc multotiens ducit ad hydropisim & perniciem. Et quartana quæ salua est, liberat ab ægritudinibus malis melancholicis, sicut epilepsia, melancholia, et in eo est securitas à spasmo, quoniam est humor siccus, et est secundum plurimum ægritudo salua. Et si non accidit in ea error, non addit supra annum, et quandoque

dog; perdurat. 12. annis, & quod est infra eos. Et
quæ ex ea longa est, perducit ad hydropisim, & au-
tūnus est inimicus quartanæ. Et sudor in quartana
est plurimus per cōparationem ad phlegmaticā, et
non per cōparationem ad alias febres. Et necesse
est ut prohibeatur in die paroxysmi à comestione,
& præcipiatur ieiuniū, & prohibeatur ab aqua frī-
gida illa die. Est enim necessariū reliquis diebus uti
carne. Et scias quod aqua casei est bonū uehiculum
ei quod administratur de uirtutib. medicinarū, &
fortasse cōfert administratio eius solius quando est
caliditas uiolenta. Si melancholia fuerit, iuuabitur
cum phlebotomia ex basilica, & hoc genus uelocia-
ter recipit curationem. Si dederis in potu ante di-
gestionem theriacam, & similia, compones quara-
tanam cum quartana, & fortasse attrahes ægritu-
dines alias & propriè in hyeme. Inquit Galenus:
Sanaui gentem plurimam à quartana ita, dedi eis in
potu post digestionem solutiuum, deinde eis dedi
in potu succum absinthij, & deinde theriacam.

Isaac: Quartana cum interpolatione intelligitur
tribus modis, scilicet de re naturali, non natura-
li, & contra naturam. De re naturali sic cognos-
scitur, quia plurimum accidit quibus frigida &
sicca dominatur complexio, cuius ætas est se-

nectus à. 36. usq; ad. 40. annos, maximè si fuerint calidi & sicci, uenæ eorum angustæ & occultæ, & aliquando sit calidas & siccas habentibus complexionēs, & quorum complexionēs calidæ fuerint et siccæ accidentaliter, quia grossi chimi si fuerint in corpore calido & sicco clausi, si moratur illi uincuntur ex corporis calore, eorumq; humiditas desiccatur & mutatur in choleram nigram. De re non naturali sic cognoscitur. Nascitur enim temporib. frigidis & siccis, eis qui frigida & sicca fuerint regione, & aëre simili modo existente. De re extra naturam sic cognoscitur, quia hæc febris cum incipit, magnus patienti euenit dolor, & ossium fractura, quia frigiditas & grossities materiæ currit ad membra sensibilia, aggrauans multum membra frangit, et super ea longo moratur tempore, propter suam grossitiem non cito uritur, quæ cum incipit uri, nimirum facit calidum. Sed disturbat corpus propter materiam naturæ laborem facientem, & aliquando materiæ dominante quiescit infirmus, & aliquando morbus præstat naturæ nocumentum, unde patiens molestatur. Et sicut tertiana propriè facit dolorem capitis, & amphimerinus dolorem stomachi, sic & quartanam propriè dolor & duritia splenis consequitur propriè. Serapio; Scias quod febris melancholica

cholica cognoscitur ex rebus extra naturam secundum hunc modum. Quod est quia præcedit eam aduentus erraticarum secundum plurimum, quoniam humor faciens eam non est nisi ex adustione humorum aliorum. Et fortasse incipit cum læditur splē et nō attrahit sicut oportet, remanet cholera nigra et quando multiplicatio fit ex comestitionibus quæ generant cholera nigram, donec generetur nigra cholera super illud quod possibile est splēni mundi ficare.

Ex traditione autorum recentium.

Quartana febris fit de melancholia dura et grossa respectu aliorum humorum, indeo oportet medicum in ipsa inuestigare et considerare quatuor res, et ipsas prævidere. Quarum una est, ut in initio non det rem multum calidam, ne calefiat materia et duæ febres generentur, una acuta et continua, alia interpolata, quibus uirtus patientis deficiat, et ipse patiens subeat periculum, natura enim non est tantæ uirtutis, ut possit morbi acumen eiusque prolixitatem tolerare. Secunda, ne cōsumat ac debile faciat corpus, cum diæta subtili et nimia abstinentia, nam aliquando subtilis diæta ducit patientem ad ethicam et phthisim.

00 3

Tertia,

Tertia, ne det refrigeratiua, ne congeletur materia
& coaguletur, unde induretur & moretur ad dige-
rendum & ad dissoluendū, fiatq; causa prolixi mor-
bi, & eius peruersitatis. Quarta, ne confundat cor-
pus cum pharmacia, & maxime in initio morbi pri-
usquam materia morbi digeratur & sit obediens
actioni naturæ. Sed oportet medicū habere studiū
in sua actione, ut donet rem maturantē, & digerē-
tem, & cito eycientē, & ingeniet purgare materiā
cū leui uomitu. Studeat etiā in regimine & cōforta-
tione epatis et splenis, quia epas generat sanguinē
& splen mūdificat eū. Quod si defecerit, eūq; nō pu-
rificauerit, permanet cōmixtus cū putridis humori-
bus, unde putrescit ipse & incēditur. Splen aut quia
trahit fecem & sanguinis turbiditatē, si defecerit,
permanet fex in sanguine & corrūpitur, unde idē
sanguis putrescit & incenditur hac de causa. Quidā
dant post tres euacuationes uinū decoctionis men-
the, mentastri cū permixtione 3. 1. uel. 2. theriacæ,
& 3. 4. aquæ uitæ, & hoc per mediā horā ante ac-
cessionem, & uinū sit calidū, et bene cooperiūt eos,
et sic faciūt ter uel quater, ut uideatur eis expedire,
& sic eos liberant ut affirmant. Quidā idem operā-
tur cū aqua uitæ et puluere gariophil. Quidā dant
uinū purum aromaticū cum puluere gentianæ cali-
dum,

dum & est secretū. Item sem. hypericonis cū uino
datū, quartanam soluit. Et tu scis ex positis supra,
quod talia debent dari ante accessionē per unā ho-
ram uel circa. Quidā prædicator quartanarios om-
nes curabat cū hac recepta: Recipe florū boraginis,
uiolarū ana. ℥. i. senæ, thymi, epithymi ana. ℥. i. s.
myrobalanorū citrinorū, rheumbarbari electi ana.
℥. s. coquenda coquātur usq; ad quartam. i. & post
colentur, & iterum coquantur omnia, & redigan-
tur ad ℥. 2. in fine decoctionis rheumbarbarū pona-
tur, acuat cum ℥. i. esulæ, detur per unam horam
ante accessionem. Ipse cum hac recepta, ut asser-
bat, omnes curabat. Ista sunt empirica quamuis ma-
teriei melancholicæ conueniant, & ipsam euacuēt.
Digeratur materia prius cū oxymelle simplici, po-
stea cum cōposito. Digeratur etiā cū diasene & dia-
calamēto. Deinde detur oxymel scylliticū. Puluis
digerēs melancholiā in quartana: Recipe gētianæ,
enulæ, yreos, thymi, zingiberis, pyretri, euphrasie,
seminis urticæ, chamædrios, memitæ, scænugræci, iu-
niperi, mēthæ, gūmi, hederæ, penidiarū q̄ sufficit ad
dulcedinē in cibis utatur. Si sit delicatus, euacuetur
materia cū tali syrupo laxatiuo: Recip. radicis fœni-
culi, petroselini, apij, raphani, thymi, epithymi, quer-
culæ maioris et minoris, senæ, polypodij, bulliāt in

Oo 4.

aceto

aceto fortissimo & addito zingibere fiat syrupus, qui qualibet die detur cū aqua calida, uel cū hac decoctione: Recip. fœniculi, apij, petroselini, asparagi, brusci, cum seminibus suis, in aqua bulliant & colatura addatur pulvis lapidis lazuli ʒ. i. myrobalanorum citrinorum ʒ. i. s. indorum ʒ. i. stent in nocte sub diuo, mane colatura detur cum sacharo uel syrupo uiolarum propter amaritudinem.

De epialis & liparijs febribus.

Cap. vii.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Plurimos humoris est propriè nominata epialis febris, cum simul febricitant, & rigent, & utrumq; sentiunt uno eodemq; tempore in omni corporis parte. Nam acuta pituita, & quæ uitreosa dicitur absq; febre quidē rigorē infert. Si uero quædam tabida mediocriter ipsis insita sit, epialum efficit febrim, sin plus putrescat, præcedit quidem rigor, consequitur uero febris exuperata natura excessu caliditatis, ut nō appareat in excessu & uigore paroxysmorum, ferè etiam uitreosa pituita acutam participat qualitatem. Cura uero propemodum ut qui amphemerino ægrotant magis secātem capiens modum, hoc nāq; obtineat peculiare.

Se

Secundum Pœnos &
Arabes.

Epialos est febris ex phlegmate uitreo, sed est cōprehensum in occulto profundo quod infrigidatur ubi est, uerum ipsi iam accidit putredo, quare spargitur ex eo uapor eius, quod cum putruit & dispargitur & inflammatur in exterioribus, & illud quod non est putrefactum, infrigidatur in interioribus. Liparia est febris in qua occultatur calor, et apparet in ea frigus & secundum plurimum est phlegmatica, & quandoque est cholericā ex cholera grossa ualde. Quomodo erit febris, & non procedet caliditas ex corde in totum corpus? Respondeo quod attenditur una conditio, scilicet ut nō sit quod prohibeat sicut hic. Serapio: Scias quod phlegma uitreum frigidum ualde est inter species phlegmatis. Si autem putrefit pars eius & non putrefit pars, accidit febris quæ nominatur epialos, & ipsa quidem facit frigus interius & exterius calorem. Et febris epialos quidem, hæc non permanet multum, quod est, quia fortasse moratur. 20. diebus, & fortasse addit super illud parum, & minuitur. Et illa quæ dicitur liparia sicut dictum est à Galeno, est illa in qua infrigidantur extremitates membrorum, & quod appa

ret ex corpore, & aduruntur in ea profundū corporis, & uiscera cū siti uehemēti, & asperitate lingue, & pulsus paruus lenis. Et liparia quidē est contraria epialos, quod est quia frigus in epialos est interius, & inflammatio exterius, & in liparia accidit contrariū illius. Et oportet ut solliciti simus in epialo propriē de stomacho, scilicet cum uomitu et potib. qui infrigidant & mundificant stomachū et prouocāt urinā, sicut aqua fœniculi & apiij cum geleniabin et secaniabin. Isaac: Epialos quæ de uitreo nascitur phlegmate, necesse est ut curetur sicut Amphimerina. Sed tamen phlegma quod est in epialo, quia est frigidius, oportet fieri materiā calidiorē secūdum quod eius materia fuerit frigida. Sed decet ab initio incipi à medicinis quæ debiliter sunt calefacientes, donec eas natura assuescat. Deinde paulatim ad calidiores accedere, quousq; ad illam caloris quantitātē ueniant, in qua nostra fuit intentio. Plurimum uero nostra intentio est in hac febre, ut mūdificetur stomachus cū re purgatiua et colatiua. Purgetur etiā materia per uomitum et urinā cū oxymelle, & aqua calida in qua cocta sint spica, anisum, & similia. Quod si materia cœperit se mouere, & signū coctionis in urina apparuerit, purgetur cum apozemate de foetida. Clystere fiat eis in quo
intra=

intrauerit semē croci hortensis, centauriū, anethū,
 abrotanum, herba pulicaria, ameos, bdellium, serap-
 pinum, colocynthis & his similia. Post purgationē
 naturæ hoc assuefaciant antidotum, ubi asa & ca-
 storcum ponuntur, & pilulas in quibus eupatoriū,
 mastix, absinthium, aristolochia rotunda, spica, cro-
 cus & similia intrabunt. Dietam accipiant quæ sit
 lauatiua & diuretica, sicut est ius ciceris cum obso-
 mogaro, ciminio & amygdaleon, bliti, radicibus
 asparagi, & porris omnib. coctis & gobsomogaro
 conditis, potent oxymel scylliticum cum aqua. Ac-
 cipiant post cibum diaciminum, diatrionpipereō,
 diacalamentū, & similia. In lipario autem, quia ma-
 teria eius phlegma, cū cholera mixtū, dari oportet
 minus calida, quā in epialo sicut mel ross. oxyzac-
 caram, apozema de aloë & hierapicra, & oxizac-
 caram cum succo maratri, apij, mastiches & his si-
 milibus.

Ex traditione autorum recentium.

Phlegmata nō naturalia sunt quatuor: V-
 num dulce, secundum salsum, tertium ac-
 cetosum, quartum uitreum. Dulce uero ui-
 cinum est naturali, sed tamen modicum est calidum
 propter suam dulcedinem. Non enim est aliud,
 nisi

nisi sanguis non perfecte coctus, proinde natura cum naturali indiget phlegmate, habet dulce uice sanguinis, & digerit cum sanguine illud, & emollit cum eo membrorum concatenationes, ut facile moueantur, facit etiam illud expulsiue uirtutis esse materiam. Salsum uero & acetosum sunt in stomacho. Causa enim eorum est, aut enim est calor extraneus complexioni naturali dominans, aut nimia frigiditas, quia phlegma naturale ad stomachum ueniens, ad augmentandam & confortandam expulsiuam uirtutem, si extraneum in stomacho inuenerit calorem calefacit, & in salsum conuertitur. Quod si extraneam ibi inuenerit frigiditatem, deficit calor naturalis, & sua augmentatur frigiditas, unde in acetositatem mutatur. Causa enim falsitudinis duob. est modis, aut est putredo phlegma calefaciens naturale, illudque conuertens in aciditatem, unde fit salsum, aut est nimius calor phlegmatis humiditatem desiccans, qua de re suam amittens saporositatem conuertit in salsum. Phlegma autem uitreum grossissimum & uiscosissimum est, quia causa eius est nimia frigiditas naturali dominans phlegmati, unde ingrossatur, & fundus eius est quasi liquidum uitrum. Proinde non ponit illud natura in regimine corporis propter eius duriciam actioni nature inobedientem,

dicentem, unde naturalis calor cum ad illud deuen-
rit, nequit illud putrefacere, sed partem eius quæ
facilior est putrefacit, & aliam putrefacere nō ua-
let. Ideoq; in febre epialos interiora corporis
sunt calida, & exteriora frigida. Quia parti phleg-
matis interius existenti calor extraneus accidit, cui
quia ipsa obdierat, putrefacit eam, pars autem cor-
poris exteriora habitans, quoniam illi non obedit
calori non putrefit, sed in sua constat natura, unde
naturaliter generat frigiditatem. Febris autem li-
parios causa est cholericæ materia incensa, mixta
cum uitreo phlegmate, aut cum melancholica mate-
ria, unde conuertitur & à natura cholerae egredi-
tur. Digestium usuale in epialo saltem in prin-
cipio: Recipe oxymellis simplicis ℥. i. s. rob agre-
stæ ℥. s. aquæ buglossæ, sceniculi, absinthij ana. ℥. i.
aromatiza cum cinnamomo. Et quia Auicenna lau-
dat unum solutium uolo tibi illud hoc narrare: Re-
cipe myrobalanorum citrinorum, & nigrorum a-
na. ℥. i. turbith ℥. s. zingiberis ℥. s. infunde in oxy-
melle simplici per 10. horas, deinde addas aquæ la-
tis caprarum ℥. 3. & parum calefiant, deinde fiat
fortis expressio & addas casie uel man-
næ ℥. 6. & tribue.

De

De hecticis febribus. Cap. viii.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Dvplex genus est febrium hecticarū. Nam inter causi species febriles ut multa erūpunt, eousq; extenditur calor ut diuturnitate humorem depascatur ipsius cordis. Qui uero manente cordis adhuc humiditate febricitant hinc exuruntur, sicut lucernarum flamma, filum incensum conflagrat manente adhuc in lucerna oleo, atq; hic unus est ortus, alter autem cū à principio statim exoritur similis ephemeris, in moerore et furore, plurimiq; mentis agitatione, & labore plurimo exæstuans erumpit. Hæctica enim febris nominatur cum in tantam immoderantiā contra naturā peruenit febris, ut in habitu solidæ essentiæ sit similem partiū corporis cor ipsum. Ob hoc difficulter hæc cōstructio dissoluitur. Primū nāq; liquefacit & exsiccatur, & absomit, quæ aduersatur naturæ caliditas essentiā ueluti humore cōpactam in membris, cuiusmodi est adeps & caro. Inde suā absomit humiditatem qua corpora nutriuntur, quæ diffunditur & dispargitur in roris modū in omnes animalis partes, hinc transcendit in corpulentū genus inter ines & tuniculosas partes corporū solidorū, quas coquendo discerpēdo ines abijciūt. Integrū uero cōplemētū
in solia

in solida essentia partiū consimiliū efficitur aridus,
quæ febris etiā $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\ \mu\omega\delta\lambda\eta\varsigma$, ut si deflorescēs fla-
uescensue dicatur. Has igitur febres haud quaquā
difficulter curaueris, at ex ipsis in $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\ \mu\acute{o}\rho$ per-
uenientes medicari haud quaquā possis. Natura
namq; ipsorū est calida & arida patiente propemo-
dū corde, quod in lucerna cōflagrās filum quod cū
plurimū exustum fuerit dissoluitur, si parū des olei
flamma magis incenditur quoad extinguatur. Hæc
planè febris cognitu expeditissima est, prius enim
quā conflagent pulsus, immoderatas tibi licebit
cavitates intueri, tanquā in foueis demersos ocu-
los, lippitudinesq; per sese illatas aridas et quandā
squalentā affectionem, quemadmodū multo affecti
pulvere, qui aliquādiu fuere sub sole perpetuo. Ob-
literauit autem ipsorū etiā coloris uitalem florem,
cutemq; arentem fecit quæ circa frontē extenditur,
cilia, tanquā somniculosorū intumescunt, estq; nō
somnus languor, sed uigilandi nulla potestas, concī-
duntq; tempora, ut in ipsis caue appareant partes,
nempe nil aliud quā ossa pellisq; est corpus uni-
uersum, ut si nudos intueare, uentremq; spectes pu-
tas in eo nulla intestina, nulla esse uiscera, hypochō-
drion ualde à thorace reuulsum, cutēq; totā in aruis
se exiccatāq; putes, ac si digitis capiēdo distendas
tanquā

tanquàm corium sistat. Quare sincera febris mara-
smodes, ut iam dictum, incurabilis est. Vniuersum
nanq; in ipsis deflorescit corpus, ferme ut postre-
mo exarescit, aut propinqua flamma, aut uehemen-
ti immoderatoq; squalore. Tale nanq; corpus eua-
dit per naturam absq; febris in extremam proueni-
entium senectutem, pede pressim agnata euanesce-
nte caliditate, uerum per naturam senescentium
mors natura suapte sine molestia est in frigiditate
ariditateq; consistens. At id quidem curari non po-
test. Verum febrium cunctarum hecticarum com-
mune est, enerues fractosq; aequè in toto corpore
esse à primordio ad extremum usq; spiritum. Maxi-
ma quoq; & indubitata cognitio naturæ ipsius sit
homini ingesto nutrimento quod calor incenditur,
pulsus capit incrementum, ac celerior fit, ut his pro-
pè modum eueniat, ut in calce saxisq; exustis, in quæ
si frigidissimam infundas aquam, multo calidiora
euadunt ualida in his caliditate ab humida asper-
sa essentia, quoad igitur essentiæ humidae quidpi-
am modo custodietur, hectica duntaxat est febris.
Cum uero in periculum uentum fuerit, nihil hu-
iusmodi superesse humiditatis syncerus iam ma-
rasmus consistit. Frigefacimus quoquo modo
hecticas febres, statim priusquàm in marasimum
perficienda

perficiendum deueniant. Sine cōtrouersia uero humida & frigida nutrimenta esse conuenit, quæ utilia futura sint hec̃ticis febribus, quo autem hec̃ticarum febrium calor fuerit intensior, tanto etiam frigidiora conuenit esse adminicula, plusq; examinis adhibere, ne fortè detrimentum aliquod consequatur, si ualidioribus usi fuerimus adminiculis prodesse cupientes.

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.

Cum febris tribus diebus, aut amplius permanferit nec se mouerit, nec calor eius, nec inflammatio uehemens fuerit, nec accidentia, quæ febres acuta comitari consueuerunt, cum ea affuerint, ut est pulsus magnitudo, & caliditatis, & inquietudinis uehementia, & anxietas, & linguae siccitas, atq; eius nigredo, ipsa tamen sic uno modo perseuerauerit, nec potest in ea deprehendi dimissio aliqua, nec paroxysmus, præter hæc etiam ipsa inuenitur quieta, & quasi tepida, tunc ethica adesse creditur. Est itaq; ipsius ueritas sic experienda. Aegro ut in diuersis comedat horis, est præcipiendum. Quod si inuentus fuerit semper post comestionem à febre magis infestari, ethicā proculdubio esse pronūciandum est. Quod si, cum

Pp hoc

hoc esset, facies eius iam extenuata & oculi concavi, & caro imminuta, atque cutis deficcata fuerit, ethica iam non est in eo principio, imò in ipso confirmata est, & operata, & diu est ex quo ipsum inuasit. Hæc autem febris in principio sui cum nondum, scilicet, ad ariditatem peruenit, curabilis est. Phthisis itaq; signa cognoscenda sunt, ut dū aliquis de ægri sanitate confidit ad eandem curādam properet. Dicemus igitur quod cuius quidem ethica in phthisim transit, tempora uehementer plana fiunt, & oculi concuātur, & nares subtiliantur, & fiunt tornalitates, & aures minorantur, & earum corpus subtiliatur, faciei quoq; ac frontis tenditur cutis, ac si esset corium quod super ossa faciei deficcatum foret, & totum corpus similiter à carne nudum existit. Collum præterea tenue fit, & epiglottis foris prominet. Cūq; pectoris ossa tactu aut uisu considerata fuerint, unumquodque eorum cum suis extremitatibus notari poterit, et postremo corpus non uidetur nisi corium & ossa. Eiusq; uox exilis auditur & debilis, & uirtus omnino destructa uidetur, & pulsus subtilis, & debilis, & cum hoc etiam durus. Chordæ quoq; manifestè apparent, quia caro dissoluta est, & uenæ similiter, & cum hoc à sanguine uacue, neq; earum concauitas magna

gnæ rei capax existit. Pulchritudo quoq; atq; clari-
tas ab ipsius corpore omnino recesserunt, & cutis
desiccata est, & cuti existentis in senio similis fa-
cta est. Vēter etiam eius attenuatur & debilitatur
donec uideatur, ac si costis adhæreat, et quod nihil
in se contineat. Mirach præterea uentris in tātum
subtiliatur, ut non uideatur esse nisi solūmodo cori-
um, & præter hoc spasmatum & desiccatur. Ossa
quoq; rascetæ, & pectinis manuum plerunq; appa-
rent, & ungues curuantur. Cum uero capilli cadūt
alicui, et uēter soluitur, mors ei p̄pinqua est. Isaac:
Dicimus priusquā de ethica & phthisi disputemus,
phthisin esse corporis humiditatis cōsumptionem,
quæ uel est naturalis, uel non naturalis. Naturalis
sicut patiuntur senes & decrepiti, cum naturalis
eorum uirtus in digerendis cibis, & in humiditate
nutritiua attrahenda deficit, ut restauretur corpo-
ris humiditas, quæ per fumum & sudorem disso-
luta est. Hæc est causa consumptionis decrepito-
rum corporum. Arborum uero & terræ nascenti-
um consumptio tribus modis fit. Vnus, nimius ca-
lor est, substantialem humiditatem desiccans, sicut
calor solis facit in æstate. Secundus, humorum nu-
trientium est ablatio, sicut fit in hyeme non pluui-
osa. Tertius, humorum nutritiuorum est corruptio,

Pp 2 & eorum

Et eorum ad malas qualitates permutatio, sicut ad nitrositatem, sulphureitatem, aluminositatem, & similia. Sic & in humanis corporibus cōtingit. Cōsumitur enim ablatis humoribus ea nutrientibus, natura in digerendo cibo, prout oportet, deficiente, nec membra quæ dissoluta sunt, restaurare ualente, sicut senibus euenire diximus, unde antiqui hanc speciem phthisis decrepitam uocauerunt. Corpus etiam calore extraneo corpori dominante, & substantialem humiditatem deficcāte consumitur, sicut sit causa acutarum ægritudinum eam præcedentium. Simiter de angustia & diuturna tristitia. Præterea corpus aliter cōsumitur cum sanguis corporis nutritiuus, à sui dulcedine et saporositate mutatur, quemadmodum propter diuturnam ægritudinē mutatur, quia in diuturna ægritudine sanguis corrumpitur, & proprium perdit saporem unde à membrorum natura odio tenetur, neq; ex eo nutriuntur. Membra ergo nutrimento carentia infrigidantur, deficcantur, & consumuntur, quia non nutriuntur. Infrigidantur quia sanguine qui est calidus & humidus cessante, necesse est membra infrigidētur, quæ solebant ex sanguine calefieri. Quod si nos reprehendant dicentes: quare antiqui dicunt seniores sicca habere corpora, cum sensus mōstret contrarium.

contrarium. Inuenimus enim seniores maioris esse humiditatis quam iuuenes. Respondebimus: quod humiditas decrepitorum fit accidentaliter propter defectum caloris naturalis, eorum cibaria prout oportet, digerere nequeuntis, & propter debilitatem membrorum tertie digestionis superfluitatem expellere non ualentium, quod testantur hydropici. Corpora enim eorum sunt plena carinae aquae, membra tamen habent macilenta & consumpta. Non naturalis itaque consumptio duobus modis est, aut cum febre, aut sine febre. Sine febre, aut est calida, aut frigida. Frigida uero consumit corpus, uel propter diuturna apostemata, uel propter alios diuturnos morbos. Hi enim morbi, quia sunt diuturni, nimium de substantiali corporis humiditate dissolunt, unde in frigidato corpore, uirtus digestiua deficit. Ideoque cibaria cruda ac indigesta permanent. Quod cum ita sit, membra corporis abhorrent ea, neque ex eis nutriuntur. Quam quidem molestiam patientes, pulsus habent debilem, tardum & strictum, urinam crudam, albam & subtilem. Pulsus est debilis, ex dissolutione uirtutis propter aegritudinis diuturnitatem. Tardus, propter caloris naturalis defectum, suique congelationem. Cruditas urinae, est propter frigiditatem complexionis corporis dominam.

pp 3 tem,

tem, & propter naturalem calorem in loco coctio-
nis deficientem. Subtilitas & claritas sunt propter
corporis siccitatem, & propter naturalis humidi-
tatis indigentiam. Consumptio quæ est calida & si-
ne febre, fit propter calidos chimos cordi opposi-
tos, quorum fumus ad cor ascendens mutat eius cõ-
plexionem, eiq; accidentalem præstat calorem, un-
de sanguis corrumpitur, & propria eius saporosi-
tas mutatur, et mēbra cum odientia, nec ab eo nutri-
ta consumūtur. Vnde Galen. Vidi, inquit, hūc chimū
sensualiter, uolēs enim corporis interiora perscru-
tari, sicut stomachū, intestina, et similia, et præcepi
in spaciofo loco simiā poni, et sæpe perquiri, ut qua-
liter corpus eius cõsumeretur, cognoscere. Tādem
per medium diuidens eam inueni ad cor eius humo-
res corruptos, quorū fumū ad cor ascendisse, & su-
am cõplexionem corrupisse credidi. Quocirca an-
tiqui hanc cõsumptionem phthisim decrepitā uoca-
uerūt, & sic est de phthisi naturali et nō naturali.

Ex traditione neotericorum seu
nouitiorum autorum.



Liquando phthisis cum febre fit, & hoc
duobus modis, teste Salomonis filio, aut
ipsa per se est morbus, aut propter ali-
ud. Que

uid. Quæ uero per se est morbus fit ex rebus cale-
facientibus & desiccantibus, plurimum tamen eius
causa est ephimera, maxime si propter exercitia a-
nimæ fiunt, sicut propter uigilias, cogitationes, tri-
stitionem, angustiam, legere, & inuestigare, ex omni-
bus enim istis animalis spiritus fatigatur, & etiam
spiritualis, et accidētalem accipiunt calorem. Qui
calor cum morabitur, substantialem desiccāt humi-
ditatem, et cōsumit maxime si corpora fuerint præ-
parata, sicut sunt calidā & siccam complexionem
habentes, macilenti stricta habētes pectora, & ca-
pita spatularum foris exeuntia, sicut auium alæ, in
ætate stantes iuuenili, uidelicet, quæ est à 18. an-
nis usque ad 35 præcipue si ætas fuerit, uel calidus
aër, aut regio calida. Nonnunquā etiam fit
propter corporea exercitia, sicut est propter æqui-
tare, aliosuē labores facere, aut propter calida
cibaria, potum & medicinā. Phthisis uero quæ est
cum febre, fitq; propter alium morbum, est quatuor
modis. Quia aut est de ephimera quæ moratur
in corpore, et propriū terminū trāsit & sanguinē
calefacit. Aut est propter acutā febrē cū calefacit
& extenuat sanguinē, et dominās substantialē con-
sumit humiditatē. Aut est ppter febres putredinis
cum commiscantur & suas mutāt interpolationes.

Pp 4 Ant

Aut est propter diuturnas egritudines cōsumentes
membrorum humiditates, sicut cōtingit ex tussi, do
lore pectoris, pulmonis, diaphragmatis, renum &
ilij dolore, qui est de calore, & de omnibus aposte
matibus, quæ sunt proluxa corpus calefacientia &
consumentia. Humores in corporibus nostris sunt
quatuor: Vnus est in uasis sanguineus, uidelicet, hu
mor in uenis existens, sicut humiditas arborum ter
ræq; nascentinm permanens in summitatibus corū
& circa, & uelut humiditas in ramis uitis existens.
Secundus, est humiditas quæ est in membrorum cō
cavitate, in quibus natura nōdum tertiam perfecit
digestionem, nec eam membris assimilauit, sicut a
quosa humiditas quæ est in arboribus & terræ na
scentibus, & uelut humiditas quæ est in frumēto, et
in uuis nōdum maturis. Tertius, est humiditas mē
brorum quā natura incepit operari, sed tamen
nondum coagulauit neq; perfecit eam, sicut caro
tenera quæ non est in membris assimilata, & sicut
humiditas frumenti, quæ cœpit coagulari & sapo
rifera fieri, mollis tamen adhuc permanet, & sicut
humiditas uuæ coagulari & dulcis fieri incipiētis,
sed tamen nondum est deficcata, nec ad duriciem
conuersa. Quartus, est humiditas membra regens
& custodiēs, sicut humiditas in mēbris coagulata,
& ad

Et ad ea conuersa, Et cum membris unum effecta,
 Et uelut humiditas frumēti coagulata, Et substan-
 tiæ frumenti assimilata, illud ne putrefiat custodi-
 ens, Et sicut humiditas uuarum passarum substanti-
 am earum ne putrefiat, obseruans. Igitur quia cor-
 porca humiditas quadruplex est, necessario speci-
 es ethicae tres sunt: Vna, est humiditas in membro-
 rum concauitate permanens, in qua natura nōdum
 tertiam digestionem operata est, nec membris eam
 assimilauit. Secunda, est membrorum humiditas
 quam operari natura incēpit, Et tamē non coagu-
 lauit, neq; eam perfecit. Tertia, substantialis est hu-
 miditas, qua regūtur Et custodiūtur membra. Cau-
 sa prima est hæc: Humiditas enim sanguinis si aug-
 mētetur Et naturam exuperet, odio tenebitur, nec
 ab ea regetur, nec mūdificabitur, quæ amplius mo-
 rans maxime bulliens, calefit Et putrefit ex corpo-
 ris calore, Et febris putrida secundum suam mate-
 riam intra uasa generabitur. Quod si non augmen-
 tetur, nec à natura dimittatur, sed solum propter
 id quod in ephimera diximus calefiat, et calor usq;
 ad mundificādum sanguinem qui est in arteria de-
 ueniat coniungetur, Et cum eo cōfortabitur, Et ue-
 narum Et arteriarum substantiam calefaciens, ca-
 lor etiam usq; ad humiditatem in raritate membro

rum permanentem accedet, & eius unctuositatem desiccabit. Quæ quia unctuositatē & saporem amittit, merito à membris nō suscipitur. Membra ergo nutrimento carentia consumentur, & hæc est prima species ethicæ. Proinde hæc species ad curandum facilis est, si patiens sapientis manū incidat. Medicus uero si incipiat uehementer corporis calorem extinguere cum frigidis & humidis, sicut cibo & potu, aëre, odore, & similibus, citissimè calorem extinguet, & infirmū sanabit. Cui nisi succurratur, & calor in corpore sic permanens & augmentatus, & usq; ad humiditatem mēbrorum, quæ coagulationi est uicina deueniat, eorumq; desiccet unctuositatem & saporositatem, membris non assimilatur, ipsis eam odientibus, unde consumptio & siccitas eorum augmentata fiet, & hæc est secūda species ethicæ, quæ molesta est ad curandū. Quod si calor magis augmentetur, & substantiali membrorum humiditati dominetur, & eam desiccet, & ueniens ad humiditatem membrorum quæ fuerat cum eis ab initio compositionis, desiccet eam, fit tertia species ethicæ quæ est incurabilis. Calor enim extraneus humiditatem membra custodientem desiccabit, operans in ea, sicut calor solis in lapide & ligno operatur. Calor enim solis in longo
tempore

tempore lapidum & lignorum humiditatem desiccant & eorum iuncturas separat, & ea quasi cinerem facit. Causa est, quia lapis & lignum sunt de quatuor elementis composita, proinde calor in eis hæc operatur, quod testatur actio ignis in lapide, desiccant enim & ad calcem illum conuertit. Est ergo possibile ut simili modo operetur calor solis longo tempore. Nulla enim est differentia inter calorem solis & ignis, nisi quia ignis uelociter, iste uero tarde operatur. Possumus ergo intelligere quod lapis substantialem habet humiditatem, cum arbores & herbe in montibus & lapidibus oriuntur, quæ si humores non haberet, nutriri & augmentari minime posset. Quantū ad curam ethicæ: Syrupi simplices in ethica cōuenientes sunt syrupus de pomis, de persicis, de succo acetosæ, de succo endiuie, cucurbitæ, de prunis, de granatis dulcibus & acetosis, de acetositate citri, & maxime si hi syrupi cum aqua lactucæ & cucurbitæ, uiolarum, endiuie fuerint admixti ad ipsorum contemperandam siccitatem. Ex compositis conuenientibus habemus syrupum de papauere factum cum saccharo solū, & non cum penidijs, syrup. de portulaca factū sine aceto, syrup. uiol. syrup. de iuiubis. Vel facias talē syrup. magistralē: Recip. Duas uel tres testudinis

nemo-

nemorales in feruēti aqua bene lotas suis abscissis
 extremitatibus, & eas debite coque, quo facto ac-
 cipe pulpas, & eas in mortario bene contere, quas
 in uase uitreo bene reconde, deinde accipe succi li-
 quiritiæ, gummi arabici, tragachanti, seminis papa-
 ueris albi, lactucæ, portulacæ, maluæ, & quatuor
 seminum frigidorum maiorum ana ℥. s. seminis ci-
 toniorum, seminis bombacis ana ℥. 6. passularum
 enucleatarum mundatarum, sebesten, berberis ana
 ℥. s. spodij ℥. 3. rosarum, uiolarum, hordei excorti-
 cati, capillorum ueneris, boraginis, buglossæ ana
 M. 1. contundantur & ponantur cum carnibus illis
 super quas projice tres pintas aquæ fontis, deinde
 uas cum argilla uel pasta diligenter obturetur, ut
 nequeat expirare, & usq; ad tertiæ partis cōsum-
 ptionem in alio uase aqua pleno bulliat, demum to-
 tum extrahatur & fortiter exprimatur, & cum ta-
 li expressione in libris quatuor sacchari fiat syru-
 pus. Conueniens mixtura in hoc casu est talis: Re-
 cip. Conseruæ uiol. buglossæ ana ℥. 2. conseruæ bo-
 raginis & florum nenupharis ana ℥. 1. s. sacchari
 albi ℥. 2. margaritarum ʒ. 2. fragmētorum saphi-
 ri, smaragdi, hyacinthi, granati, rubini ana scrup.
 1. foliorum auri numero 2. fiat mixtura & deau-
 retur. Ex confectionibus in hoc casu conuenienti-
 bus

bus solidis conueniunt manus Christi cum perlis factum cum aqua uiolarum, diapapauer, diarrhodon Abbatis, diatragachantum frigidum. Trochisci huic proposito pertinentes sunt, trochisci de camphora, & sunt Auicennæ: Recip. Spodij, boli armeni ana ℥. s. rosarum ℥. 6. carabæ, seminis portulacæ, cucurbitæ, uel cucumeris ana ℥. 2. fiant trochisci cum muscilagine psyllij uel tragachanti. Electuarium quo utuntur Reges, & est mirabile in hoc casu, quia alteratiuum & maxime resumptiuum: Accipe 2. uel 3. testudines nemorales, & abscisis pedibus & capite, amotisq; uisceribus ac testa debite lauentur, deinde decoqui facias in aqua uiolarum uel rosarum, quo facto accipe de pulpis lib. s. quas cum cultello minutim incide, et postea in mortario ultimata contritione terantur, uel potius in mola in qua sinapis teritur, prius tamen bene lota addendo de brodio, sic ut melius conteri possint, uel de aqua rosarum uel uiolarum, deinde accipe 4. sem. cōmunium ana ℥. s. sem. lactucæ. sem. endiuie, sem. portulacæ, sem. papaueris albi ana ℥. 1. ista fortiter pistentur, supraq; proijciatur parum brodij, uel aquarum prædictarum, & colentur ex his ultimata expressione faciendo, quo facto accipe amygdalarum dulcium mundatarum ℥. 6. granorum pini ℥. s. fisticorum

fisticorum ꝑ. 3. ista ultima contritione terantur, & cum expressione suprascripta fiat lac, cum quo dissolue sacchari albi lb. 1. s. addendo de brodio testudinis si opus fuerit, deinde coquatur, cum coctum fuerit & incipit infrigidari, adde carnes illas contusas, & illas cum saccharo illo in caziola & mortario debite misce, ultimo adde pulveres infra scriptos: Recip. Gummi arabici, tragachanti ana ꝑ. 1. s. margaritarum, trias. ana ꝑ. 3. s. corallorum rub. ꝑ. 4. cinnamomi ꝑ. 1. & fiat pulvis, & si adde res ꝑ. 5. succi liquiritiae melius esset, sed electuarium non esset ita delectabile. Posses hoc electuarium cum gallinarum, phasianorum, caponum, uel perdium cum pulpis conficere, de quibus fac ut de testudinum carnibus, sed testudinis caro praeualeat in isto casu. De his quae à dextra conveniunt sunt balnea, unctiones, epithemata, odoramenta, quae ob brevitatem doctis relinquo.

De febre sanguinea. Cap. IX.

Ex traditione Graecorum et Latinorum.



Nunc uero (ait Galenus in libro febrium ad Glauconem) incipiamus dicere de acutis febribus, & periculosis synochis, quae non habent ἀντίστροφον, id est, declinationem induciarum

duciarum, sed in uno eodemq; motu perseverant, aut in peius crescendo, non deficiunt ante creticum diem, id est, ante 3. diem, uel 4. aut 5. aut 7. aut 9. aut 11. aut 13. aut 14. aut ut satis 17. quia difficile est ut ad decimum nonum, aut ad uigesimum diem peruenientes, isti crism non faciant, aut uitæ, aut mortis, aut enim istis taliter febrientibus, aut uincit, aut uincitur pugnando $\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$, id est, corporis natura. Et hoc maxime in istis febribus synochis tam acutis & asperis artifices medici probantur, periti autem a te medicina, medicinalibusque beneficijs armati succurrant, & auxilientur antequam laxetur, & uincatur continuis febribus repugnando natura. Synochum autem sic cognoscis, primum quidem si in uiginti quatuor horis diei & noctis non faciat $\alpha\epsilon\tau\epsilon\sigma\iota\varsigma$, id est, declinationem nec desinit, sed in eodem motu permanet, aut magis inuenitur acrior. Et si inæquale, & turbulentum augmentum fecerit, scito longinquorem febrem futuram & non sine periculo. Synochi tres sunt species, scilicet, omotenus, qui est maior, & augmentasticus, quæ secundo loco ponimus, tertio uero epaugmentasticus dicitur, quorum quidem signa & curationes eorum sigillatim exponam. Inter synecim autem & synochū hæc habetur distantia, & quanquā sit eis apertissima

apertissima similitudo, tamen inter eos ita separatur atque distinguitur intellectus, nam synochus non habet anesim sed magis augmentatur. Sinecis uero dum simili ægritudine retineat caput, unde tamen et si non plene mundarum habet horarum remissionem. Nam synochus ex sanguine et felle rufo commixtus nascitur Sinecis uero ex fellis rufi abundantia concreatur. Quæ quidem simili modo ut synochus causari curari debet maxime, phlebotomo, si tamen ætas aut tempus, aut fortitudo permiserit, aut si non, è contrario aliud occurrat quod prohibeat, et quauis tempore isto ratio in omnibus supra dictis phlebotomum adhiberi prohibeat, tamen et pro causa faciendum est ei cubiculum, et pro tempore præparatum, si ætas, aut fortitudo permittat, ita ut mediætas sanguinis deducatur.

Ex traditione Pœnorum &
Arabum.



Nascitur febris continua de puro sanguine cum intra uasa, non tamen putrescens, calefiat. Et huic proprium est inflare, quia de puro sanguine nascitur, cuius in corde et pulmone plurima est uirtus, unde calor inflatiuus ista febris ab antiquis uocatur, quia calor pectoris siue pulmonis est causa suæ inflationis. Differt autem
nascens

nascens de sanguinis putredine, & quæ nascitur de eiusdem ebullitione, quia prioris febris foetet urina, pulsus est diuersus, quia constringi se uult magis & sepius quàm dilatari, propter festinantiam naturæ in expellendam superfluitatem uel fumosam putredinem. Altera nulla habet huiusmodi accidentia, quia signa præueniunt eam futuram prænuntiatiua antequàm appareat, scilicet fatigatio, grauitas membrorum, plenitudo eorum, rubor caloris, calor superficiei corporis. Hæc autem signa sequuntur eam, dolor capitis, incensio, grauitas sui, tumor temporum, egressio oculorum, paruitas sitis, & stupor assiduus, imaginatio rufa ante oculos, pulsus uelox & fortis, urina rubicunda. Plurimum hanc sequuntur uariolæ, quæ cum sint, oportet ante statum morbi de uirtute infirmi perquiri, & ætate, atque complexione, aëre, consuetudine, quæ si conueniāt, & uirtus maximè, phlebotomandus est infirmus, de sanguine quantum sufficit auferatur. Si autem morbi initium propter nimium sit cibum quem comederat infirmus, & adhuc in uentre sit coadunatus, oportet ut in die secunda uel altera suspendatur phlebotomia, quatenus in digerendo cibo confortetur natura & à uentre excludat, quod si non fiat naturaliter, faciamus artificialiter. Si autem nul-

29 la ho-

la horum particulariū conueniant signa, nisi uirtus sola, scarificemus & non phlebotomemus, omnib. uero alijs congruentibus, sola tamen uirtute dissonante, neq; phlebotomari, neq; scarificari est necesse, quia uirtus sola semper morbo repugnat, unde semper est inuestigāda & obseruanda, confortāda quoq; ac coadiuuanda pro posse nostro. Si uero obuietur phlebotomiae quibusdam ex causis quas debemus dicere, caueatur maximē in statu, uel in augmentatione, & si uirtus uideatur cōgruere. In his enim duobus temporib. uirtuti non confidimus adeò laboranti in morbi repugnationibus, oportet ergo extinguere calorem et acumen sanguinis cum psyllio, succo maligranati, syrupo uiolato, syrupo de pruinis. Quod si egestio obuiet, erit humectāda cū oxyphoenicia, casia fistula, uiol. manna & similib. Rasis: incipit calida sine tremore, & rubet cū ea facies et oculi ualde, & cōstringitur anhelitus, et tactus eius sicut tactus balneati, & fuit regimen cum eis quae praecesserūt, regimen multiplicatiuū sanguinis et est ante cōmotionem eius grauitas in corpore, & additio in somno, & pulsus est cū ea magnus et plenus, & urina est rubea & spissa. Et cura eius est ut succurras ei in principio rei, & antequā uirtus cadat ualde cum phlebotomia, & dimitte sanguinē curre

re

re donec ægro superueniat syncopis, & si fuerit debilis, ciba ipsum medulla panis cum aqua granati muzi & aqua agrestæ, deinde dimitte eum, & ad ultimum non dimittas quin præcedat egestio sanguinis usque ad syncopim, & post illud da ei in potu aquam granati muzi, & ciba ipsum aqua hordei, & rege ipsum regimine habentium causon febrem, sed sit cum extinctione minori. Et si tardatur phlebotomia in dispositione sua, stude addandum illi in potu aquam frigidam plurimam, & da ei in potu ex illa usque quo satietur, aut infrigidetur & tremat. Si ergo declinat iam sufficit tibi, & si redit usque quo declinet, & fiat febris leuis adherens, & tunc quidem rege ipsum regimine febris phlegmaticæ hoc enim regimen confert in hac febre, & ego iam expertus sum & probaui ipsum, & liberata per ipsum genus plurima quæ erat iuxta mortem à timore magno. Non sis ergo piger in dando in potu aquam frigidam cum uehemens est necessitas, nec dimittas eam nisi quando hæc febris synocha est ex apostemate in stomacho, aut in epate, aut matrice, aut renibus, aut uesica, aut diaphragmate & pulmone, & proprie in diaphragmate & pulmone & pectore.

Ras

Qq 2

sis

sis. 10. ad Almanforem, cap. 6: Synochus tres habet species: Vna, est in qua à sui principio non cessat augmentari malitia usq; quo ueniat crisis, aut æger moriatur. Alia uero est, quæ semper in una moratur dispositione. Tertia quoque est, quæ quotidie à sui principio minuitur. Illa autem quæ semper augetur plus indiget munitione quàm aliæ, post quã ea quæ unius est tenoris, secundo eget, licet etiam tertia ea non sit priuanda. Illæ tamen due plus indigent, & præcipue ea quæ est cum augmento semper. Auicenna: intentio in curatione febris, sanguinis est euacuatio plurimi usq; ad syncopim. Et ingrossatio substantiæ sanguinis, si fuerit subtilis ualde aquosus et cholericus. Et infrigidatio eius & mundificatio & subtiliatio ipsius si fuerit grossus, & sumpserit æger prius generatiua sanguinis grossi, & generatiua humoris crudi. Et digestio materiei facientis febrem & eius resolutio. Euacuatio autem non est aliqua sicut phlebotomia ex manu in quacūq; hora accidat. Et non expectatur crisis, neq; digestio nisi sit repletio nauseatiua, tunc enim caue eã & remoue ipsam. Quod si febris perseuerauerit, tunc phlebotomia. Et nõ cesses phlebotomare donec æger appropinquet syncopi aut cadat in syncopim si corpus fuerit forte. Syncopis enim infrigidat cõplexionem fortem.

fortem. Isaac: Quia hæc febris fit de putrido sanguine in uasis, decet phlebotomari priusquam non putrefactus sanguis putrescat, prius tamen consideratis uirtute, ætate, tempore, regione & consuetudine, an sint cōueniētia, deinde minuatur sanguis ante statum, quia phlebotomia omnib. curis synocha & synochi est melior. Sinocha autem cōuenientior est, quia sanguis eius purus est. Quod si omnia prædicta sint conuenientia, uirtus quoque non sit imbecillis, scarpellis his succurrendum est. Item omnib. supradictis bonis & uirtute debili existente, ne temere sanguis minuatur cauendum est, sicut diximus in causa synochæ, in qua monstrauimus sanguinem non debere minui in statu, nec in augmento, quia inde natura impeditur. Nam uirtus licet in his utrisque febribus sit fortis in augmento & statu, tamen non oportet nos ei credere. In initio ergo nisi uirtus obstiterit, minuatur. Si autem in initio non ausi fuerimus, extinguamus acumen sanguinis cum succo granatorum, oxyphœnitia & similibus.

Ex traditione Neotericorum seu
autorum recentium.

DE sanguine due generantur febres: Vna quæ synocha inflatiua appellatur, alia dicitur synochus putridus. Et si fuerimus

Qq 3 inter=

interrogati quæ sit differentia inter febrem synocham, quæ fit ex putredine sanguinis, & synocham quæ non fit ex putredine quæ inflatiua uocatur. Respondeo: quod in synocha quæ fit ex putredine sanguinis patiens facit urinam putridam, & pulsum habet inordinatū quia constrictio eius uelocior est, quàm dilatatio propter naturam festinantem se ad expellendam sanguinis putrefacti aquositatem. Inflatiua uero sic cognoscitur, quia urina patiētis nullam habet putredinem, quia materia eius est purus sanguis non putrefactus. Quod si repræhenderint nos quidam dicentes: quomodo accidit sanguini putredo, cum amicus sit naturæ & per eum regatur & nutriatur corpus? Respondetur quod licet sanguis amicus sit naturæ, tamen aggrauat naturam cum augmentatur, unde odio habetur ab ea, sicut pater odit filium cum ei non obedit. Sanguis ergo à temperamento egressus à natura eiicitur & per nares eiicitur, aut per alias partes egreditur, quem si nō poterit expellere, dimittit eum, unde putrefactus synochum generat. Rursum si dixerint quæ sit differentia inter febrem quæ fit de putredine sanguinis, & febrem continuam, quæ fit de putredine cæterorum humorum. Respondeo: febris quæ fit de putredine humorum, licet uideatur continua esse, bonus

Bonus tamen medicus si bene eam inuestiget sentit
eius interpolationem, quæ fit inter finem unius ac-
cessionis, & initium alterius. Sed synocha nullam
habet decessionem, nec aliquid tranquillitatis, nisi
in extremitatibus dierum cum aer fuerit frigidus,
quæ mitigatio non fit propter febrem, sed quia in-
firmus gaudet de aeris frigiditate, febris acumẽ mi-
tigante. Quæ trib. modis est, & in tres species diui-
ditur. In augmasticã, epaugmasticã, omotenam, siue
in febrẽ addentẽ, siue diminuentẽ, siue unius teno-
ris. Epaugmastica est ualde salubris. Augmastica
est ualde mortalis. Omotena medio modo se habet.
Hæc aut diuersitas prouenit propter diuersum mo-
dum putrefaciendi, & propter diuersitatem reso-
lutionis putridi sumi. Vnum sumitur ex parte hu-
moris, reliquum ex parte corporis. Si enim maior
fiat resolutio uaporis horribilis & maior euentatio
quàm putrefactio humoris, fit epaugmastica. Si e-
conuerso augmastica, si æqualiter omotena, quia si
sanguis sit multus acutus & calidus, totum corpus
putrescit, & postea paulatim declinat, sicut patet
in palea combusta. Si ergo libera sit euentatio &
resolutio propter largos poros, hac uia genera-
tur epaugmastica in contraria dispositione fe-
bris contraria. scilicet augmastica, & in media

dispositione febris media, scilicet homotena. Deinceps ad curam synochi putridi ueniamus. In istius cura incipiendū est à sanguinis extractione à phlebotomia basilicæ, si uirtus & omnia alia particularia cōueniant, uel à uentofatione super humeros, si sola uirtus cōueniat, & alia particularia nō sint cōuenientia. Si autem sanguinis extractio prohibeatur, uel etiam sanguine iam extracto, insistendū est cum refrigeratiuis & dissolutiuis. In principio ergo talium dīspositio sanguinis est attendenda, utrū sit acutissimus cholericus, aut grauis phlegmaticus, aut medio modo. Si ergo uehemēter sit calidus acutus, detur succus malorū granatorū, psyllū, oxyphœntia, & hoc cum succo granatorum & aqua resoluantur & exhibeantur, uel syrupus uiol. uel nenupharis cum casia fistula & manna resolutis, demus aquam hordei ad bibendum. Si autē sanguis sit grauis phlegmaticus, resoluamus casiam fistulā & mannam cum aqua decoctionis absinthij, endiuie, marathri, prunis, uiol. Si medio modo se habeat, coquantur iuiubæ mundata, scm. endiuie, & resoluatur casia fistulæ ℥. s. manne ℥. i. exhibeantur. Si autē per hoc uenter non laxatur, fiat suppositorium de succo mercuriali, melle & sale, et ℥. s. scamoni. Si autem nec sic laxatur, fiat clystere cū refrigerantib.
ut sunt

ut sunt uiolæ, maluæ, mercurialis, hordcum munda-
tum, lotura surfuris. In istorū decoctione ponatur
mel, & oleum uiolarum cum modico sale & eijcia-
tur, & potest addi medullæ casie fistulæ ℥. s. uel ℥.
1. remouendo mel. Si adsit dolor capitis, prædictæ fi-
ant illinitiones, & fomentationes, & cataplasma-
ta de santalis rubeis & oleo uiol si tamen stupor et
catarrhus sint absentes. Si uero adsit uigilia, raso ca-
pite humectetur caput cum aqua decoctionis papa-
ueris, lactuæ, uiolarum, absentib. catharro & stu-
pore. Si adsit pūctio in stomacho, accipiat succū cu-
cumeris uel cucurbitæ cum succo malorū granato-
rum. Si cardiacam tremorū patiantur, super os sto-
machi ponantur cataplasma de santalis roß. mal-
ua, farina hordei, de cinerib. fornacis fabrorum &
pauca camphora. Hæc distēperentur cū succo por-
tu'acæ, semperuiui, arnoglossæ & aceto. In super-
fluo fluxu sanguinis per nares, argillam cum aceto
distemperatā super totam frontem & faciem pona-
mus. Cura autem synochæ inflatiuæ ferè est eadem
cū cura synochi putridi, nisi quod cura synochi est
grauior. Si tamen in ea omnia particularia conueni-
ant, ut est uirtus, regio, ætas, tēpus, cōsuetudo, habi-
tudo, festinetur phlebotomia de mediana. si pectus
habeat sanum & forte, si uero non habet pectus sa-

num & forte bene de basilica, & sanguis extrahatur quantum uirtus poterit tolerare, quia multa phlebotomia quandoque sufficit ad curam, ita ut per hanc uno die tota febris auferatur & curetur. Si autem uirtus sit fortis & alia particularia non conueniant, sicut etas & supradicta, tunc scarpellemus solum, id est uentosas super humeros ponamus cum forti scarificatione, hæc enim cor et pulmonem in frigidat, & sanguinem temperat bullientem. Si autem uirtus sit debilis, quocumque modo se habeant particularia, nec sic, nec aliter de sanguinis extractione nos intromittamus. Similiter si febris sit in augmento, uel in statu quocumque modo se habeat uirtus, uel alia particularia, nunquam sanguinem extrahamus, & cum solis in frigidatiuis est insisterendum. Et sicut dictum est in synocho putrido, procedere in cura synochæ inflatiuæ debemus. Cauendum tamen ne aqua frigida exhibeatur cum sanguis est grossus & indigestus, & cum uiscera sunt debilia & apostemata nisi forte sit apostema uehementis caliditatis.

De pestilenti febre.

Cap. X.

Ex traditione Græcorum & Latinorum.

Diximus de ijs febribus in putridæ materiæ genere, quas acutas simpliciter uocamus

camus, nunc transeundum est ad id febris genus acutissimum, quod pestilentiae casu euenit, subitoq; plurimos rapit, uano affectum euentu.

Huius mali uariae sunt causae, ut diligentiores physici tradidere. Aëris enim intemperies, ui quaedam uenenata, regiones, & coeli tractus ingentes infestat syderum errantium tabifico influxu, qui nobis circumfusus per respirationem cordis uitalia letaliter subit; alij etiam per cutis meatus, cui spiritus sanguisq; commoti protinus accurrunt, quibus infectis, febris exinde pestifera oboritur. Prælio quoque sanguinolento strageq; facta numerosissima, spiritus exitialis (ut Galenus scribit) regionibus propinquis, pestilentiam inducit. Constatq; Aphricam insigni quondam pestilentia debilitatam fuisse, quam locustæ innumerabiles immerse mari, & ad littus reiectæ putrido uapore excitarunt. Post item magnos terrarum motus pestilentia sæpe orta est, diro in profundo latente uapore, qui pigritia, longo situ, & æterna nocte torpescibat, hunc postea purum aërem liquidumq; infecit, ac polluit, unde nouas febres attulit paucisq; notas. Paulus Aegineta inter medicos auctor egregius, omnes qualitates in aëre noxias inueniri posse affirmat, quibus humana habitudo

tudo in hunc morbum prolabi potest. Inuenti enim sunt ætate nostra, qui extrema senectute rapti sunt qui prius iuuenes in maximis pestilentijs tuti fuere. Variæ enim causæ sunt ex quibus uarij effectus proueniunt. Mirumq; uestimenta lanea præsertim hanc pestem diu conseruare. In primis hominis proprietatem, ac aëris circumfusi, uel aquæ, uel alterius rei naturā nosse oportet, quibus facile occurrimus contrarijs qualitatibus, uel ijs quæ sine certa qualitate, sed speciali duntaxat forma subueniunt. Verū prius, quod diuinus Hipocrates incessanter clamabat, per quā humida corpora siccanda, impuraq; purganda, ac poros aperiendos corporis, quod Galenus se factitasse scribit, quo tempore frequentes carbūculos oriri uidebat, certissima pestilentiae auguria ex abundanti putredine. In quo casu sanguis mittendus est, sed modus seruandus, magis tamen quib. in usu est, uel quib. sanguis melancholicus substituerit, ut menses in mulieribus, & marib. hæmorrhoides, aut in utroq; genere narium profluuiū, tempus idoneum est plenilunio. Qui uenam secari non patiuntur, natibus cucurbitas imponant, aut sanguisugas, sanguineis ac morbidis corporib. id sæpius fieri debet. Vomitus obest nisi sponte fiat. Malam enim materiam ad uitalia trahit. Aluus molliēda est rore syriaco,

riaco, quod manna uocant Iudæi, officinis nunc fami-
liarissimo. Siliqua Aegyptia, quam casiam fistulā fal-
so appellauere, casia fistulæ odoratæ nomine erro-
re manifesto Galeni, Plinijq; graui testimonio, tha-
marindis quoq; ac uiolacea potione. Alij ubi aluus
astricta est, clysterem infundunt communem. Pau-
lus Aegineta autor grauissimus spondet Galeni au-
toritate, rubricā armeniacā potam 3. 1. summo pe-
re prodesse, & hyeme theriacā pari modo ex uipe-
ris compositam. Quæ Romæ Galenus usus est maxi-
ma in pestilentia, quæ omnib. bibentibus salutaris
fuit. Sed eo peruenit audacia ut nō solum priora im-
mutarūt, sed etiā aliquid addiderūt. Catapotia sunt
Ruso ascripta, quæ ex ijs fiunt: aloës epatici lotæ
3. 4. myrrhæ purissimæ quam staeten uocant, cro-
ci, omnium 3. 2. ex uino dantur summo mane 3. 1. aut
semidrachmā. Qui his catapotijs usus est ut Rufus,
neq; pestilentia, neq; cōtagione unquā correptus
est. Paulus Aegineta aliter describit hanc potionē
propinādā, quā nostri in catapotia digessere, quo
deuoratu faciliora essent. Ille autem ex Ruso demō-
strat: Aloës epatici lotæ partibus duabus, armoni-
aci, thymiamatis tantundē, myrrhæ parte una. Hæc
in uino diluta merationi danda sunt, prisca cyathi
mensura. Vbi corpus refrigerandū est, uiolacea po-
tione

tione utimur, rosacea, uel citrei mali admixta portu-
 laccæ aqua, cichorij uel seris acetosæ, quam oxalis
 dem quidam uocant, Cretes oxynidam uulgo dicunt.
 Sonchi buglosi illam scariolā uocant, omnium semi-
 uncia. Alia potio est diligentioribus obseruata, miri
 effectus, in qua & stomachi & cordis ratio habe-
 tur. Seris, sonchi, acetosæ, buglosi, singulorum ma-
 nipulus, seminis item acetosæ, portulacæ, seris, &
 mali citrei excussis tunicis omnium semiuncia, rosa-
 rum rubearum, uiolarum, nymphææ, lilia, buglosi
 utriusq; generis omnium drachmæ. 3. roris marini.
 3. 2. aquæ rosacæ triduo iusta infusione maceren-
 tur, postea per furnibulum leni flamma destillans
 aqua excipiat, in qua & saccharum addimus, &
 citrei mali succum, & santalorum farinam, spo-
 dijque momentum, eadem facito inferueant, ad li-
 quidi mellis crassitudinem, ex qua bine uncia per
 se mane assumuntur, & tribus horis ante coenam.
 Vbi excalefacere opus esset pro cœli qualitate ac
 hominis habitudine, ea potio utilis est, in qua be-
 tonica, chamædrys, cichorium, calamintha, samp-
 suchus, omnium pares portiones, cortici medici ma-
 li, zedoariæ, iunci odorati, stœchadis, exiguo gario-
 phyllo ac cinnamomo addito. Animaduertendum
 tamen est ubi hominis habitudo frigida est, ac cœli
 qualis

qualitas contraria, naturam hominis sequi oportere, in qua sententia & Galenum fuisse uideo, nam aëris caliditati sponte aduersatur natura. Atque ex omni confesso id elaborandum est ut corporis omnino temperamentū, uictu, exercitatione, potionibus, leto animo, cæterisq; præsijs conseruetur. Hinc ad curationes pestilentiæ trāseamus. Si uero neglecta obseruatione, aut per ignorantia, aut ex improviso, uel alio casu febris pestilens ex familiarib. aliquem inuasit, confestim mutandus est cœli status, & in plures partes distributa familia, longinquæ regiones petendæ sunt, uel ita segregandi omnes, ne, si quis contagione male affectus est, alium quoq; contamine. Plurimū ex sanguine biliq; rufa, ex phlegmate uero raro, cum uitio aquæ uel pestiferi cibi fuerit, fieri solet. Galenus horā prædij, ac cœnæ pro consuetudine laudauit, alij uespertinā matutināq; præferūt interdiu, & sæpe salutares mixturas, confectiones, uariosq; potus et saluberrimos cōtinēter præbēt. Cōfectiones santalinæ plebi idoneæ sunt cū aqua rosacea. Alia minus iucunda, sed miræ uirtutis, ac faciliior, in qua rosacæ uncie tres, rubricæ armeniacæ & uini odorati nō austeri singulorū uncia. Alij theriacam dedere, admixto smaragdi gemmæ pollinæ ex aqua rosacea. Alij alia impe-

rant,

rant, quæ palato, naribus, ac stomacho non conueniunt, de quibus obiter minus dicendum putamus. Maximam desiderat animaduersionem in pestifera febris sanguinis dimissio, quæ largior imperanda est, si sanguinis uitio contigerit, si ætas, ac uires sunt. Exiliior, cum ubi alter humor admixtus est, qui si simplex fuerit, alui deiectione magis prodest. Dandaque opera est ne importune uena feriat, nihilque nocentius est sanguinis dimissione ubi necessaria non est, uires enim corporis maxime subducit. Cathartici ratio est, ut nihil uenenati, nihilque molesti habeat. Si bilis rufa infestat, hoc medicamento tuto celeriterque trahitur, in quo ponuntur roris syriaci uncie due, radicis barbaræ per noctem infusæ 3. 2. in aqua cichorii, acetosæ, meri albi omnium semiuntia. Si mo mane linteolo mudo radicem exprimes, in eo succo rorem syriacum antedictum admiscebis, aqua buglossa prius maceratam. Hanc potionem statim saluberrimam dabis. Si ros antedictus pro ægri fortuna emi non potest, succus filiquæ Alexandrinæ uicem implebit. At ubi pituita est, agaricum oxymelite præparatum utiliter datur, quod et cordi conuenit. At polypodio, epithymo, senna, atra bilis eximie purgatur, adusta materia radice barbaræ, sumiterræ succo, ac caprino sero. Composita denique morbi materia compositis

fitis remedijs curatur. Narrant qui experta pro-
dunt, si quis initio pestilentie febris calendule suc-
ci uncias duas aut tres ad summū biberit, deinde ue-
stimentis operiatur, liberum reddi ab ea labe. Hæc
uulgaris herba est sponte nascens in Gallia. Multi
scabiosæ succū ad hos usus efficacissimū prædicant,
quo ueneni uis duodecim horarum spacio propella-
tur. Alij non minorib. laudibus succū uerbenæ eius-
dem effectus celebrauere. Miram uim habet aduer-
sus pestes tormentilla radix rubra odorata, quam
sparganium Græci uocant. Nam & contra serpen-
tes bibitur 3. 2. pond. ex uino. Dictamnū præterea
laudatur cretensæ & in altissimis montib. inuentū,
à Dioscoride, Galeno, Plinioq; cōmendatū scrupuli
pond. ex rosacea. Aliqui spē maximā in rubrica lē-
nia habent, solamq; prodesse spondent, cui maximā
autoritatē dedit Galenus in libris suis. Alij betoni-
cā summis laudib. prædicauere, uel siccæ farinā ex
uino. Violentiam enim morbi ad extrema expellit.
Nōnulli cichoriū præferūt æstate. Alij uerò maiora
audētes, hoc modo aquā colligūt ex furnibulo. Ca-
lendule, sparganij, dictāni, betonicæ, citreaginis o-
mnium manipulū, rubricæ armeniacæ uncia, machir
3. 3. aceti librā, per noctem cōperso destillationib.
cōstituūt, ex quib. aquæ sesquiuncia satis est si mane
propinatur. Sanū enim hominē à pestilentia reddit

R r

ualena

Valentissimo remedio. Inūctio quoq; cōtra pestilentiæ carbūculos, ac abscessus oēs fieri solet mirabilis effectus, quæ hoc modo fit. In uase enim uitreo sambuci florum partes sex imponūt, ebuli partes duas, hyperici partem unam, olei peruetoris quantum satis sit, ut iusta infusione supernatet, obturato deinde ore æstate uniuersa solibus continuis perficitur, atq; ita insolato, ubi opus est utuntur. Carbunculos enim & inflammationes omnes siue impetus ter quaterūe in die inungunt, alij totum corpus, unde uehementi sudoris profluuio uirus omne elicitur. Oleum aliud siue unguentum mirandi effectus: Olei uetustissimi sēlibram in phialam imponunt, in qua triginta scorpiones nouem horarū spacio ociose lento igni deferuere faciunt. Alij cacabum aquæ plenum ad ignem cōponunt, in quo phialam antedictam imponunt, ut feruente aqua oleum pariter intus ebulliat, in qua demum theriacæ optimæ ligulā addūt. Iterumq; faciunt deferuere, demum eximūt, ex eo inungi debent arteriarū pulsus in manibus, præcordia ipsa ac iuguli lacus, & cæteræ partes quæ arterijs respōdent, circaq; deniq; apostemata. Post horas sex iterum inungi debent, eadem corporis partes, & statim æger haud dubio conualescet. Potio quoq; salutaris sæpe experta, nec uana unquā inuenta, habet pulueris cordialis ℥. 2, ramenti

CORN

cornu ceruini 3. sem. sancti (ita uulgus uocat) myrrhæ singulorū sesquidrachmam, ex aceto q̄ acerrimo ad ignem protinus quum inguina tentantur, bibitur, in promptu enim esse debet remediū, sudore enim prorumpente undiq; uirus elicitur, atq; ita iuxta ignem calefactis linteolis membra foedo sudore detergenda, mutandaq; sudariola sunt, donec sudoris graueolentia inter fricationes subsistat. Miro enim præsidio, ut Alexander Benedictus nostri amatissimus ætate nostra doctissimus affirmauit, Georgij Vallæ autoritate motus à pestilentia tentantes liberat, neminemq; qui eam opportune potionem ieiunus biberit, ab hac uiolentia opprimi cōstat manifesto ac uulgato experimento.

Ex traditione Pœnorum & Arabum.

Causa pestilentiarum plurimum est mutatio & corruptio aëris in quatuor temporibus anni. Mutatio autem anni fit quatuor modis, aut cum dominatur ei una ex qualitatibus, aut propter fumum & puluerem terræ eum perturbantem & obscurantem, aut propter fumū maris et lacuū atq; paludū, aut propter magnū foetorem sicut cadauerū corporū animalium, quod est cæteris peius. Proinde plurimū patiūtur pessimos morbos de pestilentiali genere, & febres non de genere humorū, quia sicut pessimus morbus aut uene

Rr 2

nosus

nosus, similiter & aqua nocet & destruit substantiam eam accipientium, nec saluatur nisi rarissimi, sicut & aer quando corrumpitur & putrefit, quique patitur non euadit nisi paucissimi. Aer etiam nocibilior est cibus & potibus, & uelociter perforat ad cor, & pulmonem cum flatus attractu sine ulla remotione, proinde omnes infirmi & sani plurimum infirmantur de aeris corruptione. Antiqui concordes fuerunt et maxime Hippocrates, quia si in quatuor anni temporibus aer corrumpatur, generantur in illo anno pessime & mortales passionibus. Dixerunt etiam si uenti quatuor in duobus mensibus hyemis, id est Decembri & Ianuario perflent, & puluis in aere augmentetur, & aeris complexio in siccitate mutetur nullam habens pluuiam, & dies in qualitate diuersantur, ut scilicet una dies sit calida, alia frigida fuerit, haec pessima signa in hyeme. Vere autem accedente pluuiali & turbido, cuius perturbatio non dissoluitur nisi in quinto aut in septimo die, fiunt febres pessime, non secundum humores, sed plurimum nascuntur uariolae & pustulae. Multo etiam plurimum tunc oriuntur mortales pestilentiae. Dixerunt etiam si uer & hyems taliter fuerint, necesse est sit in aestate aer turbidus & humidus, non clarus, & arboribus & terrae nascentibus puluis dominetur, unde fit causa in corpore desudationes generans. Corpora etiam non sudant, nec hume-

humectatur sicut sunt solita in æstate humectari cū
cla naturaliter. Rasis: Cum uideris nauseam frequē
tem cum febre tepida, tūc scias quod ipsa est febris
pestilentialis, & propriè quando cōmunicat et mul
tiplicatur, & sunt pestilentie manifestæ in aëre cir
cūdante eos, stude ergo tota intētione in cōfortādo
cor istorū, & tēperando aërem continentē eos, &
adhibe eis bene redolentia, & intromitte eos in do
mos odoriferas mūdās, & sterne eas plantis bene
redolentib. et aspectu uiridibus, & suffumiga eas cū
santalīs & cāphora, & asperge eas aqua rosarū &
aceto, & asperge ex eis super frustum luti antiqui,
aut super lateres domorū, si sunt antiqui ueteres, et
pone super tēpora aquam rosaceā & camphorā, et
santal. cum panno mundo in eis infuso, & fac eos
odorare res odoriferas semper, & da eis in potu a
quā frigidam ueri frigoris ualde, & rob granati a
cetosi, & rob agrestæ et acetositatē citri, & lac ace
tosum, & aquā mixtā cum aceto quando nō præsto
est aliud, & ciba eos pullis assatis, et uitello ouorū,
& da eis in potu uinum album boni odoris odorife
rū, cui admixtum sit quantum est quintuplum eius
aquæ dulcis. Rasis. 10. ad Almāfor. Febrib. quæ ex
aëris corruptione generantur, non uidetur in prin
cipio multa inesse acuitas, neq; caliditas cū tāgitur
eger, sunt tamen in occultis corporis partibus et in

Rr 3 ipsius

ipsius profundo magni nocumenti, & sunt deceptoria, & uehementis operationis & sunt febres lenete & tepidae, sed conclusae cum quibus anhelitus, & quicquid à corpore egreditur, ualde foetida sentiuntur. His uero febribus laborantes, tribulationem magnam, & sitim uehementem patiuntur eorumque anhelitus augmentatur, & fit spissus, ex quorum corporibus cum uomitu & egestionem res foeda egreditur, & insolita, deinde incipit eis superuenire syncope, & moriuntur.

Ex traditione autorum recentium.

Pestilentialis febris potest ab omnibus humoribus indifferenter provenire. Nam contingit interdum aërem esse infectum uenenositate, puta à constellatione, uel ab aliquo uapore ab aliquo corpore resolutio, sicut exempli gratia, scilicet ab infectis cadaueribus, & à stagnis corruptis, à cimiterijs, sterquilinijs, aut consimilib. qui aër sic infectus ad cor attractus, spiritus inficit uenenositate, qui infecti humorem magis aptum tale infectionem suscipere inficiunt, & sic febris causatur pestilentialis. Interdum tamen in uisceribus terrae uapores includuntur uenenosi, qui plantas inficiunt, aut plantarum nutrimentum, propter quod illa terranae scetia comesta non solum humores, quos generant, inficiunt, uerum etiam in corpore existentes. Ideo dicebat

dicebat Auicenna secunda primi, doctrina secunda, capite de iudicijs cōplexionis anni, quod mortalitates corrumpunt arbores & uegetabilia, ideoq; corrumpuntur, ex ea animalia quæ ea comedunt, & ideo homines qui eis uestuntur, corrumpuntur. Et si aliquis diceret, si corruptio aëris fiat per actionem & motum stellarū, quæ necessitas fuit ut hæc in libris scriberentur à medicis, cum ea defendere contra syderum repugnationes nequeunt? Respondeo q; corruptio aëris non accidit nisi corporibus ad eam præparatis. Vnde cum Medicus præuideat significationes aëris in unoquoq; tempore anni uenturi, poterit mundificare materiā de corporibus ad corruptionem præparatis prius, quàm corruptio accadat eis, & etiam temperamentum præstare scierit, ut uenturæ corruptioni repugnare ualeat. Nam si præuiderit fore calorem nimium in aëre, & siccitatem & adustionem, festinet ad purgandum cholera eorum, in quibus est cholerica cōplexio, ne illius feruoris calorē facilius per similitudinem recipiat. Dentur quoq; frigida & humida uenturo calori repugnātia, quia rationalis anima dignior stellis est, ut uult Isaac. 5. febrium. Nam actio earum ei minime accidit, nisi cū ignorantia tenetur. Dum enim eam senserit eam omnino cauebit, hoc testificatur ab eo quod uidemus ab optimis mathe-

Rr 4

maticis,

maticis, quia cū certissime nouerint dies particularis mortis, inferentes eis qui in mare ingrediūtur, satis potest eos tueri. Similiter & illos quæ in bello morituri sunt. In quo igitur differat homo à cæteris animalib. intelligenti clarissimè patet. Nā ratio & discretio est ea semper inquirere & desiderare bona, & mala respuere, eisq; repugnare, quia non est subditus naturali actioni, ut uult Beatus Augustinus in libro septuagintatrium questionum, nec est etiam subditus pestilentiali desiderio ut uult Isaac, ubi supra, nisi cum ignorantia tentus est. Sed cū scit & discernit bonū à malo, uerū à falso, & iustū ab iniusto, querit sibi bonā partem quæ est ei similis, unde homo est, & spernit partem malā quæ nō est ei similis unde est animal. Quantū ad curā istius febris sic pcedamus, ad medicinalia cōdescendendo, primo doctrinā insequens Auicennæ. Si febris ab alio humore deuenit quàm à sanguine, sunt illi humores euacuādi, & si à sanguine prouenerit, statim fieri facias phlebotomiā de uena media, si infirmus æqualiter senserit se grauātū, uel de basilica si magis ab inferiorib. uel de cephalica si magis à superiorib. ætate, cōplexione, et alijs consentientibus ipsam facere usq; ad lipothomiā nō uituperant recentiores medici, uel saltem fieri facias secundationē. Quod si ætas uel aliquid taliū phlebotomiā prohibuerit

huerit uentosas super nates, uel spatulas cum scarificatione secundū exigentiā apponi facias. Si autem ab alio humore quā à sanguine prouenerit, quem sanguini iudicares permixtū, consimiliter fieri facias phlebotomiā uel uentosas, non tamen sanguis in tanta extrahatur quātitate ut in casu præcedenti. Et licet hæc febris possit à quocunq; humore prouenire indifferenter, principaliter tamen humori non attendimus, sed extinctioni caloris, & ueneno sitati materiæ, cor scilicet confortando. Nam materiæ digestio est ipsius uenenositatis correctio, & ideo facias sic. Recipe aquæ buglossæ, uiolarum, pimpinellæ ana. ℥. 4. aquæ rosarū lib. s. syrupi de acetositate citri, de limonibus ana. ℥. 3. syrupi de succo acetosæ ℥. 2. uini granatorū ℥. 3. fiat iulep aromatizatum cum santalis muscatellinis de tali bibat sæpe in omni hora quauult. Item in isto casu multū ualet aqua herbæ tunici facta cū suis radicib. & aqua tormentille facta similiter, et aqua dictami, scabiosæ et acetosæ. Itē: Recip. syrupi de limonib. de acetositate citri ana. ℥. 2. aquæ acetosæ, scabiosæ ana. ℥. 2. aqua pimpinellæ et herbæ tunici ana. ℥. 1. s. clarificetur pro duab. uicib. & detur in aurora aromatizando cū santalis. Item cōueniunt odoramenta, epithe mata et unguenta pro corde, epate et testiculis & renib. quæ supra de causonide scripta sunt. Pro con

Rr 5

fectio=

fectione da hanc mixturā: Recipe cōseruæ uiol. bora
ginis, buglossæ ana. ʒ. s. cōseruæ nenupharis ʒ. ʒ.
manuschristi cū plis lib. s. fragmētōrū omniū lapidū
præciosorū ʒ. 2. margarit. tritarū ʒ. 2. foliorū auri
numero. 12. fiat mixtura deaurata de qua sepe come
dat, et de ea bibat cū aqua acetosæ si libuerit. Pil. sa
lutis mirabiles præseruātes à peste, siue fuerit pesti
lētia ab aëre corrupto, siue ab influētia syderū, siue
à quacunq; causa citra Deū, quas habui ab amico in
finibus Germaniæ, quibus mediantibus omnes præ
seruabat à peste, siue sumantur per se, uel in forma
opiatæ, & sub utraq; forma possunt fieri: Recipe a
loës, succotrini ʒ. 2. s. myrrhæ ʒ. 1. croci orientalis
ʒ. s. cumini, coriādri præparati ana. ʒ. ʒ. 3. radicis tor
mentillæ ʒ. 1. s. boli armeni ʒ. 1. terræ sigillate siue
terræ lemnæ ʒ. s. seminis basilyconis, seminis citri.
ana. ʒ. 2. seminis acetosæ ʒ. 2. s. radicis been albi
& rubei ana. ʒ. 1. santali albi & rub. ana. ʒ. s. ligni
aloës casialignæ ana. 2. ʒ. ossis de corde cerui, co
ralli rubei, spodij ana. ʒ. s. puluerizanda puluerizē
tur & cum syrupo de acetositate citri formetur
massa pro pilulis, de qua formentur. 6. pro ʒ. capi
at aliquando tres dum uadit dormitum, & aliquan
do unam mane hyeme & uere, & tempore pestilē
tiæ omni mane unā. Et si uelit facere in forma opia
tæ pone de syrupo de acetositate citri quod sufficit
pro

pro forma opiatæ, capiat mane dum surgit à lecto
3.5. aut 3.2 uel 3.1. secundum quod uidebitur.

De uariolis & morbillis. Cap. XI.

Ex traditione Arabū Pœnorū & autorū recentū.

Causa uariolarum (ut uult Isaac. 5. febrū) materia est in compositione foetus in uulua existentis, quam in quibusdā locis natura claudit à principalib. membris remotis, cutiq; uicinātib. propter debilitatē mēbrorū foetus, qualitatē illius materiæ nō sustinentū. Quæ cū mouetur propter aliquod exteriorū sicut propter pessimos chimos, aut corruptū aērē à suo loco egreditur, cū natura repugnās expellit eā ad cutē, qā sibi uicina est, hac de causa fiūt uariolæ, nec aliq; remanet qn eas habeat, quia earū materia fit in cōpositione foetus. Sed plurimū adolescentulis & pueris fiūt, raro iuuenibus, decrepitis nunq. Impossibile enim est in corpore usq; in decrepitā etatē pmanere, propter mutationē etatis, tēporis & exercitiorū & cibario rū & cæterarū diuersitatū, qā natura eā sibi assuefecit, unde non mouet illam nisi cum ipsa per se mouetur. Ideoq; adolescentuli & pueri plurimū patiūtur, quia sunt gulosi, & cibos inordinate sumūt nec cauent aērem, aliq; accidentia, & illis quib. calida & humida cōplexio dominatur, quæ est putredini cōueniens & familiaris. Rasis: Signa generationis

uariolæ

uariolarū sunt febres acutæ caliditatis conclusa, & uehementia doloris dorsi & pruritus nasi, et timor in somno. Si aut febris est uehementioris caliditatis, & angustia est maior, tunc portenditur morbillus. Morbillus autem est maioris timoris quàm uariolæ nisi in oculo. Cura uariolarū, cum incipiūt signa, est phlebotomia, sed postea non, sed attende, & si fuerit æger bonus in paruipendenda ægritudine, & nō habuerit angustiam uehementem, & uariolæ iam inceperint exire, tūc rege cum eis quæ festinare faciunt exitum uariolarum, & non des ei in potu aliquid frigidū cum frigiditate plurima, ut nō stet exitus uariolarū, & superueniat ei tarditas & difficultas. In cura morbili intende cū eis quæ educunt cholera cum facilitate absq; calefactione, sicut aqua prunorū, & granati cōtriti cum suis interioribus cū sacharo, & aqua hordei & aqua melonis indi & citrulli & cucurbitæ et muscilagine psyllij. In uariolis si uideris eas pigri exitus, tūc da ei decoctionem ficuū cum lacte aliquantulū croci, ut festinare faciat exitus illarū. Isaac: Variolæ de sanguinis putridi nascūtur corruptione, & sunt de accidentib. synochū concomitatib. Medicandus est ergo in initio cū calidis & humidis, quæ intus naturam dissoluant, & extrinsecus expellunt. Caueatur frigida medicina quæ humores claudit & congelat. Medici
na uero

na uero uariolas cito eijciens, & sine molestatione,
est succus marathri, apij cū oxyzaccara. Accipiant
de hac cōfectione à nobis probata: Recipe ficus sic-
cas quinq;, lentis mundatæ 3. 10. laccæ 3. 5. traga-
chanti totidem, marathri 3. s. omnia coquātur in u-
na libra aquæ & s. usq; ad 3. 4. deinde cola & mit-
te 3. 1. sacchari, & da bibere ante cibū ieiuno, et ho-
ra dormitionis donec totæ appareāt, & deinde ces-
set. Aliud: Recip. rosæ, lentis mundatæ ana. 3. s. lac-
cæ 3. 2. marathri, seminis citoniorū, tragachanti a-
na 3. 1. s. mastiches 3. 1. omnia coquātur et colētur
et bibere dentur 3. 3. cū oxyzaccara. Demus ptisæ-
nū, bliti, chrysolocannā, cucurbitā. Epithemata uitē-
tur omnimode, ne forte uulnera rcuertātur intra, et
cadentes in cardiacā moriātur. Studendū est in ini-
tio ne in oculis pustulæ nascātur, et lauentur cum lo-
tura oliuæ oculos mūdificante, his mūdificatis impo-
nēda est aqua rosarum cum succo maligranati, uel
aqua rosarū, et sumach. Post septē dies oportet cu-
stodiri de medicina, uel diætā dissolutiua, quia hæc
passio propria est solutioni uentris superuenienti,
q; si adueniat oportet eā cōstringi cum medicina in-
diaria dicta, uel in alijs locis libri nostri. Pustulis ef-
fluētib. & desiccari incipientib. impleatur culcitra
ubi infirmus iacet de rizi farina, superponatur uul-
nerib. farina rizi uel milij cum croco. In cura uario-
larum

larum nullo modo oportet fieri repercussione, nec in illis quæ fiunt in pueris ex sanguine menstruali matricis, nec in illis qui synochum concomitantur, nisi circa oculos cum materia fuerit furiosa. Cum enim materia sit uenenosa & furiosa, si reperiatur faciet dysenteriam, uel aliquod pessimum synthoma. Circa oculos fiat repercussio, quia eorum substantia est ualde tenera, & propter furiositatem materie cito corrumpuntur. In alijs autem membris est generale ut fiat extractio materie ad exteriora. Ad extrahendum autem materiam accipe succum foeniculi, apij, & in ipso tepesfacto intinge pannum lineum, & inuolue corpus, totum illud trahit materiam ad exteriora, & in parte consumit. Vel aliter fieri potest in uariolis puerorum, decoquantur in aqua lenticule, & eis postea proiectis illiniatur illa aqua. Lenticula quamuis sit frigida, cortex tamen eius est calidus, & aqua decoctionis eius attractiua & consumptiua. Circa oculos autem leuis fiat repercussio cum bombace uel panno lineo in aqua rosarum intincto. Ab interiori autem alteratiua administrentur ad infrigidandum sicut oxyszaccara. Hæc enim alterat ebullitionem sanguinis, & ipsum ad exteriora expellit. Necessarium autem est in pueris curare ipsam passionem, ne lepram incurrat in maiori etate, & in febre acuta laudabile est

le est cū digestionē, q̄a significat perfectā corporis mundificationē. Si aut̄ fiat excoriatio et putrefactio cutis, fiat puluis de rosis & de fabis siccis, & super aspergatur Cauendū est autē ne fiat inūctio aliqua, ne materia nocens interius retineatur. Item puluis lithargyri & plumbi usti cum carie lignorum, multum ualet ad uariolarum exiccationem, & ad materiae uenenosae cōsumptionem. Puluis autem thuris, mastiches, sarcocollae carnem regenerat, & cicatrizat, id est consolidat, & loca mundificat. Vestigia autem uariolarum longo tempore post solent remanere, aliquod multum ualet corporis impingatio et balneum, sicut dicit Rasis, unguentum citrinū & ea quae faciunt ad mūdificationem faciei. Item praecipit Isaac sacharum rosarum, & crocum cum succo apij, id est decoctionem apij uel marathri gargarizare, hoc enim ualde mundificat faciem. Medicinae autem quae delent uestigia uariolarū & ulcerū secundum Rasim in libro diuisionū, sunt lithargyrum cōditum, radices cannae siccae, farina ciceris, ossa uetusta, farina rizi maturi, grana alben, costus, aggregentur & terantur & liniantur cū eis in nocte, & abluatur cum eis indie in balneo.

F I N I S.

BASILEAE PER HENRI-

chum Petrum Mense Martio, An-

no M. D. XLVII.

